



Int 64  
nr 101



FLORA PERUVIANA, ET CHILENSIS,

SIVE DESCRIPTIONES, ET ICONES

*PLANTARUM PERUVIANARUM,*

*ET CHILENSIUM,*

SECUNDUM SYSTEMA LINNAEANUM DIGESTAE,

CUM CHARACTERIBUS PLURIUM GENERUM

EVULGATORUM REFORMATIS.

*AUCTORIBUS*

HIPPOLYTO RUIZ, ET JOSEPHO PAVON,

REG. ACAD. MEDIC. MATRIT. SOCIIS.

*Buy deff. vicente  
de l'institut de france*

TOMUS II.



SUPERIORUM PERMISSU.

TYPIS GABRIELIS DE SANCHA.

ANNO M. DCC. XCIX.



FLORA PERUVIANA, ET CHILENSIS

SIVE DESCRIPTIONES, ET ICONES

PLANTARUM PERUVIANARUM,

ET CHILENSIUM,

SECUNDUM SYSTEMA LINNAEANUM DIGESTAE

CUM CHARACTERIBUS PLURIMORUM GENERUM


EVULGATORUM REFORMATIS.

AUCTORIBUS

HIPOLYTO RUIZ, ET JOSEPHO RAVON,

REG. ACAD. MEDIC. NATIV. SOCIIS.

TOMUS II.



SUPERIORUM PERMISSU.

TITIS GABRIELIS DE BANCH.

ANNO M. DCC. XCIX.



## P R A E F A T I O .

In hoc altero Plantarum Specierum Peruvianarum et Chilensium Volumine duo nova Genera continentur unâ cum CCLVIII Generum sexdecim in Prodro-mo editorum, et novarum quoque notorum jam Generum Specierum descriptionibus; quibus accedunt nonnullae, antehac quidem evulgatae, sed quas reformare, supplere et locis natalibus perficere opus fuit. Complectitur praeterea idem Volumen CXVI Tabulas cum CCIII Plantarum Iconibus accuratissimè ad vivum delineatarum, eâdem diligentia aeri incisas, singulis earum fructificationis partibus magnitudinis naturalis seorsim exhibitis. Nonnulla etiam exemplaria vivis coloribus adumbrata in curiosorum gratiam prostabunt, quemadmodum in primo Specierum Volumine faciendum curavimus.

Jam verò haud injucundum Lectoribus erit, uti speramus, non exiguum plurium Generum Specierum numerum in hoc Volumine evolvere, e. g. *Heliotropia*, *Tournefortias*, *Nolanas*, *Lisianthos*, *Varronias*, *Rauwolfias*, *Plumierias*, *Cestra*, *Solana*, *Lycia*, *Sarachas*, *Sesseas*, *Periphragmos*, *Psychotrias* vigintisex, *Coffeas* decem, *Portlandiam corymbiferam*, *Macrocnema* tria, *Cinchonas* denique octo à nobis, duasque à nostro Alumno Joanne Tafalla locis natalibus descriptas et delineatas.

Postremorum autem trium Generum descriptiones eò libentius tradimus, quò magis affinia sunt et reformatu digniora. *Cinchonarum* verò Species legitimas dignoscere invicem, Arti Medicae praesertim summopere intererat, nam ex confusione, qua Mercatores eas permiscendo et indiscriminatim venditando miserè in commercio abutuntur, incertae singularum virium efficacitatis observationes et perniciosi, aut saltem minus salutares effectus in morborum curationibus proficiscuntur. Idcirco pro virili satagemus, ut omnis confusionis et erroris occasio in tanti momenti negotio deinceps auferretur.

Sed cùm Lector benevolus in *Cinchonologia*, seu de Kinæ Kinæ Arboribus Tractatu, quem anno M.DCC.XCII nostrum alter hispanicè evulgavit, eodemque anno italicum Romae fecit Josephus Antonius Monaldinus, facile consulere possit *Cinchonae officinalis*, aliarumque congenerum Specierum historiam, electionem, commercium, vires, usus, analysim chemicam; hîc loci solum adjiciemus descriptiones botanicas cum Observationibus et Iconibus Specierum, quas per *Andium* montes deteximus, in quibus à XII grad. merid. ad IV grad. septent. tantummodo pretiosum adeo specificum hactenus repertum est.

Ceterae autem Plantae in Jamaica, Martinica, Caribaeis insulis, et in Hispaniola provenientes, in *Cinchonae* Genus intrusae, atque adeo minimè ad illud pertinere videntur, siquidem Characteres, quos nobis in earum descriptionibus et iconibus Botanici exhibuerunt, admodum à nostris differunt et potius *Portlandiae* Generi quadrant.

Id evincunt *Cinchona caribaea* Jacq., *C. lineata*, *floribunda*, *brachycarpa*, *angustifolia*, *longiflora* et *spinosa*, quas memorat Clar. Vahl in *Opusculo de Cinchona*, Londini anno M.DCC.XCVII edito: Plantae, inquam, penitus diversae à *Cinchona officinali*, *pubescenti* et *macrocarpa* ab eodem etiam Vahl traditis, et ad *Cinchonae* Genus certissimè spectantibus, quarum prima et secunda in Peruvia, tertia in Sanctaefidensis Regno crescunt.

*Cinchona* quoque *corymbifera* Forster in memorato Opusculo descripta à Genere *Cinchonae* recedit, et *Portlandiae*, *Macrocnemi* aut aliûs Generis affinis Species censenda est; minimè verò inter *Cinchonas* enumeranda, quemadmodum de illa, de *Caribaea* Jacquini, aliisque nonnullis plantis rectissimè asserit Clar. Mutis in Commentario de Cinchonis, in *Agriculturae et Artium Hebdomadar. num. 85*. Matriti evulgato anno M.DCC.XCVIII.

Neque *Cinchona philippica* D. Cavanilles cum nostris convenit: quin imo filamentorum



insertio, antherarumque figura, insertio et longitudo *Portlandiis* eam adiscunt: quod etiam comprobatur seminum figura; enimvero ipse Clar. Botanicus Pericarpium speciminis sicci, quod observarat, immaturum fuisse profitetur.

Specierum autem *Cinchonae*, quae à Sanctaefidensis Regno tractibus septentrionalibus ad manus nostras pervenire, nulla omnino sive à Mercatoribus, sive à Medicinae Professoribus adeo efficax comperta est, ac illae quae in *Loxae*, *Cuchero*, *Casape*, *Casapillo*, *Cayumba*, *Sapan*, *Pillao*, *Pampamarca*, *Panao*, *Muña* aliisque Provinciarum *Panatahuarum*, *Huanuci*, *Huamalies*, *Tarmae* et *Xauxae* montibus veniunt: unde inferre licet, in montibus à linea aequinoctiali ad XII usque grad. meridiem versùs protensis *Cinchonae* Species praestantioribus viribus praeditas inter alias minus efficaces progigni, quàm ab eadem linea usque ad IV grad. septentrionem versùs à Cl. D. Med. D. Josepho Caelestino Mutis, et Josepho Sebastiano Lopez Ruizio detectae.

In quo quidem observare est, *Cinchonas rubram*, *luteam*, *aurantiam* et *albam* D. Mutis, et rursus *C. Tunitas*, *Azahar*, ceterasque D. Lopez pulchritudine et colorum intensitate, sapore amaro-acido grato, odore aromatico, densitate, pondere et fracturâ eâdem destitui, quibus antecellunt *Cinchona officinalis*, *nitida*, *hirsuta*, *lanceolata*, *micrantha*, *dichotoma*, et quae nuper *Rubicundae*, vulgo *Colorada* et *Calisaya* nomine innotuerunt, aliaeque à Huayaquil et *Loxae* montibus allatae.

Ceterum, quod ad *Cinchonae officinalis* historiam pertinet, quamquam *Cinchonologiae* Auctor ejus corticem Proregi Comiti de Chinchon ad debellandas uxoris febres primum à Praetore Loxensi missum fuisse narraverit; haud abs re erit hîc addere, hunc praetorem Joannem Lopez de Cañizares nomen habuisse, qui quidem antea in urbe Panamá Regis Quaestor fuerat.

Idem etiam Auctor ibidem retulit, *D. Franciscum Renquifum*, cùm à *Lamarum* Provincia regrederetur, Cinchonam nitidam anno M.DCC.LXXVI in collibus S. Christophori de Cuchero detexisse; quod inventum cum Huanuci Incolis communicavit: operae pretium tamen erit silentio non praeterire, *D. Emmanuelem Alcarraz* in Montes primum penetrasse, inde illius *Cinchonae* cortices Limam deportasse et commercium denique in *Panatahuarum* et *Huanuci* Provinciis iniisse: quod ita evulgandum duximus, ne illa omissio *D. Alcarraz* fraudi unquam sit, nam etsi *Renquifum* laude dignum ob inventum judicamus, non minus commendandus est *Alcarraz*, utpote commercii supradictis Provinciis et hominum generi adeo proficui promotor.



# C L A S S I S V.

## PENTANDRIA MONOGYNIA.

**QUINCHAMALIUM.** MOLINA *Hist. Natur. Regn. Chil.* pag. 159. JUSSIEU *Gen. plant.* p. 75. LAMARCK *Illustrat. botanic.* pag. 125. t. 142. **QUINCHAMALI.** FEWILL. *Per. Obs.* t. 3. pag. 57. *planch.* 44.

### CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

- CAL.** *Perianthium* globosum, quadridentatum: *denticulo infero* majori, *tribus superis* minimis: inferum, persistens.
- COR.** infera, infundibuliformis. *Tubus* tenuis, quinqueangulatus, parum curvatus, calyce quadruplo longior, basi globosâ, ultra coarctatus. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* linearibus, aequalibus.
- STAM.** *Filamenta* quinque, brevia, filiformia, basi laciniarum corollae inserta. *Antherae* lineares, erectae, biloculares, laciniis dimidiò breviores.
- PIST.** *Germen* globosum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* capitatum, truncatum.
- PERIC.** monospermum, globosum, è basi corollae, et calyce carnosio accretum.
- SEM.** globosum.
- Obs. 1.* Raro exemplo: *Stamina* ad basim laciniarum corollae inserta; *Limbus corollae* quinquepartitus, et *Calyx* quadridentatus, inaequalis.
- Obs. 2.* Lamarck calycem quinquepartitum et corollam superam minus rectè descripsit.

### CHARACTER DIFFERENTIALIS.

*Pericarpium* monospermum, è basi corollae et calyce carnosio accretum. *Calyx* inaequalis, quadridentatus. *Corollae limbus* quinquepartitus. *Stamina* basi laciniarum corollae inserta.

**QUINCHAMALIUM PROCUMBENS.** IC. CVII. *Fig. b.*

1. *Q.* foliis linearibus sparsis, floribus terminalibus capitatis sessilibus.
- QUINCHAMALIUM (chilense).** MOLIN. *Hist. natur. Regn. Chilens. hisp. vers.* pag. 159.
- QUINCHAMALI** Lini folio. FEWILL. *Per. Observ.* pag. 57. *planch.* 44.
- PLANTA** herbacea, glabra, annua.
- RADIX** fusiformis, tenuis, perpendicularis, infernè fibrillosa.
- CAULES** plurimi, simplicissimi, subpedales, inaequales, procumbentes, parum assurgentes, filiformes, infernè attenuati, striati.
- FOLIA** sparsa, sessilia, linearia, angustissima, integerrima, ad basim puncto purpureo notata.
- Tom. II.

**FLORES** terminales, in capitulum ovatum collecti, sessiles.

**COROLLA** extus purpureo-rubra, intus lutea.

**PERICARPIUM** rubicundum.

**HABITAT** in *Peruviae* collibus arenosis ad *Huaroheri*, *Cantae*, *Tarmae* et *Conceptionis Chile* Provincias.

**FLORET** Majo, Junio et Julio.

**VERNACULE** *Chinchimalí* et *Quinchamali*.

**Usus:** Ad pleuritidem et ulcera sananda confert.

*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Idem antice visus. 3 Calyx magnitudine naturali. 4 Idem auctus. 5 Corolla scissa stamina ostendens. 6 Pistillum. 7 Pericarpium. 8 Semen.

**MIRABILIS.** LINN. *Gen. plantar.* pag. 114.

### CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

- CAL.** *Perianthium* campanulatum, quinquefidum: *laciniis* ovato-lanceolatis: inferum, persistens.
- COR.** infundibuliformis. *Tubus* longissimus, curvatus, 5-angulatus, ultra basim coarctatus, supernè ampliatus, basi globosâ, rudi, crassâ, striatâ. *Limbus* erecto-patens, plicatus, quinquelobus; *lobis* emarginatis.
- Nectarium* parvum, cyathiforme, membranaceum, germen ambiens, marcescens.
- STAM.** *Filamenta* quinque, filiformia, corollâ longiora, aequalia, declinata, ori nectarii insidentia, infernè tenuissima, libera, in coarctatione agglutinata, parum decurrentia, deinde libera. *Antherae* subrotundae, didymae, incumbentes, assurgentes.
- PIST.** *Germen* subrotundum, intra basim corollae nectario cinctum. *Stylus* filiformis, situ et longitudine staminum. *Stigma* globosum, multifidum: *laciniis* subdichotomis, glandulaeformibus.
- PER.** nullum. *Calyx* semen continens.
- SEM.** *Nux* è basi corollae formata, oblonga, angulata, striata, tuberculata, coronata margine minimo: *Nucleus* oblongus.

### MIRABILIS JALAPA.

1. *M.* floribus terminalibus congestis erectis, foliis cordatis ovatisque acuminatis, caule laevi.
- MIRABILIS (jalapa)** floribus congestis terminalibus erectis. LINN. *Sp. pl. t. 1. p.* 490.
- PLANTA** herbacea, bipedalis, perennis.
- RADIX** tuberosa, oblongo-fusiformis, fusca, intus alba.
- CAULIS** erectus, infernè teres, supernè obsolete tetragonus, geniculatus, geniculis saepe purpureis, subdichotomis, fragilis, laevis, glaber, nitidiusculus.
- RAMI** patuli, supernè dichotomi: *teneri* pubescentes.
- FOLIA** opposita, petiolata: *inferiora* obliquè cordata: *superiora*



*riora* ovata, integerrima, venosa, margine subundulata, leviter pubescentia.

PETIOLI basi parum incurvi, supra plani.

FLORES terminales, congesti, subseni, breviter pedicellati.

CALYX corollâ sextuplò brevior, campanulatus, angulatus, quinquefidus: *laciniis* ovato-lanceolatis, acutis.

COROLLA rubra vel purpurea, aut lutea, sive alba.

STAMINA corollae colore.

NUX oblonga, rugosa, decagona; angulis alternis prominulis, nigra.

HABITAT in cultis et versuris *Huanuci*, *Limae* et *Chancay*.

FLORET toto anno.

VULGO *Trompetillas* et *Flor de Panamá*; in Hispania verò *Don Diegos* appellatur.

### PLUMBAGO. LINN. Gen. pl. pag. 114.

#### PLUMBAGO EUROPAEA.

1. P. foliis amplexicaulibus lanceolatis scabris. LINN. *Sp. pl. pag. 429.*

HABITAT in *Huanuci*, *Tarmae*, *Huaroherí* et *Caxatambo* provinciis ad sepes et petrosa loca.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VERNACULE: In *Cheuchin*, ubi pro veneno reputatur, *Ra-ta-rata* nuncupant; in Hispania *Velesa* appellatur.

Obs. Plantae inter papyros asservatae, eas colore purpureo tingunt.

### HELIOTROPIUM. LINN. Gen. pl. pag. 99.

#### CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* tubulosum, quinquedentatum: *denticulis* acutis; inferum, persistens.

COR. hypocrateriformis. *Tubus* cylindricus, calyce longior. *Limbus* planus, subplicatus, quinquefidus: *laciniis* subrotundo-ovatis, obtusis. *Faux* quinqueplicata, clausa.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, subulata, tubo infra faucem inserta. *Antherae* ovatae, inclusae.

PIST. *Germina* quatuor. *Stylus* cylindricus, longitudine staminum. *Stigma* capitatum, acutum, emarginatum.

PER. *Calyx* erectus, ventricosus, semina fovens.

SEM. quatuor, ovata, extus convexa.

#### HELIOTROPIUM PERUVIANUM.

1. H. foliis lanceolato-ovatis, caule fruticoso, spicis numerosis aggregato-corymbosis. LINN. *Sp. pl. t. 1. p. 380.*

HABITAT copiosè in *Peruvia* ad *Cercado*, *Chancay*, *Cantae* et *Huanuci* Provincias.

FLORET per totum ferè annum.

VULGO *Vaynilla* ob odorem *Vanillae* accedentem.

#### HELIOTROPIUM CORYMBOSUM. ICON. CVII. Fig. a.

2. H. foliis oblongo-lanceolatis, caule fruticoso, spicis terminalibus aggregato-corymbosis, laciniis calycinis longis subulatis.

PLANTA fruticosa, ferè triulnaris.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI erecto-patentes, teretes: *teneri* pubescentes.

FOLIA alterna, breviter petiolata, oblongo-lanceolata, integerrima, subundulata, venosissima, rugosa, subtus hirsuta, albicantia, supra pubescentia, deflexa, ferè exsucca.

CORYMBI terminales, plurimis spicis recurvis, dichotomis compositi.

FLORES secundi, gemino ordine alternantes, sessiles.

CALYX tubulosus, quinquefidus, in fructu ovatus, ventricosus.

COROLLAE *Tubus* albus, calyce duplò longior. *Faux* viridiuscula, plicaturis quinque clausa, nuda. *Limbus* purpureo-violaceus, quinquefidus: *laciniis* subrotundis, obtusissimis.

SEMINA oblonga, extus convexiuscula, intus ferè concava.

HABITAT affatim in *Peruvia* per Provincias *Limae*, *Chancay*, *Cantae*, *Huaroherí*, *Icae*, *Camanae*.

FLORET ferè toto anno et praesertim Junio, Julio et Augusto mensibus.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Corolla scissa cum staminibus. 3 Pistillum. 4 Calyx cum seminibus. 5 Semina.

#### HELIOTROPIUM OPPOSITIFOLIUM. Ic. CVIII. Fig. b.

3. H. foliis ovatis acutis latis integerrimis, caule fruticoso, spicis dichotomo-corymbosis.

PLANTA fruticosa, orgyalis, densè hispido-pubescent.

CAULIS teres, fuscus, ramosus.

RAMI brachiati: *teneri* secundum articulationes compressi, sulcati, tomentosi, obscurè ferruginei.

FOLIA opposita, rariùs verticillato-terna, ovata, lata, acuta, rugosa, integerrima, petiolata, subtus venosissima, supra retrorsum aspera.

SPICAE terminales, 6-9, subdichotomae, ferè corymbosae, valde recurvae, pollicares.

FLORES secundi, sessiles.

CALYX minimus.

COROLLA alba, in emarcidatione atra, calyce triplò longior, extus hispidiuscula.

HABITAT in *Munía* aridis, versùs *Cormilla* tractum.

FLORET Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Pistillum.

#### HELIOTROPIUM INCANUM. ICON. CVIII. Fig. a.

4. H. foliis ovatis acutis crenatis lineatis rugosissimis, caule fruticoso, spicis dichotomo-corymbosis.

PLANTA fruticosa, incana, densè villosa.

CAULIS tripedalis, erectus, teres, pilosus, infernè glaber, ramosus.

RAMI teretes, erecto-patentes.

FOLIA sparsa, subsessilia, ovata, acuta, crenata, supra rugosissima, lineata, retrorsum scabra, subtus magis incana.



SPICAE terminales, plurimae, dichotomae, in corymbum digestae, ferè pollicares.

FLORES secundi, gemino ordine alternantes, sessiles.

COROLLA alba, calyce duplò longior, extus hispidiuscula.

CALYX in fructu ventricosus.

SEMINA quatuor, ovata, extus rugosa.

HABITAT in collibus aridis *Huanuci*.

FLORET Martio, et Aprili.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Calyx cum seminibus. 6 Semina.

*HELIOTROPIUM MICROCALYX*. ICON. CIX. Fig. b.

5. H. foliis oblongo-lanceolatis, caule suffruticoso, spicis oppositifoliis dichotomis, calycibus minimis quinque-dentatis.

PLANTA suffruticosa, leviter pubescens.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI angulati, erecti, divisi.

FOLIA alterna, nonnulla opposita, petiolata, oblongo-lanceolata, subacuminata, parum rugosa, venosissima, integerrima.

PEDUNCULI oppositifolii, dichotomi.

SPICAE foliis paulò longiores, in flore reflexae, in fructu erectae.

FLORES secundi, sessiles.

CALYX minimus, quinquedentatus.

COROLLA albicans, calyce triplo longior.

HABITAT in *Peruviae* collibus per *Huanuci* Provinciam.

FLORET Majo, et Junio.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Pistillum.

*HELIOTROPIUM SYNZYSTACHYUM*. IC. CIX. Fig. a.

6. H. foliis ovatis oppositis; intermediis alternis, spicis solitariis longissimis geminis brevibus, fructu bipartibili.

PLANTA villosa, herbacea, sesquipedalis, annua.

RADIX ramosa, fibrillosa, albidiuscula.

CAULIS procumbens, infernè divisus, angulatus.

RAMI consimiles, anguloso-sulcati, supernè divisi.

FOLIA inferiora et superiora opposita; intermedia alterna; omnia petiolata, ovata, oblonga sublanceolataque, integerrima, venosissima, lineato-plicata, rugosa.

SPICAE laterales terminalesque, solitariae et geminae: solitariae bi-tripalmares, apice recurvatae: geminae 1-2 pollicares, magis recurvae, alterâ paulo longiori.

FLORES gemino ordine alternantes, secundi, sessiles.

CALYX quinquepartitus: laciniis linearibus, acutis, in flore erectis, in fructu patentibus; inferus, persistens.

COROLLA infundibuliformis. Tubus longitudine calycis, basi dilatatus. Limbus quinquefidus, plicatus: laciniis subrotundis, patentibus. Faux aperta, villosa.

FILAMENTA quinque, brevissima, medio tubi inserta. Antherae lineares, acutae, erectae, biloculares, inclusae.

GERMEN tetragonum. Stylus brevissimus, conicus, cum co-

rolla decidens. Stigma obtusum.

BACCA obsoletè tetragona, umbilicata, quadridentata, bipartibilis.

SEMINA duo, ossea, bilocularia, intra utramque baccae partem.

HABITAT in segetibus et campis aridis *Limae* et *Chancay*.

FLORET per totum annum.

Obs. Pericarpium *Messerschmidiae fruticosae* Linn. simile, cristatum, bipartibile, loculis 2-3-4spermis. Corollae tubus clavatus, longissimus, calyce sextuplò longior: laciniis acutissimis.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Semina coalita. 6 Semina sejuncta.

*HELIOTROPIUM PILOSUM*. ICON. CX. Fig. a.

7. H. foliis lanceolatis integerrimis, caule fruticoso procumbente, spicis terminalibus lateralibusque 2-3-4nis.

PLANTA suffruticosa, densè pilosa, canescens.

CAULES plurimi, subpedales, teretes, ramosi, procumbentes.

RAMI consimiles.

FOLIA sparsa, petiolata, lanceolata, oblongo-lanceolataque, acuta, integerrima, obsoletè venosa.

SPICAE laterales terminalesque, binae, ternae, quaternae, subpollicares, apice revolutae.

FLORES gemino ordine alternantes, secundi.

COROLLA alba.

CALYCES in fructu patentiusculi.

SEMINA quatuor, subrotundo-ovata, nitida, hispidula.

HABITAT in collibus aridis *Limae* ad *Amancaes* tractus.

FLORET Majo, Junio et Julio.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem scissa cum staminibus. 5 Pistillum. 6 Calyx cum seminibus. 7 Semina integrâ. 8 Semen transversim sectum, biloculare. 9 Idem uniloculare.

*HELIOTROPIUM MICROSTACHYUM*. ICON. CX. Fig. b.

8. H. foliis oblongis alternis, caule herbaceo, spicis aggregatis brevibus, fructu bipartibili.

PLANTA herbacea, procumbens, pubescens.

RADIX fusiformis, fibrillosa.

CAULES plurimi, pedales, angulati.

RAMI consimiles, divisi.

FOLIA alterna, nonnulla inferiora et superiora opposita, oblonga, integerrima, rugosa, venosa, petiolata.

PEDUNCULI laterales terminalesque, polystachyi.

SPICAE aggregatae, breves, parum reflexae.

CALYX quinquepartitus: laciniis subulatis, erectis.

FLORES secundi, gemino ordine alternantes.

COROLLA parva, albicans.

ANTHERAE subsessiles, medio tubi affixae, ovatae, acutae.

SEMINA duo, ovata, parum compressa, bilocularia, nonnulla unilocularia.

HABITAT in aridis *Tarmae* et *Cheuchin*.

FLORET Januario, et Febuario.



*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem scissa cum staminibus. 5 Pistillum. 6 Calyx cum seminibus. 7 Semina. 8 Semen transversim sectum.

*HELIOTROPIUM LANCEOLATUM.* Ic. CXI. *Fig. a.*

9. H. foliis lanceolatis, caule fruticoso, spicis terminalibus dichotomo-corymbosis.

PLANTA fruticosa, hispidula.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI angulati, in corymbum ferè digesti.

FOLIA alterna, nonnulla opposita, breviter petiolata, lanceolata, integerrima, venosissima, rugosa, sublineata, aspera.

PEDUNCULI terminales, longi, tenues, dichotomo-corymbosi.

SPICAE pollicares, in flore revolutae, in fructu erectae.

FLORES secundi, gemino ordine alternantes.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* subulatis, erectis, corollâ duplo brevioribus.

COROLLA dilutè caerulea.

SEMINA quatuor, unilocularia.

*HABITAT* in nemoribus *Pillao* et *Huanuci*.

*FLORET* Majo, Junio et Julio.

*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem scissa cum staminibus. 5 Pistillum.

*HELIOTROPIUM CURASSAVICUM.*

10. H. foliis lineari-lanceolatis carnosis aveniis glaucis, caule procumbente, spicis solitariis et conjugatis.

*HELIOTROPIUM (curassavicum).* LINN. *sp. pl.* p. 382.

*HELIOTROPIUM (indicum)* procumbens glaucophyllon, floribus albis. PLUKEN. *Almag. tab.* 36. *fig.* 3.

*HELIOTROPIUM* maritimum minus folio glauco, flore albo. SLOAN. *Hist.* 1. p. 213. t. 132. f. 12.

PLANTA herbacea, glabra, carnosa, glauca.

CAULES plurimi, procumbentes, subteretes, ramosissimi.

RAMI consimiles.

FOLIA sparsa, sessilia, lineari-lanceolata, supernè latiora, integerrima, avenia, obtusa.

SPICAE terminales lateralesque, conjugatae, aliquando ternae, quaternae et solitariae, apice revolutae, 1-2-3 pollicares.

FLORES secundi, sessiles, gemino ordine alternantes.

CALYX in fructu patens: in flore erectus.

COROLLA alba, calyce paulo longior.

SEMINA quatuor, ovata, obsolete angulata, unilocularia.

*HABITAT* in maritimis *Limae*, *Lurin* et *Chancay* locis.

*FLORET* toto anno, et praesertim Januario, et Februario.

LITHOSPERMUM. LINN. *Gen. pl.* pag. 99.

*LITHOSPERMUM AGGREGATUM.*

1. L. foliis ovatis obtusis rugosis, caule prostrato, floribus aggregatis.

PLANTA herbacea, pubescens, annua.

RADIX fusiformis, tenuis, fibrillosa.

CAULIS prostratus, teres, ramosus.

RAMI consimiles.

FOLIA opposita, conferta, breviter petiolata, ovata, obtusa, rugosa, integerrima, sursum spectantia.

FLORES aggregati, subsessiles, secundi, minimi.

COROLLA alba, quinquefida: *laciniis* aequalibus.

SEMINA duo, ovata, laevia, hinc plana, inde convexa.

*HABITAT* in collibus aridis *Tarmae* et *Huanuci*.

*FLORET* Decembri, et Januario.

*LITHOSPERMUM MURICATUM.*

2. L. seminibus muricatis, corollis calycis longitudine, floribus lateralibus rameisque, foliis lanceolato-linearibus.

PLANTA herbacea, pubescens, annua.

CAULES plurimi, semipedales, prostrati, teretes.

FOLIA lanceolato-linearibus oblongaque, integerrima, utrinque saepius obtusa: *inferiora* opposita, *superiora* alterna.

FLORES laterales rameique, sessiles.

CALYCES in fructu expansi.

COROLLA alba, longitudine calycis. *Faux* patens.

SEMINA muricata.

*HABITAT* in ruderalis et parietibus *Conceptionis Chile*.

*FLORET* Octobri, et Novembri.

*LITHOSPERMUM TINCTORIUM.* ICON. CXIV. *Fig. b.*

3. L. seminibus rugosis, corollis calycem superantibus, foliis lineari-lanceolatis, floribus lateralibus solitariis.

PLANTA herbacea, pilosa, hinc inde purpurea.

RADIX tenuis, fusiformis.

CAULES plurimi, palmares, procumbentes, teretes, filiformes: *intermedius* erectus, divisus.

FOLIA alterna, lineari-lanceolata, integerrima.

FLORES laterales, solitarii, breviter pedicellati.

CALYX in flore erectus, in fructu clausus.

COROLLA alba, calycem superans.

SEMINA rugosa.

*HABITAT* in arenosis *Conceptionis Chile* et *Sancti Jacobi*.

*FLORET* Octobri, et Novembri.

*Obs.* Planta inter papyros asservata, violaceo colore eas inficit.

*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem scissa cum staminibus. 5 Pistillum. 6 Semina in calyce. 7 Semen.

*LITHOSPERMUM INCANUM.*

4. L. foliis cuneiformibus, floribus axillaribus solitariis, seminibus nitidis.

PLANTA herbacea, incana, annua.

RADIX fusiformis, fibrillosa.

CAULES plurimi, prostrati, teretes.

FOLIA sparsa, sessilia, cuneiformia, acuminata, integerrima.

FLORES axillares, solitarii, sessiles.

COROLLA alba. *Faux* pervia.



SEMINA quatuor, ovata, acuminata, nitida.

HABITAT in *Peruviae* collibus aridis versus *Tarmae* oppidum.

FLORET Januario, et Febuario.

*LITHOSPERMUM HISPIDUM.*

5. L. seminibus rugosis, foliis lanceolatis sessilibus, spicis apice revolutis.

PLANTA herbacea, hispida, albicans, annua.

RADIX fusiformis, fibrillosa.

CAULES plurimi, pedales, assurgentes, subangulati: *intermedius* erectus.

FOLIA sparsa, sessilia, lanceolato-linearia, acuta, integerrima, granulis albis utrinque adspersa.

SPICAE longae, apice revolutae.

FLORES secundi, subsessiles, in fructu pedicellati.

CALYX quinquepartitus.

COROLLA infundibuliformis, lutea. *Tubus* longitudine calycis. *Faux* pervia, nuda. *Limbus* 5 partitus.

STYLUS filiformis, longitudine tubi. *Stigma* capitatum, emarginatum.

SEMINA quatuor, ovata, acuta, rugosa.

HABITAT in *Peruviae* saxosis versus *Cheuchin* Provinciae *Caxatambo* vicum.

FLORET Aprili, et Majo.

*LITHOSPERMUM DICHOTOMUM.* ICON. CXI. Fig. c.

6. L. seminibus laevibus, caule prostrato, foliis oblongo-obovatis lineatis rugosis, floribus congestis.

PLANTA suffruticosa, hispidula, incana.

RADIX ramosa, extus atra.

CAULIS prostratus, dichotomus, geniculatus, fragilis, lignosiusculus, teres.

FOLIA congesta, inaequalia, petiolata, oblongo-obovata, lineata, ferè plicata, rugosa, marginibus reflexis, valde aspera, exsucca.

FLORES congesti, sessiles, totidem foliolis minimis distincti.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* lanceolatis, acutis, aequalibus: inferus, persistens.

COROLLA violacea, infundibuliformis. *Tubus* sensim ampliatus, calyce paulò longior. *Faux* pervia, nuda. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* ovatis emarginatis.

FILAMENTA quinque, filiformia, longitudine corollae, faucibus inserta. *Antherae* oblongae, biloculares.

GERMINA quatuor. *Stylus* filiformis, staminibus longior. *Stigmata* duo, simplicia.

SEMINA quatuor, ovata, exterius convexa, interius concava, glabra, colore cinereo-fusco variegata.

Obs. Semina saepius tria tantum adolescunt.

HABITAT in *Peruviae* arenosis, versus *Lurin*, prope castrum *Pachacamac*.

FLORET Januario, et Febuario.

VERNACULE *Tiquil-tiquil*.

Tom. II.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus. 4. Eadem scissa cum staminibus. 5 Pistillum. 6 Semina.

MYOSOTIS. LINN. Gen. pl. pag. 99.

*MYOSOTIS GRANULOSA.*

1. M. seminibus granulosis, foliis linearibus hispidis punctis albicantibus, floribus secundis.

PLANTA herbacea, hispida, punctis albicantibus, è quibus setae prodeunt.

RADIX fusiformis, fibrillosa.

CAULIS erectus, bipalmaris, supernè parum ramosus, teres.

RAMI alterni ferè in corymbum.

FOLIA alterna, sessilia, linearia, obtusa, integerrima.

FLORES in spicam apice revolutam, secundi.

CALYCES hirsutissimi.

COROLLA alba, calyce duplò longior.

SEMINA quatuor, ovata, granulosa.

HABITAT in arenosis *Limae* et *Chancay*.

FLORET Julio, et Augusto.

*MYOSOTIS CORYMBOSA.*

2. M. seminibus laevibus, foliis linearibus acutis, caulibus divaricatis, floribus corymbosis.

PLANTA herbacea, leviter hispida, annua.

RADIX fasciculata, capillaris.

CAULES nonnulli procumbentes, 2-3 palmares, divaricati, teretes: *intermedius* erectus.

RAMI supernè furcati.

FOLIA sparsa, sessilia, linearia, acuta, integerrima, angusta.

FLORES terminales in corymbum saepè furcatum, tandem spicati.

COROLLA calyce triplò major, alba, fauce clausa.

SEMINA quatuor, laevia.

HABITAT in campis *Conceptionis Chile*.

FLORET Majo, Junio et Julio.

*MYOSOTIS HUMILIS.*

3. M. seminibus rugosis, foliis linearibus, caulibus brevibus, floribus lateralibus secundis.

PLANTA herbacea, hispida, annua.

RADIX fusiformis, fibrillosa.

CAULES plurimi, palmares, procumbentes: *intermedius* erectus.

FOLIA sparsa, sessilia, linearia, integerrima.

FLORES laterales, secundi, sessiles, in fructu breviter pendunculati.

COROLLA alba, fauce clausa.

SEMINA quatuor, rugosa.

HABITAT in *Peruviae* campis versus *Pillao* vicum.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

*MYOSOTIS GRACILIS.*

4. M. seminibus echinatis glochidibus, foliis linearibus,

B



caulibus gracilibus, floribus lateralibus laxè spicatis secundis.

PLANTA herbacea, hispidiuscula, annua.

RADIX fibrosa, capillaris.

CAULES nonnulli, procumbentes, filiformes, graciles, parum divisi.

FOLIA alterna, sessilia, linearia, integerrima.

FLORES laterales, secundi in spicam laxam.

COROLLA alba, fauce clausa.

STIGMA simplex, obtusum.

SEMINA quatuor, echinata, echinis glochidatis.

HABITAT in *Conceptionis Chile* campis et collibus.

FLORET Aprili, et Majo.

### CYNOGLOSSUM. LINN. *Gen. pl. pag. 100.*

#### CYNOGLOSSUM DECURRENS.

1. C. foliis lanceolatis decurrentibus venosis, caule anguloso alato.

PLANTA herbacea, hispida, aspera, annua.

CAULIS erectus, angulatus, subalatus, ramosus.

RAMI alterni, consimiles.

FOLIA alterna, decurrentia, lanceolata, acuta, integerrima, nervosa.

PEDUNCULI axillares, laterales terminalesque, racemosospicati, longi.

FLORES secundi, breviter pedicellati, distantes.

COROLLA albo-caerulea, subcampanulata.

SEMINA echinata, aristis glochidatis.

HABITAT in nemoribus *Conceptionis Chile* ad *Gavilan* paludem et *Palomares* tractus.

FLORET Augusto, et Septembri.

#### CYNOGLOSSUM PILOSUM. ICON. CXI. Fig. b.

2. C. foliis linearibus, floribus solitariis foliis alternantibus.

PLANTA bipalmaris, pilosa, incana, annua.

RADIX fibrosa, tenuis, albida.

CAULIS erectus, teres, divisus, filiformis.

FOLIA alterna, sessilia, linearia, integerrima.

PEDUNCULI foliis alternantes, solitarii, brevissimi, uniflori.

CALYX patentissimus: *laciniis* acutis.

FRUCTUS cristatus, uncinatus.

HABITAT in *Cercado* et *Chanay* Provinciis locis aridis, versùs *Limae* et *Arnedo* tractus.

FLORET Octobri, et Novembri.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem cum staminibus scissa. 5 Pistillum. 6 Semina.

#### CYNOGLOSSUM REVOLUTUM.

3. C. staminibus corollâ brevioribus, corollis calyce duplò longioribus, foliis lanceolatis; caulinis sessilibus.

PLANTA herbacea, hispida, tripedalis, annua.

RADIX fibrosa, pallescens.

CAULIS erectus, ramosus, angulatus.

RAMI alterni, consimiles.

FOLIA *radicalia* longè petiolata, lanceolata, acuta, integerrima; *caulina* alterna, sessilia, consimilia.

PEDUNCULI laterales, uniflori, cernui, in racemum subspicatum, apice revolutum.

COROLLA albo-caerulea. *Faux* squamulis quinque clausa.

SEMINA quatuor, echinato-hamosa.

HABITAT passim in *Huassahuassi* umbrosis.

FLORET Decembri, et Januario mensibus.

#### CYNOGLOSSUM PAUCIFLORUM.

4. C. foliis lanceolatis infernè angustatis, pedunculis subseptemfloris.

PLANTA herbacea, densè hispida, canescens, annua.

CAULIS erectus, teres, infernè divisus.

FOLIA lanceolata, infernè angustata, integerrima: *inferiora* sparsa; *superiora* alterna, remota.

PEDUNCULI axillares, solitarii, longitudine ferè foliorum, subseptemflori.

FLORES breviter pedicellati.

COROLLA calyce duplò longior.

HABITAT in *Conceptionis Chile* campis et arvis.

FLORET Octobri, et Novembri mensibus.

#### CYNOGLOSSUM LINEARE.

5. C. canescens, foliis linearibus, floribus solitariis oppositifoliis, seminibus dentatis.

PLANTA herbacea, subpalmaris, incana, annua.

RADIX fibrosa, albidiuscula.

CAULIS filiformis, parum divisus, teres.

FOLIA linearia, sessilia, integerrima.

PEDUNCULI solitarii, oppositifolii, breves, uniflori, in flore erecti, in fructu reflexi.

COROLLA alba.

HABITAT in *Sancti Jacobi Chilensis* campis aridis.

FLORET Septembri, et Octobri.

### NOLANA. LINN. *Gen. pl. pag. 104.*

#### CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* quinqueangulare, quinquefidum: *laciniis* cordato-ovatis; inferum, persistens.

COR. campanulata, calyce duplò major. *Tubus* quinqueangularis, striatus, brevis, intus hirsutus. *Limbus* patens, subquinquelobus, plicatus.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, tubo infra faucem inserta, corollâ breviora, parum declinata, basi hirsuta. *Antherae* erectae, sagittatae, subtrigonae, compressiusculae.

PIST. *Germina* quinque, connata. *Stylus* unicus, cylindricus, longitudine ferè staminum. *Stigma* capitatum, obsolete pentagonum.

PERIC. pentaspermum: *Calyx* in sinu semina fovens.

SEM. quinque, receptaculo carnosio coalita, epidermide succulentâ vestita, oblongo-subtrigona, latere interiori quadripunctata, exsucca, quadrilocularia.



*Obs.* Seminum *Loculamenta* 1-2-3ve saepe abortiunt. Unum alterumve *Semen* 5loculare invenitur. In quibusdam floribus *Germina* sex; in nonnullis 1-2ve abortiunt. In *Nolana coronata*: *Calyx* 5angulatus, profunde 5fidus, in fructu ferè bipartitus; *laciniis* subcordatis acutis: *Faux* corollae pulchre villis coronata. In *Nol. bipartita*: *Calyx* 5gonus, 5fidus, in fructu bipartitus; *laciniis* obovato-spathulatis: *Antherae* quadrisulcae: *Stylus* infernè quinque-angularis: *Stigma* capitato-pentagonum: *Semina* triangulari-cordata. In *Nol. ventricosa et conferta*: *Calyx* ventricosus, 5fidus; *laciniis* ovatis, acutis.

*NOLANA PROSTRATA.*

1. *N.* caule prostrato, foliis ovato-oblongis, calycibus pyramidalibus; *laciniis* triangulari-sagittatis.

*NOLANA (prostrata)*. LINN. *Sp. pl. tom. 1. p. 407.*

*PLANTA* succosa, sesquipedalis, annua.

*RADIX* ramosa, fibrosa.

*CAULIS* prostratus, ramosissimus, angulatus, nitidiusculus, leviter villosus, flexuosus, purpurascens.

*RAMI* assurgentes, consimiles.

*FOLIA* alternatim gemina, altero minori, petiolata, ovato-oblonga, utrinque attenuata, integerrima, carnosa, glabra, subundulata.

*PETIOLI* foliis duplò breviores, subcompressi, supra plani, subtus convexiusculi, villosi-ciliati.

*PEDUNCULI* interfoliacei, solitarii, uniflori, erecti, teretes, foliis breviores, glabri.

*CALYCES* pyramidales, acute pentagoni, quinquefidi: *laciniis* triangulari-sagittatis, erectis.

*COROLLA* caerulea, calyce duplò longior. *Faux* striis purpureo-violaceis.

*STAMINA* violacea, basi hirsuta. *Antherae* caeruleae, sagittatae.

*SEMINA* ovata, nigra, extus convexa, intus punctis quatuor notata.

*HABITAT* in *Peruviae* locis maritimis arenosis, passim ad *Cercado* et *Chanca* Provincias.

*FLORET* Junio, Julio et Augusto.

*VERNACULE* *Chaves* dicitur.

*Usus*: Cibus gallinis jucundus.

*NOLANA CORONATA*. ICON. CXII. *Fig. b.*

2. *N.* caule prostrato, foliis subdeltoideis ovatisque, calycis laciniis subcordatis, fauce corollae villosissimâ.

*PLANTA* herbacea, succosa, annua.

*RADIX* fusiformis, fibrillosa.

*CAULIS* prostratus, ramosissimus, teres, villosiusculus.

*RAMI* consimiles.

*FOLIA* alterna, longè petiolata, oblique cordato-ovata, utrinque nitida, villosiuscula, integerrima.

*PETIOLI* villosiusculi, foliis longiores.

*PEDUNCULI* axillares, solitarii, uniflori, foliis saepe longiores.

*CALYX* 5angulatus, 5fidus: *laciniis* subcordatis, in fructu ferè bipartitus.

*COROLLA* calyce triplò major, in emarcidatione purpurascens, infernè alba, supernè caerulea. *Faux* villis pulchre coronata.

*SEMINA* oblongo-reniformia, obsolete trigona, interiori latere exsucca, exteriori carnosa.

*HABITAT* in arenosis et saxosis collibus Provinciae *Camanae*, versus *Pongo* et *Atiquipa* vicos, ubi Joannes Tafalla eam observavit, et inde iconem et descriptionem nobiscum communicavit.

*FLORET* Junio, Julio et Augusto.

*Explic. Icon.* 1 Corolla scissa stamina ostendens. 2 Pistillum. 3 Semina.

*NOLANA SPATHULATA*. ICON. CXIII. *Fig. a.*

3. *N.* caule erecto, foliis cordato-triangularibus obliquis, calycibus in fructu bipartitis: laciniis spathulatis.

*PLANTA* pubescens, pedalis, annua.

*RADIX* ramosa, fibrosa.

*CAULIS* erectus, ramosus, teres.

*RAMI* consimiles, supernè angulosi.

*FOLIA* alternatim gemina, petiolata, repanda, cordato-obliqua, basi inaequalia, integerrima, carnosa.

*PETIOLI* hirsuti, canaliculati.

*PEDUNCULI* interfoliacei, solitarii, uniflori, foliis breviores.

*CALYCES* pentagoni, hirsuti, in fructu bipartiti.

*COROLLA* albo-purpurea. *Tubus* intus hirsutus.

*ANTHERAE* caeruleae.

*STYLUS* basi pentagonus. *Stigma* capitatum, subpentagonum.

*SEMINA* quadrilocularia.

*HABITAT* in *Peruviae* collibus ad *Camanae* Provinciam, in *Pongo* et *Atiquipa* arenosis locis, undè Joannes Tafalla nobis iconem et descriptionem misit.

*FLORET* Junio, et Julio.

*Explic. Icon.* 1 Stamina tubo corollae inserta. 2 Pistillum. 3 Semina.

*NOLANA INFLATA*. ICON. CXII. *Fig. a.*

4. *N.* caule prostrato, foliis radicalibus petiolatis ovato-lanceolatis, calycibus inflatis.

*PLANTA* pedalis, succosa, annua.

*RADIX* ramosa, fibrillosa.

*CAULIS* prostratus, infernè ramosus, angulatus, purpurascens.

*RAMI* consimiles.

*FOLIA* pubescentia, repanda: *radicalia* longè petiolata, bipalmaria, ovata, integerrima, rarius dentata: *caulina inferiora* alterna, breviter petiolata, basi inaequalia, subobliqua; *superiora* gemina, brevius petiolata, ovato-cordata, integerrima.

*PANICULA* terminalis, foliosa.



PEDUNCULI laterales, solitarii, uniflori, foliis longiores, purpurei.

CALYCES ovati, ventricosi, quinquefidi, striati.

COROLLA albo-violacea, calyce triplò longior.

ANTHERAE caeruleae.

SEMINA quadrilocularia.

HABITAT in collibus arenosis *Camanae* ad *Pongo* et *Atiquipa* tractus, undè Tafalla iconem et descriptionem misit.

FLORET Junio, et Julio.

*NOLANA REVOLUTA*. ICON. CXIII. Fig. b.

5. N. caule procumbente, foliis confertis oblongo-linearibus marginibus revolutis, calycibus ventricosis.

PLANTA succosa, semipedalis, annua.

RADIX ramosa, fibrosa.

CAULES plures, procumbentes, ramosi, angulati, albicantes.

RAMI consimiles.

FOLIA gemina, altero majori, oblongo-linearia, integerrima, crassiuscula, subtus albida, marginibus revolutis, sessilia.

PEDUNCULI axillares terminalesque, solitarii, uniflori, foliis breviores.

CALYCES ovati, ventricosi, quinquefidi: *laciniis* lanceolatis.

COROLLA caeruleo-violacea, calyce triplò longior.

HABITAT in *Peruviae* arenosis locis ad *Camanae* Provinciam, undè Tafalla iconem nobis misit.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

#### HABITUS.

*Plantae* herbaceae succosae. *Caules* infernè ramosissimi, ut plurimum prostrati. *Folia superiora* gemina, altero minori: *radicalia* et nonnulla *inferiora* solitaria. *Flores* interfoliacei aut laterales, facie *Convolvuli*.

ALDEA. *Gen. pl. Flor. Per. et Chil.* pag. 19.

ALDEA PINNATA. ICON. CXIV. Fig. a.

1. A. foliis pinnatis, superioribus simplicibus.

PLANTA pedalis, hirsuta, annua.

RADIX fusiformis, tenuis, fibrillosa.

CAULES plures, erecti, simplices, teretes.

FOLIA alterna; *inferiora* longè petiolata, impari-pinnata; *foliolis* sessilibus, lanceolatis, integerrimis; intimis minoribus; *superiora* simplicia, lanceolata, integerrima, breviter petiolata.

PEDUNCULI alterni, terminales, bispicati, subcorymbosi.

SPICAE binae, apice revolutae, semipalmares, aequales.

FLORES secundi, breviter pedicellati.

COROLLA calyce paulò longior, purpurascens, aut alba, ad angulos leviter pubescens: *laciniis* subrotundis.

FILAMENTA ad medium incrassata, è medio ad apicem villosa. *Antherae* incumbentes, biloculares.

STYLUS semibifidus, staminum longitudine.

CAPSULA hirsuta, bivalvis: *valvulis* ovatis, acutis, internè receptaculo tenui longitudinaliter à basi ad apicem decurrente.

SEMINA punctata; saepè unicum adolescit, alterum abortit.

HABITAT in arenosis *Conceptionis Chile* et in *Peruvia* ad *Cheuchin* Provinciae *Caxatambo* vicum.

FLORET Novembri in Regno Chilensi, et in *Cheuchin* mense Aprili.

VERNACULE in Chile *Champa*.

USUS: Folia ad atramentum conficiendum valent.

Obs. Cl. Dombey, qui Pericarpium immaturum offendit, semina quatuor descripsit.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus. 4 Eadem scissa. 5 Pistillum. 6 Capsula cum calyce. 7 Eadem aperta. 8 Semina.

ANAGALLIS. LINN. *Gen. plant. pag.* 110.

ANAGALLIS OVALIS. ICON. CXV. Fig. a.

1. A. foliis ovalibus cum brevi acumine, caule erecto, floribus subsessilibus.

PLANTA pusilla, vix palmaris, annua.

RADIX fibrosa, albidiuscula.

CAULIS angulatus, parum ramosus.

FOLIA sparsa, sessilia, ovalia cum brevi acumine, glabra, integerrima.

FLORES axillares, solitarii, subsessiles.

COROLLA minima.

HABITAT in *Peruviae* collibus arenosis ad *Cercado* et *Chancay* Provincias.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Capsula. 6 Eadem circumscissa. 7 Semina.

NAVARRETIA. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil.* p. 20.

NAVARRETIA INVOLUCRATA.

1. N. foliis pinnato-multifidis, *laciniis* lineari-subulatis, bracteis multifidis.

PLANTA herbacea, semipedalis, annua.

RADIX fibrosa, albidiuscula.

CAULIS erectus, teres, pubescens, parum divisus.

FOLIA sessilia, alterna, pinnato-multifida; *laciniis* lineari-subulatis.

FLORES in capitulum involucreatum collecti, bracteis distincti.

INVOLUCRI *Foliola* et *Bracteae* multifidae.

COROLLA purpurea.

HABITAT in Chile umbrosis et stagnatis ad *Huilquilemu*, in Provincia *Rere*, alias *Estancia del Rey*.

FLORET Decembri, et Januario.



SESSEA. *Gen. pl. Flor. Per. et Chil. pag. 21.*  
 ICON. XXXIII.

SESSEA STIPULATA. ICON. CXV. Fig. b.

1. S. foliis lanceolatis cordatisque, racemis paniculatis.  
 FRUTEX foetidus, orgyalis (*Cestri* habitu).  
 CAULIS erectus, ramosus, teres.  
 RAMI teretes, erecti.  
 FOLIA alterna, petiolata, saepius lanceolata cordataque;  
 aliquando oblonga ovataque, integerrima, supra glabra,  
 subtus lanuginosa, albicantia.  
 STIPULAE axillares, auriculaeformes, subcordatae, oppo-  
 sitae, ad latus reclinatae, deciduae.  
 RACEMI terminales, erecti, subpaniculati, lanuginosi.  
 PEDUNCULI corymbosi, compositi.  
 FLORES sessiles; *bracteolis* subulatis, deciduis suffulti.  
 CALYX lanuginosus.  
 COROLLA lutea, lanuginosa.  
 HABITAT in *Peruviae* montibus *Huanuci* locis frigidis ad  
*Nauyan* praedium, et *Rondos* vicum.  
 FLORET Junio, et Julio.  
 Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem  
 scissa cum staminibus. 5 Stamen. 6 Pistillum. 7 Capsu-  
 la. 8 Eadem aperta. 9 Receptaculum seminum. 10 Se-  
 mina.

SESSEA DEPENDENS. ICON. CXVI.

2. S. foliis cordato-oblongis, racemis longissimis pendulis.  
 ARBOR quinqueorgyalis, parum frondosa.  
 TRUNCUS erectus, cinereus.  
 RAMI teretes, penduli: *teneri* flexuosi.  
 FOLIA sparsa, petiolata, cordato-oblonga, acuta, integer-  
 rima, subtus valde pulverulenta.  
 PETIOLI subtus bisulci, supra pulverulenti, sulcati.  
 STIPULAE nullae.  
 RACEMI terminales, longissimi, dependentes.  
 FLORES terni, sessiles.  
 CALYX pulverulentus.  
 COROLLAE *Tubus* niger. *Limbus* luteus, extus pubescens.  
 CAPSULAE nigrae.  
 HABITAT in *Peruviae* ripis ad *Huassahuassi*, Provinciae  
*Tarmae* vicum.  
 FLORET Novembri, Decembri et Januario.  
 VIRE: Utraque Species vi anodinâ et emollienti pollet.  
 Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem  
 scissa cum staminibus. 5 Stamen. 6 Pistillum. 7 Capsula  
 cum calyce. 8 Eadem aperta. 9 Receptaculum. 10 Semina.

SPIGELIA. LINN. *Gen. plantar. pag. 110.*

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *laciniis* subulatis; in-  
 ferum, persistens.  
 COR. infundibuliformis. *Tubus* calyce longior, basi angus-  
 Tom. II.

tior. *Limbus* quinquefidus: *laciniis* ovatis, patentibus.  
 STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, medio tubi inserta.  
*Antherae* ovatae, inclusae, erectae, biloculares.  
 PIST. *Germen* didymum, disco minimo, persistenti insidens.  
*Stylus* simplex, subulatus, longitudine staminum, persis-  
 tens. *Stigma* truncatum, leviter concavum, linea trans-  
 versali notatum.  
 PER. *Capsula* didyma, obcordata, bilocularis, quadrivalvis.  
 SEM. plura, oblonga. *Receptacula* globosa.

SPIGELIA ANTHELMIA.

1. S. foliis inferioribus oppositis: superioribus quaternis, flo-  
 ribus spicatis secundis.  
 SPIGELIA (*anthelmia*) caule herbaceo, foliis summis  
 quaternis. LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag. 425.*  
 ANTHELMIA quadriphylla spicis terminalibus et è  
 centro frondis. BROWN. *jam. 156. tab. 37. fig. 3.*  
 PLANTA herbacea, pedalis, glabra.  
 RADIX ramulosa, fibrosa.  
 CAULIS simplex, obsolete tetragonus, erectus, terminatus ra-  
 mis quatuor divergentibus, subaequalibus.  
 RAMI consimiles: aliquando duo ex axillis paris supremi fo-  
 liorum.  
 FOLIA breviter petiolata, oblonga ovataque, integerrima,  
 venosa: *inferiora* opposita, ut plurimum paria quatuor:  
*terminalia* quaterna.  
 SPICAE terminales, solitariae, bipalmares, apice nutantes.  
 FLORES unilaterales, secundi, sessiles, *bracteolâ* subulatâ  
 stipati.  
 CALYX corollâ duplò brevior, leviter pubescens.  
 COROLLA alba.  
 CAPSULA pallescens.  
 SEMINA fulvescentia.  
 HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Huancabamba* fluvium  
 et in ruderalis *Pozuzo*.  
 FLORET Augusto, et Septembri.

CONVOLVULUS. LINN. *Gen. pl. pag. 116.*

CONVOLVULUS CYMOSUS. ICON. CXVII. Fig. b.

1. C. foliis cordatis integerrimis, caule filiformi, peduncu-  
 lis multifloris umbellato-cymosis.  
 PLANTA volubilis.  
 CAULIS ramosissimus, filiformis, pilosiusculus, pilis de-  
 ciduis.  
 RAMI consimiles.  
 FOLIA alterna, longè petiolata, cordata, acuta, integerri-  
 ma, supra nitida.  
 PEDUNCULI axillares, solitarii, bifidi, 5-11 flori.  
 PEDICELLI inaequales, *bracteolis* subulatis fulti.  
 FLORES umbellato-cymosi.  
 COROLLA lactea.  
 HABITAT in *Peruvia* ad *Pozuzo* versuras.  
 FLORET Septembri, et Octobri.  
 Explic. Icon. 1 Pistillum.



*CONVOLVULUS SECUNDUS*. ICON. CXVII. Fig. a.

2. C. foliis cordatis acuminatis integerrimis, pedunculis secundis longissimis, floribus umbellatis.

PLANTA herbacea, prostrata, pubescens.

RADIX ramosa.

CAULES teretes, diffusi, ramosi.

RAMI consimiles.

FOLIA breviter petiolata, cordata, integerrima, acuminata emarginataque, subtus albicantia.

PEDUNCULI foliis duplò longiores, erecti, secundi, teretes, apice incrassati, multiflori, subumbellati.

PEDICELLI bracteolis subulatis, persistentibus stipati.

COROLLA caerulea.

HABITAT in Peruviae collibus arenosis versùs Pongo et in Lurin circuitu ad Pachacamac tractum.

FLORET Decembri, et Januario.

VULGO Campanillas de Lomas.

Explic. Icon. 1 Pistillum.

*CONVOLVULUS SEPIUM*.

3. C. foliis sagittato-hastatis posticè obtusis acutisque, pedunculis tetragonis unifloris, involucro diphylo cordato.

*CONVOLVULUS (sepium)* foliis sagittatis posticè truncatis, pedunculis tetragonis unifloris. LINN. Sp. pl. pag. 434.

PLANTA volubilis.

HABITAT in segetibus et sepibus Limae, Surco et Lurin.

FLORET Januario, Febuario et Martio.

VULGO Campanillas blancas.

Obs. Folia sagittata, sed plerumque sagittato-hastata. Pedunculi solitarii, aliquando gemini, uniflori.

*CONVOLVULUS CRENATIFOLIUS*. Ic. CXVIII. Fig. a.

4. C. foliis sagittatis crenatis, pedunculis longis, floribus umbellatis.

PLANTA volubilis, pubescens, annua.

CAULIS teres, ramosus.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, petiolata, sagittata, acuta, crenata, nonnulla è medio ad apicem integerrima.

PEDUNCULI axillares, longi, umbellati, involucrati, 5-11 flori, teretes, supernè incrassati.

PEDICELLI bracteolis subulatis, parvis suffulti.

COROLLA apice pilosa.

HABITAT in Chancay et Huanuci collibus.

FLORET Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Stamina tubo corollae inserta. 2 Pistillum.

*CONVOLVULUS HERMANNIAE*.

5. C. foliis cordato-sagittatis subhastatisque obtusis crenato-sinuatis; nonnullis integerrimis, pedunculis bifloris.

*CONVOLVULUS (hermanniae)* foliis subhastatis posticè obtusis, corollis apice pilosis, pedunculis bifloris. L'HERIT. Stirp. nov. fasc. 4. pag. 67. tab. 33.

PLANTA herbacea, volubilis, sericea, incana, grisei coloris, carnosa.

RADIX fusiformis.

CAULIS volubilis, teres, ramosus.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, petiolata, obtusa cum acumine minimo: inferiora cordato-sagittata, crenato-sinuata, angulis obtusis; superiora nonnulla sagittato-hastata, angulis posticis, obtusis acutisque, integerrima crenataque.

PEDUNCULI axillares, uniflori, plerumque biflori, rariùs triflori, bracteolis subulatis sub singulis pedicellis.

COROLLA alba, 5 fida: laciniis acutis, apice pilosis.

CAPSULA helvola.

SEMINA nigra.

HABITAT in Chancay Provinciae aridis ad Huaura oppidum.

FLORET Septembri, et Octobri.

VULGO Impertinente et Enredadera.

*CONVOLVULUS TRICOLOR*.

6. C. foliis obovatis, oblongis lanceolatisque, caule declinato, pedunculis unifloris.

*CONVOLVULUS (tricolor)* foliis lanceolato-ovatis, caule declinato, floribus solitariis. LINN. Sp. pl. tom. 1. p. 446.

PLANTA herbacea, procumbens, hirsuta, pilis foliorum utraque paginà deciduis.

CAULIS declinatus, ramis assurgentibus, teres.

FOLIA sparsa, sessilia, obovata, oblonga lanceolataque, integerrima.

PEDUNCULI axillares, solitarii, uniflori, filiformes, foliorum longitudine, supernè crassiores, in flore erecti, in fructu recurvi, ultra medium bracteolis duabus oppositis, subulatis stipati.

CALYCIS Lacinae aequales.

COROLLA in centro lutea, ad medium alba, margine caerulea.

HABITAT in Peruviae cultis et calidis locis.

FLORET Majo, et Junio.

*CONVOLVULUS MACROCALYX*. Ic. CXVIII. Fig. b.

7. C. foliis quinatis oblongo-lanceolatis integerrimis, pedunculis longissimis racemoso-dichotomis, calycibus scariosis.

PLANTA volubilis, glabra, perennis.

CAULIS ramosissimus, teres, herbaceus.

FOLIA alterna, longè petiolata, quinata: foliola oblongo-lanceolata, integerrima; intima minora.

PETIOLI basi purpurascens, contorti.

PEDUNCULI axillares, longissimi, multiflori, racemoso-dichotomi, purpurei.

PEDICELLI bracteolis duabus oppositis, subulatis, parvis stipati.

CALYCES magni, exteriùs purpurascens, in fructu patentes.



# PENTANDRIA MONOGYNIA.

11

COROLLA alba.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus versùs *Cuchero* et *Chinchao* vicos.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

Explic. Icon. 1 Pistillum.

## CONVOLVULUS BATATAS.

8. C. foliis cordatis hastatis quinquenerviis, caule repente tuberifero. LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag. 438.*

COLITUR in *Peruviano* et *Chilensi* Regno.

FLORET Junio, et Julio.

VERNACULE *Camote* nuncupatur. In Hispania *Batatas de Málaga* dicitur.

USUS: Radix edulis.

Obs. Radices colore albo, violaceo et luteo plerumque variant.

## IPOMOEAE. LINN. Gen. pl. pag. 116.

### IPOMOEAE CUSPIDATA. ICON. CXIX. Fig. a.

1. I. foliis cordatis trilobis; lobis cuspidatis, pedunculis unifloris, laciniis calycis linearibus basi hirsutissimis.

PLANTA herbacea, pilosa, annua.

RADIX fibrosa, albicans.

CAULIS erectus, filiformis, flexuosus, parum ramosus.

FOLIA longè petiolata, cordata, triloba: lobis cuspidatis; lateralibus brevibus: inferiora nonnulla cordata, integerrima.

PEDUNCULI axillares, solitarii, uniflori, petiolis breviores, teretes.

BRACTEAE duae, oppositae, subulatae ad pedunculi apicem.

CALYX dense villosus, villis aureis; laciniis linearibus, longis.

COROLLA purpurascens, ephemera.

HABITAT in *Peruviae* petrosis, passim ad *Huaura* et *Arnedo* tractus.

FLORET Julio, et Augusto.

### IPOMOEAE ACUTANGULA. ICON. CXIX. Fig. b. angulatae nomine.

2. I. foliis sagittato-triangularibus, angulis posticis dentatis, caule tereti, pedunculis tri-quinquefloris foliorum longitudine.

PLANTA herbacea, volubilis, annua.

CAULIS ramosus, filiformis, teres.

RAMI consimiles.

FOLIA longè petiolata, sagittato-triangularia, acuta: angulis posticis, dentatis.

PEDUNCULI solitarii, tri-quinqueflori.

PEDICELLI bracteis duabus subulatis, oppositis suffulti.

COROLLA coccinea, ephemera.

HABITAT in *Pozuzo* et *Chinchao* nemoribus.

FLORET Septembri, et Octobri.

Obs. Hujus et sequentis Speciei Icones aeri incisae fuerant diversis nominibus trivialibus, antequam in luce prodiret clar. Ortegae Decad. septima, quae nos eadem in

descriptionibus immutare, ne confusio inde oriretur, coegit.

### IPOMOEAE ANGULATA. ICON. CXX. Fig. b. acuminatae nomine.

3. I. foliis cordato-sagittatis acuminatis acutisque, caule angulato, pedunculis subbifloris, calycibus unguiculatis.

IPOMOEAE (angulata) foliis cordato-sagittatis acutis, caule pedunculisque angulatis, pedicellis subbifloris. ORTEGA Dec. 7. pag. 83.

PLANTA herbacea, volubilis, glabra, annua.

RADIX tenuis, fibrillosa, albida.

CAULIS infernè ramosus, angulatus, contortus, articulationibus lividis.

RAMI consimiles.

FOLIA petiolata, cordato-sagittata, integerrima, acuta acuminataque, nonnulla cordata, à medio ad basim angulata, septemnervia.

PETIOLI basi contorti, longi, canaliculati.

PEDUNCULI axillares, solitarii, petiolis longiores, angulosi, contorti, saepius biflori, interdum 1-3-5 flori.

PEDICELLI cernui, inaequales, bractea ovata, acuta suffulti, in fructu incrassati.

CALYCIS Lacinae inaequales, apicis dorso unguiculatae, nitidae, aliquando tuberculatae.

COROLLA ephemera. Tubus tenuis, calyce quadruplò longior, croceo-rubescens. Limbus coccineus, brevis, patens, rotundatus, margine revolutus.

FILAMENTA longitudine corollae, subaequalia, glabra, basi glandulifera. Antherae cordatae, obtusae, albae.

GERMEN anulo luteo, brevi cinctum. Stylus staminum longitudine. Stigma globosum.

CAPSULA pisi magnitudine, obtusè 3-4gula, 3-4locularis, saepè bilocularis.

SEMINA trigona, nigra, solitaria.

HABITAT in praeruptis et petrosis *Limae*, passim ad *Amancaes*, et in *Chancay* collibus. Colitur in Hort. Reg. Martit. è seminibus à nobis misis.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

Explic. Icon. 1 Stamina tubo corollae inserta. 2 Pistillum. 3 Capsula. 4 Semina.

### IPOMOEAE PAPIRU. ICON. CXX. Fig. a.

4. I. foliis palmatis cordatis; lobis quinque lanceolatis, pedunculis unifloris, radice tuberosa.

PLANTA volubilis, pubescens, perennis.

RADIX tuberosa, subrotunda, saepius oblonga, crassa, fibrillosa, extus fusca, intus alba.

CAULES plures, parum ramosi, filiformes.

RAMI consimiles.

FOLIA palmata, cordata; lobis quinque lanceolatis, integerrimis: intimis minoribus: intermediis denticulo unico ad basim.

PETIOLI longitudine ferè foliorum, teretes, supra parum sulcati.



PEDUNCULI axillares, breves, solitarii, uniflori, ultra medium bracteolis duabus subulatis, persistentibus stipati.

CALYCIS *Laciniae* subcordatae.

COROLLA purpurea, calyce quadruplò longior, ephemera.

HABITAT in *Tarmae* Provinciae collibus ad *Tarmatambo* et *Acobamba* tractus.

FLORET Februario, et Martio.

VERNACULE *Papiru* appellatur.

VIRES ET USUS: Radix vi drasticà pollet.

*IPOMOEAE SUBTRILOBÆ.*

5. I. foliis cordatis integerrimis subtrilobisque, pedunculis unifloris, radice tuberosa.

PLANTA volubilis, pubescens, perennis.

RADIX tuberosa, obovata.

CAULES filiformes, ramosi.

RAMI consimiles.

FOLIA cordata, integerrima subtrilobaque, acuta.

PETIOLI longitudine ferè foliorum.

PEDUNCULI axillares, solitarii, uniflori, petiolo breviores, ultra medium bracteolis duabus subulatis fulti.

COROLLA purpurea, ephemera.

HABITAT in collibus *Tarmae* et *Huassahuassi*.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERNACULE *Papiru*.

VIRES ET USUS. Radix drastica. Incolae ad alvum detergendam decocto vel infuso utuntur.

Obs. An praecedentis varietas?

*IPOMOEAE GLANDULIFERÆ. ICON. CXXI. Fig. a.*

6. I. foliis cordato-subrotundis acuminatis, pedunculis subquadrifloris incrassatis, calycibus glanduliferis.

PLANTA volubilis, hirsuta, lactifera, perennis.

RADIX fusiformis, fibrillosa, albida.

CAULIS ramosissimus, teres.

RAMI consimiles.

FOLIA longè petiolata, cordato-subrotunda, acuminata, integerrima.

PEDUNCULI axillares, solitarii, foliorum longitudine, filiformes, erecti, 3-4 flori.

PEDICELLI supernè incrassati, bracteis subulatis stipati; in fructu cernui.

CALYX granulis glanduliferis respersus: *foliolis tribus exterioribus* duplò latioribus.

COROLLÆ *Tubus* purpureus. *Limbus* caeruleo-violaceus.

FILAMENTA inaequalia, basi villosa.

STIGMA capitatum, trigonum.

CAPSULA trilocularis.

SEMINA, bina, nigra.

HABITAT in segetibus et cultis *Limae*, *Chancay* et *Huanuc*.

FLORET per totum annum.

VULGO: *Auroras*, quia flores manè explicantur.

Explic. Icon. 1 Calyx cum pistillo. 2 Capsula. 3 Eadem transversim secta.

*IPOMOEAE VILLOSA. ICON. CXXI. Fig. b.*

7. I. foliis cordatis trilobis, lobis acuminatis lateralibus extrorsum excavatis, pedunculis trifloris involucriatis.

PLANTA volubilis, hirsuta, annua.

CAULIS filiformis, ramosus.

RAMI consimiles.

FOLIA triloba; *lobo intermedio* angustiori, productioni, infernè coarctato: *lateralibus* ovatis, extrorsum excavatis.

PETIOLI longi, teretes.

PEDUNCULI solitarii, axillares, triflori.

PEDICELLI bracteolis subulatis involucriati.

CALYCES hirsutiores.

COROLLA glabra, caerulea, ephemera.

STAMINA basi villosa.

STIGMA capitatum, granulosum.

CAPSULA glabra.

HABITAT passim in *Pozuzo* et *Muña* nemoribus ad agrorum margines.

FLORET Septembri, et Octobri.

Obs. Planta affinis *Ipomoeae trilobae* Linnaei, à cujus descriptione species nostra differt, *Caule* tereti, *Foliis* villosis ut tota planta (exceptis corolla et capsula), *Corollis* infundibuliformibus, *Stigmate* capitato, granuloso, *Capsulâ* glabrâ.

*FABIANA. Gen. pl. Fl. Per. et Chil. pag. 22. ICON. XXXIV.*

*FABIANA IMBRICATA. ICON. CXXII. Fig. b.*

I. F. foliis imbricatis ovatis minimis.

FRUTEX (*Tamarisci* habitu) triorgyalis, odorem resinosum spirans.

CAULIS erectus, ramosissimus.

RAMI sparsi, teretes. *Ramuli* confertissimi, imbricati, brevissimi, foliis tecti.

FOLIA imbricata, minima, sessilia, ovata, squamaeformia, glabra, integerrima, intus concava, extus convexa.

FLORES terminales, solitarii; unicus ex apice singuli ramuli.

COROLLA albo-violacea.

CAPSULA helvoli coloris.

HABITAT in *Regni Chilensis* campis et ripis arenosis in Provinciis *Rere* et *Itatae*, et praesertim juxta fluvium *la Laxa*, et ad *Biobio* margines.

FLORET Decembri, et Januario.

VERNACULE *Pichi* nuncupatur.

VIRES ET USUS. Efficacissimum adversus *Pizguin* morbum, quo *Caprae* et *Arietes* laborant, praesidium est. *Folia* amaro sapore *Canchalaguae* haud dissimili pollent.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Eadem cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Capsula. 6 Eadem aperta. 7 Semina.



# PENTANDRIA MONOGYNIA.

13

NIEREMBERGIA. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil.*  
pag. 23.

NIEREMBERGIA REPENS. ICON. CXXIII. Fig. c.

1. N. caule repente, foliis oblongis.

PLANTA herbacea, pedalis, annua.

CAULIS ramosus, repens, tenuis, teres, filiformis.

FOLIA quinque, sex vel plura ex singulo geniculo, gradatim majora, oblonga ovataque, integerrima, leviter pilosa.

FLORES solitarii, sessiles: unicus ex singulo geniculo.

COROLLA alba. *Tubus* calyce quadruplò longior, tenuis. *Faux* lutea, 15-plicaturis. *Limbus* patulus, exterius lineis tribus purpureo-violaceis per singulas lacinias decurrentibus.

FILAMENTA quinque, subulata, brevia, inaequalia; nectario tubuloso, membranaceo, ex fauce corollae orto insidentia. *Antherae* erectae, oblongiusculae, biloculares.

HABITAT in Regni Chilensis campis, apricis et pascuis arenosis Conceptionis urbis, versùs Puntilla tractum, et Gavilan paludem.

FLORET Febuario, Martio et Aprili.

XUAREZIA. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil.* pag. 24.  
ICON. IV.

XUAREZIA BIFLORA. ICON. CXXIII. Fig. a.

1. X. foliis lanceolatis supernè serratis, floribus geminis.

CAPRARIA (peruviana). FEWILL. *Per. Obs. t. 2. pag.*  
764. pl. 48.

PLANTA fruticosa, quadripedalis, glabra.

CAULIS erectus, ramosissimus, teres.

RAMI consimiles, densi.

FOLIA sparsa, sessilia, lanceolata, acuta, angusta, acutè serrata.

PEDUNCULI axillares, gemini, altero breviori, uniflori, filiformes, breves, in flore erecti, in fructu cernui.

COROLLA albo-lutescens.

HABITAT in Peruviae arenosis ripis et argillosis locis Limae, Lurin, Huanuci et Chancay.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VERNACULE Thé del Perú.

Obs. De hoc Frutice agens P. Fewilleus asserit, ignotum in Peruvia, et neglectum fuisse ante annum M.DCC.IX, quo tempore ejus vires easdem esse ac Theae orientalis primùm innotuit usque adeo, ut Incolae illius usum, quem frequenter adhibent, hujus usui subrogaverint, neque Limae jam exterae Theae particulam invenire liceat.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla postice visa. 4 Stamina aucta. 5 Pistillum. 6 Capsula. 7 Eadem dehiscens. 8 Semina.

Tpm. II.

LISIANTHUS. LINN. *Gen. pl. pag.* III.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* campanulatum, quinquepartitum; *laciniis* ovatis, obtusis, concavis, margine membranaceis, incumbentibus: inferum, persistens.

COR. tubuloso-campanulata, calyce multò longior. *Tubus* basi coarctatus. *Faux* ampliata. *Limbus* quinquepartitus; *laciniis* rotundatis, reflexis.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, coarctationi tubi inserta, faucis longitudine. *Antherae* cordatae, versatiles, biloculares.

PIST. *Germen* ovatum, corpore glanduloso parvo cinctum. *Stylus* subulatus, staminum longitudine, persistens. *Stigma* bilobum; *laciniis* oblongis.

PER. *Capsula* ovato-oblonga, acuminata, bilocularis, bisulca, bivalvis: *valvularum* marginibus introflexis.

SEM. numerosa, oblonga, minima, compressa, subimbricata, margine minimò, membranaceo cincta. *Receptaculum* oblongum, bisulcum.

Obs. In *Lisiantho calygo*: *Calyx* quinqueangularis: *laciniis* tribus exterioribus lanceolatis; interioribus duabus subsagittatis; omnibus margine membranaceo, fimbriato cinctis: *Corolla* subringens; *laciniis* cordato-sagittatis, acuminatis, reflexis: *Antherae* cordato-sagittatae: *Capsula* ovata. In *Lis. acutangulo*: *Laciniae calycis* ovatae, concavae: *Corolla* subringens; *laciniae* subrotundae, revolutae: *Tubus* incurvatus: *Filamenta* intorta: *Antherae* oblongo-cordatae: *Capsula* oblonga. In *Lis. viscoso*: *Calycis laciniae* oblongae, concavae: *Corollae laciniae* subrotundo-cordatae, aequales, patentes: *Antherae* cordatae: *Capsula* ovato-lanceolata.

## HABITUS.

Plantae suffruticosae. Caules erecti, virgati, obtusè aut acutè tetragoni. Folia connata, petiolata aut sessilia, integerrima, crassiuscula. Flores terminales, aut ex axillis superioribus paniculati, aut corymbosi, sparsi aut secundi. Pedunculi dichotomi. Pedicelli bracteis sustentati.

## LISIANTHUS OVALIS.

1. L. foliis ovalibus aveniis breviter petiolatis, caule terti, pedunculis corymbosis dichotomis.

PLANTA suffruticosa, glabra, biorgyalis.

CAULES plures, erecti, virgati, teretes, cavi, supernè parum ramosi.

FOLIA breviter petiolata, ovalia, integerrima, nitida, avenia. PETIOLI connati.

PEDUNCULI axillares terminalesque, corymboso-dichotomi.

FLORES secundi, pedicellati.

PEDICELLI bractea stipati.

COROLLA viridi lutea.

CAPSULAE dependentes, stylo acuminatae.

HABITAT in Peruviae nemoribus per Chinchao runcationes.

FLORET Majo, et Junio.

D



*LISIANTHUS ACUTANGULUS*. ICON. CXXII. Fig. a.

2. L. foliis subsessilibus ; inferioribus cordatis ; superioribus ovatis , caule tetragono , paniculâ dichotomâ.

PLANTA herbacea , glabra.

RADIX ramosa , fibrillosa.

CAULIS erectus , ferè biulnaris , supernè dichotomus , acutè tetragonus , cavus.

RAMI consimiles.

FOLIA remota , connata , subsessilia , venosissima : *inferiora* cordata : *superiora* ovata.

FLORES terminales , paniculati , secundi , bracteâ ovatâ suffulti.

PANICULA dichotoma.

PEDUNCULI breves , supernè crassiores , uniflori.

CALYX brevis : *laciniis* ovatis , concavis.

COROLLA lutea , subringens. *Limbi lacinae* subrotundae , revolutae. *Tubus* incurvatus.

FILAMENTA intorta. *Antherae* oblongo-cordatae.

CAPSULAE oblongae , stylo acuminatae , dependentes.

HABITAT in *Panatahuarum* montibus ad *Chinchao* runcationes in locis meridionalibus.

FLORET Junio , et Julio.

Explic. Icon. 1 Corolla scissa cum staminibus. 2 Pistillum. 3 Capsula transversim secta. 4 Semina.

*LISIANTHUS CORYMBOSUS*. ICON. CXXIV.

3. L. foliis oblongo-lanceolatis petiolatis , caule tereti striato , corymbis terminalibus.

*LISIANTHUS (glaber)*. LINN. *Supp. pl. pag.* 134. SMITH.

*Icon. pl. fasc. 2. p. 29. ic. 29.*

PLANTA suffruticosa , glabra , biorgyalis.

CAULIS erectus , parum ramosus , leviter striatus , cavus.

FOLIA remota , petiolata , oblongo-lanceolata , integerrima , crassiuscula , venosissima , supra laevia , nitida.

PETIOLI breves , connati.

PEDUNCULI axillares terminalesque , corymboso-dichotomi.

PEDICELLI pollicares , supernè incrassati , bracteolâ lanceolatâ stipati.

COROLLA lutea. *Limbus* patens : *laciniis* parum deflexis.

CAPSULAE oblongae , nutantes , stylo contorto acuminatae , calyce triplò longiores.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus inter *Acomayo* et *Chinchao* ad *Pati* praedium.

FLORET Majo , et Junio.

Explic. Icon. 1 Stamina tubo corollae inserta. 2 Pistillum. 3 Semina. 4 Semen auctum.

*LISIANTHUS VISCOSUS*. ICON. CXXV.

4. L. foliis oblongis breviter petiolatis venosissimis , caule tetragono sulcato , corymbis terminalibus viscosis.

PLANTA suffruticosa , glabra , biorgyalis.

CAULIS erectus , obtusè tetragonus , supernè parum ramosus.

RAMI consimiles.

FOLIA breviter petiolata , oblonga , venosissima , integerrima , supra nitidissima : *inferiora* pedalia (*Mandragorae* facie) , leviter repanda.

PETIOLI connati.

CORYMBI terminales , magni , foliosi : *foliolis* sessilibus.

PEDICELLI breves , bracteis ovatis , recurvis sustentati.

CALYX viscosissimus , nitidus : *laciniis* oblongis , concavis.

COROLLA magna , luteo-viridis : *lacinae* subrotundo-cordatae , aequales , patentes.

ANTHERAE cordatae.

CAPSULA subpalmaris , oblonga , erecta.

HABITAT in altis locis *Muña* ad *Tambo nuevo* tractus.

FLORET Julio , et Augusto.

Explic. Icon. 1 Calyx cum pistillo. 2 Stamina tubo corollae inserta. 3 Capsula aperta. 4 Semina.

*LISIANTHUS CALYGONUS*. ICON. CXXVI.

5. L. foliis lanceolato-ovatis breviter petiolatis , caule obsoletè tetragono , pedunculis unifloris , calyce pentagono.

PLANTA suffruticosa , glabra , orgyalis.

CAULIS ramosus , obtusè tetragonus.

RAMI consimiles , vestigiis petiolorum anulati.

FOLIA breviter petiolata , conferta , lanceolato-ovata , margine parum revoluta.

PETIOLI connati.

PEDUNCULI ex axillis superioribus terminalesque , solitarii , uniflori , curvati , bracteis tribus , ovatis , acuminatis , concavis ad basim sustentati.

CALYX quinqueangularis ; *laciniis tribus exterioribus* lanceolatis ; *interioribus duabus* subsagittatis ; *omnibus* margine membranaceo , fimbriato cinctis.

COROLLA subringens , roseo-rubra , magna : *laciniis* ovatis , acuminatis , reflexis. *Antherae* cordato-sagittatae.

CAPSULA ovata , magna.

HABITAT in montibus frigidis *Acomayo* , *Muña* et *Pillao* , ad *Chacahuassi* et *Achapatumam* tractus.

FLORET Augusto , et Septembri.

Explic. Icon. 1 Stamina tubo corollae inserta. 2 Pistillum. 3 Capsula per medium secta. 4 Semina.

*LISIANTHUS REVOLUTUS*. ICON. CXXVII.

6. L. foliis lanceolatis petiolatis , marginibus revolutis , caule tetragono striato , corymbis terminalibus.

PLANTA suffruticosa , glabra , amarissima , orgyalis.

CAULIS erectus , tetragonus , striatus , supernè ramosus.

RAMI consimiles.

FOLIA breviter petiolata , integerrima , venosa , supra nitida , subtus per venas villosa , villis retroflexis , marginibus revolutis ; *inferiora* lanceolata , approximata : *superiora* remotiora , ovato-oblonga , acuminata , venis inferioribus oppositis.

PETIOLI connati.

CORYMBI axillares terminalesque , multiflori.

PEDUNCULI brachiati.

PEDICELLI breves , bracteolis lanceolatis suffulti.

COROLLA rubro-lutea , calyce 4plò longior.



*HABITAT* in montibus altis frigidis *Muña* ad *Saria* tractum.

*FLORET* Augusto, Septembri et Octobri.

*Explic. Icon.* 1 Stamina tubo corollae affixa. 2 Pistillum cum calyce. 3 Semina.

**DATURA.** LINN. *Gen. pl. pag.* 132.

*DATURA STRAMONIUM.*

1. *D.* pericarpis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis angulatis basi inaequalibus.

*DATURA* (*Stramonium*) pericarpis spinosis erectis ovatis, foliis ovatis glabris. LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag.* 497.

PLANTA herbacea, glabra, tripedalis.

RADIX fusiformis, fibrillosa.

CAULIS erectus, teres, dichotomus.

FOLIA alterna, longè petiolata, ovata, angulata, basi inaequalia.

PEDUNCULI ex dichotomiis solitarii, breves, uniflori, erecti.

COROLLA violaceo-caerulea, saepè alba.

PERICARPIUM ovatum, spinosum, erectum.

SEMINA nigra.

*HABITAT* copiosè in *Cantae*, *Limae*, et *Huanuci* versuris.

*FLORET* ferè toto anno.

*VERNACULE* *Chamíco* dicitur.

*VIRES*: Seminum pulvere ad fatuitatem inducendam Incolae abutuntur.

*DATURA ARBOREA.* ICON. CXXVIII.

2. *D.* pericarpis glabris inermibus oblongis pendulis, foliis ovato-lanceolatis oblongisque geminis, caule fruticoso.

*DATURA* (*arboorea*) pericarpis glabris inermibus nutantibus, caule arboreo. LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag.* 498.

*STRAMONIOIDES* arboreum oblongo et integro folio, fructu laevi. FEW. *Per. Obs. tom. 2. pag.* 761. *planch.* 46.

FRUTEX triorgyalis, frondosus.

CAULIS saepius unicus, erectus, teres, crassus, ramosus.

RAMI teretes, granulis adpersi, patuli.

FOLIA ovato-lanceolata, oblonga ovataque, integerrima, nonnulla sinuato-angulata, utrinque pubescentia, gemina, altero triplò breviori.

PETIOLI teretes, pollicares et ultra.

PEDUNCULI ex dichotomiis et ex axillis foliorum breviorum, solitarii, recurvi, uniflori.

FLORES penduli, longissimi, diu graveolentes, noctu verò *Moschi* odorem spirantes.

CALYX tubulosus, spathaeformis, integerrimus, usque ad medium longitudinaliter hians.

COROLLA maxima, alba, nervis tribus viridiusculis per singulas lacinias ad basim tubi longitudinaliter decurrentibus.

PERICARPIUM oblongum, bipalmare, inerme.

SEMINA fusca, trigono-truncata, depressa.

*HABITAT* in *Peruviae* hortis, versuris et septis, passim ad *Cercado*, *Chancay*, et *Huanuci* Provincias.

*FLORET* ferè toto anno.

*VERNACULE* *Floripondio*, *Campanilla* et *Almizclillo*.

*VIRES ET USUS*: Folia cum axungia suilla contusa, vi emollienti, resolutivâ et sedante pollent.

*Explic. Icon.* 1 Stamina tubo corollae inserta. 2 Pistillum. 3 Semina. 4 Capsulae dimidia pars transversim secta.

*DATURA SANGUINEA.*

3. *D.* pericarpis inermibus oblongo-cylindricis pendulis, foliis lanceolatis angulatis congestis, caule fruticoso.

FRUTEX quadriorgyalis, comâ frondosâ, hemisphaericâ.

CAULIS saepius unicus, erectus, crassus, supra ramosissimus.

RAMI teretes, fragiles, in summitatibus foliosi.

FOLIA quatuor, quinque sexve ex eodem puncto, petiolata, subtus levissimè pubescentia, supra glabra, nitida: *inferiora* ovato-lanceolata, angulata; *superiora* integerrima.

PETIOLI teretes, foliis duplò breviores.

PEDUNCULI terminales, solitarii, curvati, uniflori.

FLORES penduli, magni.

CALYCES ovati, pentagoni, variegati, pollicares.

COROLLA calyce quadruplò longior, è medio ad basim lutescens, supernè rubra, lineis quindecim longitudinalibus, sanguineis maculata.

CAPSULA oblongo-cylindrica, inermis, ferè bipalmaris, pendula.

*HABITAT* in altis, frigidis et ruderatis locis Provinciarum *Tarmae*, *Xauxae*, *Huaroheri*, *Cantae* et *Huamalies*.

*FLORET* Junio, Julio et Augusto.

*VERNACULE* *Floripondio encarnado* et *Campanillas encarnadas*.

*VIRES*: Folia contusa et Axungiae suillae mixta emolliunt, suppurant, detergunt. Semina inebriantia et narcotica sunt.

**NICOTIANA.** LINN. *Gen. pl. pag.* 133.

*NICOTIANA TABACUM.*

1. *N.* foliis lanceolato-oblongis decurrentibus, paniculâ subcorymbosâ, corollis acutis.

*NICOTIANA* (*Tabacum*) foliis lanceolato-ovatis sessilibus decurrentibus, floribus acutis. LINN. *Sp. pl. pag.* 205.

PLANTA herbacea, perennis, orgyalis et ultra, viscosa, densè hirsuta.

RADIX ramosa, fibrosissima, albicans.

CAULIS erectus, teres, supernè ramosus.

RAMI consimiles, breves.

FOLIA alterna, sessilia, integerrima: *inferiora* decurrentia, amplissima, ovato-oblonga, acuta: *superiora* lanceolata, angusta, patenti-deflexa, non decurrentia.

FLORES terminales, paniculato-corymbosi, numerosi.

PEDUNCULI axillares, tri-septemflori.

PEDICELLI bracteâ lineari-lanceolatâ, persistenti, erectâ suffulti.

CALYX oblongus, inflatus, quinquefidus: *laciniis* acutis, subaequalibus.

COROLLA infundibuliformis, calyce duplò longior. *Tubus*



angustus, curvatus, glutinosus, lutescens, hirsutus. *Faux* ampliata. *Limbus* campanulatus, roseus, quinquefidus: *laciniis* acutis, retroflexis.

**FILAMENTA** inaequalia, basi hirsuta, curvata. *Antherae* cordatae, luteae, erectae, biloculares, faucis longitudine.

**STIGMA** capitatum, lineâ transversali sulcatum, viride.

**CAPSULA** calyce semitecta, ovata, fusca.

**SEMINA** fusci coloris.

**HABITAT** copiosè in *Peruviae* locis imis, calidis, praesertim in *Andium* nemoribus, ubi colitur ad tubulos et fasciculos, vulgò *Cigarros* et *Mazos de Andullo*, conficiendos.

**FLORET** per totum annum.

**VULGO** *Tabaco verdadero*.

**NICOTIANA PANICULATA.** ICON. CXXIX. *Fig. b.*

2. N. foliis cordatis obtusis, paniculâ maximâ, corollis clavatis limbo obtuso revolutis.

*NICOTIANA (paniculata)* foliis petiolatis cordatis, integerrimis, floribus paniculatis obtusis clavatis. LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag. 503.*

*NICOTIANA (minor)* folio cordiformi, tubo floris praelongo. FEWILL. *Per. Obs. tom. 1. pag. 717. pl. 10.*

**PLANTA** herbacea, pubescens, annua.

**RADIX** ramoso-fibrosa, albidiuscula.

**CAULIS** erectus, tripedalis, simplex, teres, supernè ramulis paucis, brevibus, vix angulatis.

**FOLIA** alterna, petiolata, ampla, cordata, obtusa, valdè venosa: *superiora nonnulla* ovata; *majora* quadripalmaria.

**PETIOLI** bipollicares, supra leviter sulcati.

**PANICULA** terminalis, magna, viscosa.

**PEDUNCULI** sparsi, multiflori.

**FLORES** breviter pedicellati, bracteolâ lineari stipati.

**CALYX** ovatus, quinquedentatus: *denticulis* erectis, subaequalibus.

**COROLLA** tubulosa, calyce sextuplò longior. *Tubus* lutescens, clavatus. *Faux* coarctata. *Limbus* brevissimus, obtusus, revolutus, viridis.

**STAMINA** longitudine faucis, capillaria, basi incrassata, pubescentia. *Antherae* luteae.

**CAPSULA** ovata, acutiuscula: *valvulis* bifidis.

**SEMINA** fusca, angulata, rugosa.

**HABITAT** in *Limae*, *Chancay* et *Huanuci* versuris.

**FLORET** toto anno.

**VULGO** *Tabaco Cimarron*, id est, *Nicotiana silvestris*.

**Explic. Icon.** 1 Calyx. 2 Corolla scissa cum staminibus.

3 Pistillum. 4 Capsula aperta. 5 Semina.

**NICOTIANA GLUTINOSA.**

3. N. foliis cordatis acutis, floribus racemosis secundis, corollis subbringentibus acutis.

*NICOTIANA (glutinosa)* foliis petiolatis cordatis integerrimis, floribus racemosis secundis subbringentibus. LINN.

*Sp. pl. tom. 1. pag. 503.*

**PLANTA** herbacea, glutinosa.

**HABITAT** in petrosis locis *Limae* et *Chancay*.

**FLORET** Junio, et Julio.

**VULGO** *Tabaco Cimarron*, id est, *Nicotiana silvestris*.

**NICOTIANA TOMENTOSA.** ICON. CXXIX. *Fig. a.*

4. N. foliis lanceolatis decurrentibus subtus tomentosis, paniculâ maximâ diffusâ, corollis subbringentibus acutis.

**PLANTA** suffruticosa, triorgyalis, parum viscosa.

**CAULIS** erectus, supernè ramosus, subteres.

**RAMI** patentes, leviter angulati.

**FOLIA** sparsa, valde decurrentia, lanceolata, acuta, integerrima, subtus tomentosa, incana, supra pubescentia; venis purpureis.

**PANICULA** terminalis, maxima, patens, hirsuta, viscosa.

**CALYX** subaequalis.

**COROLLA** subbringens, glabra, purpureo-rubra. *Tubus* angustissimus, curvatus, calyce paulò longior. *Faux* ampliata. *Limbus* campanulatus, patens: *laciniis* acutis.

**STAMINA** exserta, incurvata, uti etiam Stylus.

**CAPSULA** ovata, calyce semitecta.

**SEMINA** fusca, minima, angulata, rugosa.

**HABITAT** in ruderatis et arvis *Muña* ad *Rinconada* tractum.

**FLORET** Junio, Julio et Augusto.

**VULGO** *Tabaco Cimarron*, id est, *Nicotiana silvestris*.

**NICOTIANA UNDULATA.** ICON. CXXX. *Fig. b.*

5. N. foliis lanceolatis petiolatis undulatis, racemis terminalibus, calyce bilabiato, corollis brevibus acutis.

**PLANTA** tripedalis, pubescens, viscosa, annua.

**RADIX** ramosa, fibrillosa, albicans.

**CAULIS** erectus, angulatus, supernè ramosus.

**RAMI** consimiles.

**FOLIA** alterna, petiolata, lanceolata, acutiuscula, undulata, integerrima, venosa.

**PEDUNCULI** axillares, breves, solitarii, uniflori, in racemum simplicem, foliosum, erectum, terminalem.

**CALYX** tubuloso-campanulatus, bilabiatus, quinquedentatus: *denticulo supremo* longissimo, obtuso.

**COROLLA** lutea. *Tubus* longitudine calycis. *Limbus* brevis, acutus.

**CAPSULA** calyce brevior, ovata.

**SEMINA** nigra, angulata, rugosa.

**HABITAT** in frigidis locis *Tarmae* versùs *Bombom* tractus, inter *Huariaca* et *Cerro de Yauricocha* vicos.

**FLORET** Januario, et Februario.

**VULGO** *Tabaco Cimarron de Punas*.

**Explic. Icon.** 3 Calyx. 1 Corolla cum staminibus. 2 Stamina tubo corollae inserta. 3 Pistillum. 4 Capsula aperta. 5 Semina.

**NICOTIANA ANGUSTIFOLIA.** ICON. CXXX. *Fig. a.*

6. N. foliis lanceolatis, superioribus linearibus acutis, paniculâ diffusâ, corollis angustissimis, limbo plicato.

**PLANTA** herbacea, viscosissima, annua.

**RADIX** fusiformis, tenuis, fibrillosa, alba.



CAULIS erectus, supernè ramosus, teres, paniculatus.  
 RAMI longi, teretes.  
 FOLIA alterna, integerrima; *inferiora* petiolata, lanceolata, acutissima; *superiora* subsessilia, linearia, acuta.  
 FLORES terminales, paniculato-racemosi, diffusi.  
 PEDICELLI axillares terminalesque, breves.  
 CALYCIS *Laciniae* lanceolato-lineares, inaequales.  
 COROLLAE *Limbus* plicatus, albus. *Tubus* calyce triplò longior, viridis.  
*HABITAT* in *Conceptionis Chile* versuris.  
*FLORET* Febuario, et Martio.  
*VULGO*: *Tabaco Cimarron*, id est, *Nicotiana silvestris*.  
*Explic. Icon.* 1 Stamina tubo corollae inserta. 2 Pistillum. 3 Semina.

GILIA. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil. pag. 25.*  
*ICON. IV.*

GILIA LACINIATA. *ICON. CXXIII. Fig. b.*

1. G. foliis pinnatifido-laciniatis, floribus capitatis.  
 PLANTA herbacea, pedalis, pubescens, annua.  
 RADIX fibrosa, tenuis, albidiuscula.  
 CAULIS erectus, teres, parum divisus.  
 RAMI erecto-patuli, teretes, simplices.  
 FOLIA alterna, subsessilia, pinnatifido-laciniata; *laciniis* linearibus, integerrimis.  
 FLORES terminales, plures, sessiles, capitati.  
 COROLLA purpurea.  
*HABITAT* in *Peruviae* collibus arenosis *Limae*, *Arnedo*, *Huaura*, et *Huassahuassi*.  
*FLORET* Junio, Julio et Augusto.  
*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Stamina. 5 Pistillum. 6 Capsula cum calyce. 7 Eadem à calyce libera. 8 Capsula transversim secta. 9 Eadem aperta. 10 Semina.

PHLOX. LINN. *Gen. pl. pag. 115.*

PHLOX BIFLORA.

1. P. foliis lineari-lanceolatis; inferioribus oppositis; superioribus alternis, pedunculis axillaribus geminis.  
 PLANTA herbacea, pedalis, pubescens, annua.  
 RADIX ramoso-fibrosa, albicans.  
 CAULIS erectus, teres, supernè divisus.  
 RAMI consimiles, breves.  
 FOLIA lineari-lanceolata, sessilia, integerrima, marginibus retrorsum scabra, avenia: *inferiora* opposita, per quatuor ad novem oppositiones; *superiora* alterna.  
 FLORES ex divisionibus caulis et ex axillis superiorum foliorum, bini, pedunculati.  
 CALYX quinquepartitus, decemangulatus.  
 COROLLA purpureo-caerulea, hypocrateriformis. *Tubus* calyce quadruplò longior. *Limbus* patens.  
 STAMINA inclusa, inaequalia, imae parti tubi corollae inserta.

Tom. II.

CAPSULA trilocularis, trisperma.  
*HABITAT* in *Regni Chilensis* aridis et arenosis locis ad *Re-re*, *Colliumo* et *Conceptionis* tractus.  
*FLORET* Octobri, et Novembri.

PERIPHRAGMOS. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil. pag. 26. ICON. IV. CANTUA. JUSSIEU*  
*Gen. pl. pag. 136.*

PERIPHRAGMOS FLEXUOSUS. *ICON. CXXXI.*

1. P. foliis lanceolatis acuminatis, floribus corymbosis.  
 FRUTEX triorgyalis, frondosus.  
 CAULIS erectus, teres, ramosissimus.  
 RAMI consimiles: *terminales* erecti; *intermedii* patentes; *inferiores* reflexi; *teneri* pubescentes.  
 FOLIA sparsa, breviter petiolata, lanceolata oblongaque, cum acumine parvo, supra nitida, subtus pubescentia; *primaria* et *aliqua juniora* è medio ad apicem serrata; *seniora* integerrima.  
 FLORES terminales et ex axillis superioribus, corymbosi.  
 CORYMBI multiflori, planiusculi.  
 PEDICELLI bracteolis subulatis, deciduis suffulti.  
 CALYCES striati, ad curvaturam atri.  
 COROLLA alba, curvata, calyce triplò longior.  
 FILAMENTA supernè tenuissima, corollà duplò longiora, flexuosa.  
 CAPSULA lutescens, rudimento styli acuminata.  
*HABITAT* in *Peruviae* versuris ad *Huanucum*, *Huariaca* et *Muña* tractus.  
*FLORET* à Majo ad Augustum.  
*VERNACULE* in *Huariaca* nominatur *Turu*.  
*VIRES ET USUS.* Cum substantia mucosa saponacea, quam folia in aqua manibus compressa emittunt, vestimenta Indi eluunt. *Sapor* foliorum acidulus et amariuscule percipitur. *Folia* masticata colore luteo elegantissimo salivam imbuunt: quapropter ad lintea tingenda tam folia, quam lignum adhiberi posse censemur.  
*Explic. Icon.* 1 Corolla cum staminibus scissa. 2 Pistillum cum corpore glanduloso. 3 Capsula cum calyce. 4 Eadem aperta. 5 Semina.

PERIPHRAGMOS FOETIDUS. *ICON. CXXXII.*

2. P. foliis lanceolatis glabris, pedunculis subtrifloris.  
 FRUTEX orgyalis, foetidus.  
 CAULIS erectus, ramosus.  
 RAMI teretes, erecti.  
 FOLIA conferta, sessilia, lanceolata oblongaque, integerrima, glabra, supra nitida, secunda, versus meridiem spectantia.  
 PEDUNCULUS unicus ex singulo ramulo gemmaceo, terminalis, bi-triflorus, geniculatus, à geniculo usque ad calycem rugosus.  
 CALYX violaceo-nigrescens.  
 FLORES secundi contra solem, nutantes.  
 COROLLA pallida; *laciniis Limbi* lanceolatis, acutis, exte-



rius subviolaceis ; *Faux* villis clausa.

FILAMENTA corollâ longiora.

STIGMA capitatum , obsoletè bifidum.

CAPSULA bilocularis , aliquando trilocularis , dependens.

*HABITAT* in locis umbrosis et ruderatis propè *Conceptionis* *Chile* urbem ad *Carcamo* tractus.

*FLORET* Junio, Julio et Augusto.

*VERNACULE* *Guevillguevill* nuncupatur.

*VIRES ET USUS.* Ad sanguinis ardores mitigandos Indi clysteres et decoctum usurpant. Febri tabificae *Congo* aut *Chavalongo*, et Dysenteriae decoctum aut infusum opitularur. *Sapor* foliorum amarus et acidulus est. *Lignum* et *Folia* masticata luteum colorem praebent , et ad lintea imbuenda inserviunt.

*Explic. Icon.* 1 Pistillum. 2 Capsula cum calyce aperta. 3 Semina.

#### PERIPHRAGMOS DEPENDENS. ICON. CXXXIII.

3. P. foliis obovatis acuminatis aveniis , ramis dependentibus , floribus corymbosis.

FRUTEX triorgyalis , in flore speciosus.

CAULIS erectus , teres , undique ramosissimus.

RAMI conferti , penduli , teretes , supernè foliosi , lutescentes : *teneri* pubescentes.

FOLIA sparsa , subsessilia , obovata , oblongo-obovataque , integerrima cum acumine minimo , obsoletè venosa , subcoriacea , nitidiuscula , patentia : *tenuiora* leviter pubescentia.

FLORES terminales , 3-9 , corymbosi , penduli.

CALYCES hirsuti , parum incurvi , oblongo-ovati , pentagoni , decemstriati , altero latere purpurascens.

COROLLA purpurea , calyce triplò longior. *Tubus* incurvus , ad basim luteus.

STAMINA purpurea , corollae longitudine , uncinata , duo reliquis breviora.

STYLUS purpureus. *Stigmata* tria , purpurea.

CAPSULA incurva , calyce duplò longior.

SEMINA nigra , alâ membranaceâ , albâ cincta.

*HABITAT* in *Peruviae* versuris , et circuitu *Chacilla* , *Cantae* et *Tarmae*.

*FLORET* per totum ferè annum.

*VERNACULE* *Ccantu* nuncupatur.

*USUS.* *Sapor* foliorum praecedentibus amarior. *Lignum* et *Folia* masticata luteo colore salivam tingunt , ideoque ad lintea inficienda utilia existimamus.

*Obs.* Ex eo , quod ad vicos tantum , aut in eorum ruderatis hi Frutices passim inveniuntur , probabiliter inferri potest Indos Ethnicos aliquem ex eisdem usum factitasse ; quamquam in praesens nullum alium sciamus fieri praeter eum , quem flores ad templorum cultum praestant , et ornatum in diebus festis. Proditum quoque est à Societatis Jesu Sacerdotibus , veteres Indos hunc Fruticem *Arborem magicam* nuncupavisse , quod nostram de ejusdem usu suspicionem quodammodo roborat.

*Explic. Icon.* 1 Stamina. 2 Semina.

#### PERIPHRAGMOS UNIFLORUS.

4. P. foliis obovatis integris : nonnullis 2-5 fido-dentatis , floribus solitariis.

*CANTUA* (*ovata*). CAVAN. *Icon. vol. 4. p. 43. n. 401. tab. 363.*

FRUTEX triulnaris , floris tempore pulcher.

CAULIS erectus , infernè teres , supernè angulatus , cicatriculis foliorum scaber , undique ramosissimus.

RAMI patentes angulati : *teneri* nutantes , foliosi.

FOLIA tria ad duodecim ex eodem puncto , subsessilia , secunda , obovata oblongaque cum parvo acumine , integerrima , glabra : *nonnulla* bi , tri , quadri , aut quinquefida , praesertim illa solitaria , sparsa , petiolata , surculorum inferiorum.

PEDUNCULI ex apicibus gemmarum , solitarii , uniflori.

FLORES cernui.

COROLLAE *Tubus* longissimus , purpureus : *Limbus* violaceus , quinquepartitus : *laciniis* profunde emarginatis.

STAMINA exserta , purpureo-violacea. *Antherae* versatiles , violaceae.

STYLUS purpureo-violaceus , staminibus paulò longior. *Stigmata* tria , acuta.

CAPSULA fulvo-purpurascens , calyce dimidio longior.

SEMINA fusca , alâ albidâ cincta.

*HABITAT* in *Peruviae* septis per *Huaro-chiri* , *Tarmae* et *Cantae* Provincias.

*FLORET* Majo , Junio et Julio.

*VERNACULE* *Ccantuttica* , id est *Ccantu* Flos.

#### ECHITES. LINN. Gen. pl. pag. 164.

##### CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* parvum , quinquepartitum ; *laciniis* ovato-lanceolatis , acutis , erectis ; inferum , persistens.

COR. infundibuliformis. *Tubus* pentagonus , striatus. *Faux* dilatata , ad staminum insertionem dense villosa. *Limbus* quinquepartitus , patentissimus ; *laciniis* lateraliter obliquis , sibi margine invicem incumbentibus.

*Nectarium* duplex , persistens : *exterius* inter calycem et corollam receptaculo insertum , membranaceum , quinquepartitum : *laciniis* laceris : *interius* glandulis quinque , germen ambientibus.

STAM. *Filamenta* quinque , filiformia , breviora , villosa , fauci corollae inserta. *Antherae* erectae , sagittate , rigidae , stigmati agglutinatae.

PIST. *Germina* duo. *Stylus* filiformis , longitudine staminum. *Stigma* oblongum , bilobum , basi orbiculari setis quinque coronatae insidens.

PER. *Folliculi* duo , longi , teretes , apice subulato , connexi , uniloculares , univalves.

SEM. plurima , imbricata , lineari-oblonga , pappo longo multiseto coronata.



*ECHITES ACUMINATA*. ICON. CXXXIV. Fig. a.

1. E. foliis ovatis oblongisque acuminatis basi glandulis quinque, racemis brevibus, pedicellis geminis.

PLANTA fruticosa, volubilis, glabra.

CAULIS longissimus, valde ramosus, teres.

RAMI consimiles, filiformes.

FOLIA breviter petiolata, oblonga ovataque, acuminata, integerrima, basi aliquando parum excavata, supra nitida, glandulis quinque ad basim; *lateralibus duabus* acutis, minoribus, linearibus; *tribus intermediis* imbricatis, cordatis, concavis.

STIPULAE interfoliaceae, truncatae, utrinque denticulo notatae.

RACEMI axillares, breves, octo, decemflori.

FLORES gemini, pedicellati.

PEDICELLI contorti, bracteolis minimis, trifidis suffulti, purpurei.

COROLLA alba, extus purpurascens.

FOLLICULI subulati, nitidi, tripalmares et ultra.

SEMINA fusca, lineari-oblonga.

PAPPUS fulvus, longus.

HABITAT in silvis *Chinchao* ad *Macora* praedium.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Pistillum cum glandulis germen ambientibus, et cum staminibus stigmati agglutinatis. 2 Glandulae. 3 Stamina segregata. 4 Pistillum. 5 Semen.

*ECHITES GLANDULOSA*. ICON. CXXXV.

2. E. foliis tomentosis cordatis acuminatis, articulationibus petiolis cordaturisque glanduliferis, pedunculis racemosis.

PLANTA fruticosa, volubilis, tomentosa.

CAULIS teres, ramosus, ad articulationes glandulifer.

RAMI longi, filiformes.

FOLIA petiolata, cordato-subrotunda, acuminata, cordato-ovataque, acuta, integerrima, rugosa, venosissima, subtus canescentia, venis purpureis: ad cordaturam et per petiolos glandulifera.

STIPULAE interfoliaceae, plures, glandulaeformes.

GLANDULAE *Stipulae*que subulatae, nigrae, deciduae.

PEDUNCULI axillares, longi, racemosi, multiflori.

PEDICELLI reflexi, uniflori, bracteolis ovatis, caducis stipati.

COROLLA lutea, magna.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Muña* tractus.

FLORET Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Tubus corollae cum staminibus agglutinatis. 2 Pistillum cum glandulis. 3 Nectarium exterius auctum. 4 Idem interius auctum.

*ECHITES LAXA*. ICON. CXXXIV. Fig. b.

3. E. foliis cordatis acutis, basi multiglandulosis, pedunculis longis laxis paucifloris.

PLANTA volubilis, fruticosa, parum villosa.

CAULIS longissimus, angulatus, glaber, saepe granulosus ramosus.

RAMI filiformes, leviter villosi, obsoletè angulati.

FOLIA opposita, cordata, acuta, subtus nervosa, nervis inferioribus ad basim villosam coeuntibus, reliquis alternis incurvis, glandulis pluribus subulatis in cordatura.

PETIOLI bipollicares, stipulis connati.

STIPULAE interfoliaceae, multidentatae.

RACEMI axillares, solitarii, simplices, laxi, pauciflori, longi.

PEDICELLI uniflori, bracteolâ subulatâ sustentati.

COROLLA lutea, magna.

HABITAT in *Pillao* nemoribus versus *Chacahuassi* tractum.

FLORET Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Tubus corollae scissus calyci insidens. 2 Idem Nectarium, Pistillum et Stamina agglutinata exhibens. 3 Nectarium interius. 4 Pistillum.

*ECHITES SUBSAGITTATA*.

4. E. foliis oblongo-subsagittatis acuminatis, angulis posticis obtusis, pedunculis paucifloris.

PLANTA volubilis, suffruticosa, glabra.

CAULIS filiformis, ramosus, granulosus, purpurascens, teres.

RAMI graciles, consimiles.

FOLIA opposita, breviter petiolata, oblongo-subsagittata, acuminata, angulis posticis obtusis, marginibus ciliatis, basi glandulosi.

PETIOLI pubescentes.

STIPULAE plures, interfoliaceae, glandulaeformes, parvae, oblongae.

PEDUNCULI axillares, solitarii, breves, pauciflori.

PEDICELLI bracteolâ minimâ, deciduâ stipati.

CALYX acutus.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Cuchero* vicum.

FLORET Julio, et Augusto.

*ECHITES HIRSUTA*. ICON. CXXXVI.

5. E. foliis oblongo-ovalibus acuminatis basi excavatis, racemis multifloris.

PLANTA fruticosa, volubilis, hirsuta.

CAULIS ramosus, contortus, striatus.

RAMI consimiles.

FOLIA opposita, oblongo-ovalia, acuminata, subtus densè villosa, ad basim excavata, unâ alterâve glandulâ oblongâ, acuminatâ praedita.

PETIOLI teretes, subpollicares, striati, curvati.

RACEMI axillares, solitarii, simplices, folio longiores.

PEDICELLI uniflori, bracteolâ lanceolatâ, acuminatâ, deciduâ stipati.

CALYX in flore acutus, in fructu obtusus.

COROLLA lutea.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus versus *S. Antonii de Playa grande*, et *Chicoplaya* tractus.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla scissa, stamina agglutina-





ta ostendens. 3 Pistillum cum glandulis intra basim calycis. 4 Semen. 5 Folliculus hians cum calyce. 6 Semen villis pappi coalitis.

**PLUMIERIA. LINN. Gen. plant. pag. 164.**

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

- CAL.** *Perianthium* minimum, quinquefidum: *laciniis* subrotundis, obtusis, inferum, deciduum.
- COR.** infundibuliformis. *Tubus* longus, quinquestriatus, parum curvatus. *Faux* ampliata. *Limbus* erecto-patens, campanulatus, quinquepartitus: *laciniis* oblongis, obliquis, marginibus sibi invicem incumbentibus.
- STAM.** *Filamenta* quinque, subulata, brevissima, è curvatura tubi orta. *Antherae* subulatae, conniventes, inclusae.
- PIST.** *Germen* ovatum, bifidum. *Stylus* vix ullus. *Stigma* bipartitum: *laciniis* oblongis, obtusis.
- PERIC.** *Folliculi* duo, oblongo-subcylindrici, acuminati, ventricosi, extrorsum flexi, nutantes, uniloculares, univalves.
- SEM.** plura, imbricata, oblonga, compressa, infernè alâ membranaceâ, ovatâ, magnâ, crenato-dentatâ aucta, receptaculo centrali, lineari, anguloso inserta.

**PLUMIERIA PURPUREA. ICON. CXXXVII.**

1. P. foliis oblongo-ovatis, marginibus revolutis, corollis rubris.
- ARBOR quadriorgyalis, lactifera.
- TRUNCUS erectus, teres, medullosus, crassus, subfungosus: comâ frondosâ, subglobosâ.
- RAMI dichotomi, fragiles, tortuosi, teretes, petiolorum vestigiis cicatricati.
- FOLIA sparsa, oblongo-ovata, integerrima, marginibus parum revolutis, venoso-reticulata; venis majoribus horizontalibus, parum inflexis.
- PETIOLI biglandulosi, pollicares et ultra.
- PEDUNCULI striati, rubri, umbellato-cymosi, multiflori.
- PEDICELLI gemini, inaequales, uniflori; bracteolis parvis, ovatis, caducis sustentati.
- CALYX minimus, quinquecrenatus, ruber.
- COROLLA quam in reliquis Speciebus minor, fragrantissima, purpureo-rubicunda; fauce leviter lutescente.
- FOLLICULI spithamaci, fusco-lutescentes.
- SEMINA pallescentia.

**HABITAT** in *Peruviae* hortis, affatim ad *Cercado*, *Chancay* et *Huanuci* Provincias.

**FLORET** Januario, et Februario.

**VERNACULE** *Sucheçani*, id est, *Suche morado*.

**USUS:** Flores valdè fragrantés. *Peruviana* corollis crines frequenter ornant, et ad *Mixturam* adhibent.

**Obs. 1.** *Plumieria* floribus et foliis vestitae arbores formosissimas constituunt. In hortis et praediis ad maris littora, et *Peruviae* vallibus calidis ferè toto anno florent: cum verò folia omnia demiserunt, veluti siccae apparent. Flores paucis diebus antequam folia, erumpunt; sed brevi

ramorum extremitates tot folia et flores exhibent, ut densam umbram praebeant. Duobus etiam annis post arbores sectas taleae earum terrae mandatae radices agunt et facillimè pullulant: unde nomen *Suche*, quod illis in *Peruvia* indigitatur et lenonem lingua *Quichoa* significat. *Peruviana* floribus caput exornant ambaris odore antea imbutis, corollarum laciniis in parvorum infundibulorum formam revolventes.

**Obs. 2.** *Plumieriae* nostrae praesertim inter se differunt colore et magnitudine florum, et quamquam nec color, nec magnitudo mutat Speciem, nobis satius visum est illas seorsim describere.

**Explic. Icon.** 1 Calyx. 2 Stamina tubo corollae affixa. 3 Pistillum. 4 Folliculus clausus et apertus. 5 Semina.

**PLUMIERIA INCARNATA. ICON. CXXXVIII.**

2. P. foliis ovato-oblongis acutis, corollis incarnatis, disco fulvo.
- ARBOR quadriorgyalis, lactifera.
- TRUNCUS erectus, teres, medullosus, comâ hemisphaericâ, frondosâ terminatus.
- RAMI dichotomi, tortuosi, fragiles, vestigiis petiolorum notati.
- FOLIA sparsa, ovato-oblonga, acuta, integerrima, venosissima, venis horizontalibus incurvatis.
- PETIOLI semipollicares, basi incrassati.
- PEDUNCULI terminales, laeves, multiflori.
- FLORES cymoso-umbellati, gemini, breviter pedicellati, bracteolis parvis, acutis, ovatis, caducis stipati.
- CALYX quinquedentatus, ruber.
- COROLLA magna, incarnata, in centro fulva.
- FOLLICULI spithamaci, fusi.
- SEMINA fusca, alâ fulvescenti.

**HABITAT** in *Peruviae* hortis, ad *Huanuci*, *Cercado* et *Chancay* Provincias.

**FLORET** Januario, et Februario.

**VERNACULE** *Puca-Suche*, id est, *Suche encarnado*.

**Obs.** Nimis affinis *Plumieriae carinatae*.

**Explic. Icon.** 1 Calyx. 2 Stamina tubo corollae affixa. 3 Pistillum. 4 Folliculus. 5 Semina.

**PLUMIERIA TRICOLOR. ICON. CXXXIX.**

3. P. foliis oblongis acutis acuminatisque, marginibus planis, corollis tricoloribus.
- ARBOR sexorgyalis, lactifera.
- TRUNCUS erectus, teres, cinereus; comâ magnâ, subglobosâ.
- RAMI dichotomi, tortuosi, fragiles, medullosi, crassi, petiolorum vestigiis cicatriculati.
- FOLIA sparsa, oblonga, utrinque acuta, integerrima, marginibus planis, venoso-reticulata; venis majoribus horizontalibus, vix incurvis, rubris.
- PETIOLI ad basim internam glandulis duabus connexis.
- PEDUNCULI striati, rubicundi, pubescentes, umbellato-cymosi, multiflori.



PEDICELLI gemini, uniflori, bracteolâ ovatâ, concavâ, caducâ suffulti.

CALYX rubicundus, quinquecrenatus, pubescens.

COROLLA odoratissima, pollicaris. *Tubus* rectus, ruber. *Faux* crocei coloris. *Limbus* patens, intus albo-roseus, extus dimidiato ruber et albus.

FOLLICULI spithamaei, fusi.

SEMINA fusco-pallescentia.

HABITAT in *Peruviae* hortis ad *Cercado*, *Chancay* et *Huanuci* Provincias.

FLORET à Januario ad Martium.

VERNACULE *Yuracppaco* *Suche*, id est, *Suche blanco-rosado*.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Stamina tubo corollae inserta. 3 Pistillum. 4 Folliculus clausus et apertus. 5 Semen.

PLUMIERIA CARINATA.

4. P. foliis oblongo-ovatis acuminatis carinatis, marginibus planis rubris, corollis magnis tricoloribus.

ARBOR quinqueorgyalis, lactifera.

TRUNCUS erectus, teres, medullosus, comâ frondosâ, subrotundâ terminatus, cortice crasso, carnosus vestitus.

RAMI dichotomi, fragiles, tortuosi, consimiles, cicatricibus petiolorum oculati.

FOLIA sparsa, oblongo-ovata, acuminata, carinata, marginibus planis rubris, venoso-reticulata: venis majoribus incurvis ad margines in fornicis formam connexis, per basim hirsutis.

PETIOLI pollicares, glandulis tribus prope basim.

PEDUNCULI striati, rubri, umbellato-cymosi, multiflori.

PEDICELLI gemini, uniflori, bracteolis ovatis, deciduis stipati.

CALYX minimus, ruber.

COROLLA magna, in centro lutea, extus ad medium alba, supernè rubescens.

FOLLICULI magni, rubro-fusci.

SEMINA ferruginei coloris.

HABITAT passim in *Peruviae* hortis, per *Cercado*, *Chancay*, et *Huanuci* Provincias.

FLORET Januario, et Febuario.

VERNACULE *Suche Turumbaco*, et *Ccarhuasppaco* *Suche*, id est, *Suche amarillo-rosado*.

PLUMIERIA BICOLOR. ICON. CXLI.

5. P. foliis oblongis acuminatis, marginibus planis, corollâ albo-luteâ.

ARBOR quinqueorgyalis, lactifera.

TRUNCUS erectus, teres, cinereus; comâ subrotundâ, magnâ.

RAMI dichotomi, crassi, medullosi.

FOLIA sparsa, in summitatibus ramulorum, oblonga, acuminata, petiolata, integerrima, plana, venosissima.

PETIOLI basi biglandulosi.

PEDUNCULI terminales, striati, glabri, multiflori.

PEDICELLI bracteolis ovatis, deciduis suffulti.

FLORES corymboso-umbellati, gemini.

CALYX viridis, quinquecrenatus.

Tom. II.

COROLLA magna, albo-lutescens. *Tubus* curvatus, *Faux* intensè lutea. *Limbus* albo-lacteus.

FOLLICULI bipalmes et ultra, rubro-fusci.

SEMINA fusca, alâ longâ, albicanti.

HABITAT in *Peruviae* hortis, ad *Cercado*, *Chancay* et *Huanuci* Provincias.

FLORET à Decembri ad Martium.

VERNACULE *Yuraccarhuas* *Suche*, id est, *Suche blanco-amarillo*.

Explic. Icon. 1 Folliculus clausus et apertus. 2 Semina.

PLUMIERIA LUTEA. ICON. CXLII.

6. P. foliis oblongo-obovatis acuminatis, corollâ luteo-albâ.

ARBOR decemulnaris, lactifera.

TRUNCUS erectus, teres, medullosus, petiolorum vestigiis cicatricatus; comâ frondosissimâ, subglobosâ.

RAMI consimiles, dichotomi, fragiles.

FOLIA sparsa, in summitatibus ramorum, oblongo-obovata, integerrima, plana, venoso-reticulata; venis majoribus incurvatis.

PETIOLI biglandulosi, pollicares.

PEDUNCULI terminales, striati, glabri, umbellato-corymbosi, multiflori, longi, virescentes.

PEDICELLI gemini, uniflori, bracteolis ovatis, deciduis stipati.

CALYX leviter ruber, quinquecrenatus, minimus.

COROLLA magna, fragrans. *Tubus* curvatus, brevis, lutescens. *Limbus* luteo-albus, erecto-patulus.

FOLLICULI tripalmes, luteo-fusci.

SEMINA luteo-fusca, alâ albidâ.

HABITAT in *Peruviae* hortis, ad *Cercado*, *Chancay* et *Huanuci* Provincias.

FLORET Januario, Febuario et Martio.

VERNACULE *Ccarhuas* *Suche*, id est, *Suche amarillo*.

Explic. Icon. 1 Folliculus apertus et clausus. 2 Semen.

TABERNAEMONTANA. LINN. Gen. plant. pag. 165.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* minimum, ovatum, quinquesidum; laciniis ovatis, obtusis; inferum, deciduum.

COR. hypocrateriformis. *Tubus* longus, angulato-striatus, basi subglobosus. *Limbus* quinquepartitus, planus: laciniis obliquis, obovato-oblongis, concavis.

*Nectarium*: *Glandulae* quinque, minimae, germen circumstantes.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, è medio tubi. *Antherae* conniventes, sagittatae.

PIST. *Germina* duo, pedicellata, connexa. *Stylus* filiformis, bisulcus, longitudine tubi. *Stigma* oblongiusculum, brevi margine circumdatum, bifidum: laciniis adpressis.

PER. *Folliculi* duo, divergentes, reflexi, oblongi, acuminati, ventricosi, uniloculares, univalves.

SEM. numerosa, obovato-oblonga, gibba, obtusa, striato-



rugosa, receptaculo carnosio, per suturam decurrente, quadruplici serie imbricata, nidulantia.

**TABERNAEMONTANA ARCUATA.** ICON. CXLIII.

1. T. foliis oblongo-obovatis acuminatis, corymbis ternis multifloris, folliculis revoluto-arcuatis.

ARBOR trigintaulnaris et ultra, lactifera, glaberrima.

TRUNCUS rectus, cortice cinereo-pallescenti vestitus; comâ frondosissimâ terminatus.

RAMI terminales, dichotomi, leviter compressiusculi, pallidi: *tenuiores* virides.

FOLIA opposita, petiolata, oblongo-obovata, nonnulla oblongo-lanceolata, integerrima, acuminata, patentia, bitripalmaria, plana.

PETIOLI subcontorti, breves.

CORYMBI terni, breves, multiflori.

PEDICELLI bracteis ovatis, acutis, minimis stipati.

COROLLA albo-lutescens.

FOLLICULI palmares, crassi, oblongo-reniformes, acuminati, extus arcuati, rubescentes.

SEMINA rubra, oblongo-obovata, pulpae sanguineae immersa, striato-rugosa, receptaculo per suturam decurrenti inserta.

HABITAT copiosè in *Peruviae* nemoribus ad *Pozuzo* vicum.

FLORET Novembri, et Decembri.

Obs. Ex hac arbore undelibet vulneratâ copiosus et lacteus succus fluit, qui aëri expositus in gummi-resinam fuscâ condensatur.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Stamina tubo corollae inserta. 4 Nectarium. 5 Pistillum. 6 Folliculi aperti. 7 Semen extus visum. 8 Idem intus conspectum.

**TABERNAEMONTANA SANANHO.** ICON. CXLIV.

2. T. foliis oblongis acuminatis, corymbis bi-quadrifidis, fructibus obovato-subrotundis acuminatis.

ARBOR triorgyalis, glaberrima.

TRUNCUS erectus, comâ frondosâ terminatus.

RAMI oppositi, teretes, pallescentes: *teneri* virides, parum compressi.

FOLIA opposita, breviter petiolata, tripalmaria, oblonga, nonnulla oblongo-obovata, integerrima, parum undulato-repanda, acuminata, utrinque glabra, nitida, leviter venosa; dorso elevato, acuto.

PETIOLI teretes, supernè obtusè tetragoni, basi incrassati.

PEDUNCULI axillares, teretes, breves, corymbosi, 2-3-4-fidi, decem vigintiflori.

FLORES pedicellati, bracteolâ cordato-subrotundâ suffulti.

COROLLA albo-lutescens. *Tubus* longissimus, angulato-striatus.

FOLLICULI duo, obovato-subrotundi, obtusè digoni, acuminati, pulposi, extus pallescentes, uniloculares, polyspermi, Mali Armeniaci magnitudine.

SEMINA fusca, striata.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *S. Antonii de Playa grande* vicum.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE *Sananho* nuncupatur.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Folliculi transversim secti dimidia pars cum seminibus. 6 Semina.

**LAUGERIA.** LINN. *Gen. plant.* pag. 140.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* minimum, quinquedentatum, acutum, superum, persistens.

COR. hypocrateriformis. *Tubus* longissimus, rectus, cylindricus. *Limbus* quinquepartitus, planus: *laciniis* ovatis, fimbriatis, plicatis.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, infra faucem inserta. *Antherae* lineares, basi bifidae, inclusae.

PIST. *Germen* oblongum, coronatum margine parvo, circulari. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* capitatum, obsoletè pentagonum.

PER. *Drupa* oblonga, umbilicata, calyce coronata.

SEM. *Nux* oblonga, pentagona, quinquelocularis. *Nuclei* oblongi.

**LAUGERIA HIRSUTA.** ICON. CXLV. *Fig. a.*

1. L. foliis oblongis acutis, spicis longis multifloris revolutis, bracteis magnis, fructibus pentagonis.

ARBOR trigintaulnaris.

TRUNCUS erectus, rectus, satis crassus, fusco-cinereus: *comâ* frondosâ terminatus.

RAMI *seniores* subteretes, glabri, cinereo-fusci: *teneri* tetragono-compressi, foliosi, hirsuti, lutescentes.

FOLIA opposita, petiolata, oblonga, acuta, integerrima, subtus pubescentia, venosissima, rugosa, supra per venas hirsuta.

PETIOLI semiteretes, utplurimum sesquipollicares, pubescentes.

STIPULAE magnae, interfoliaceae, ultra petiolos oppositae, purpurascens, ovato-lanceolatae, acutae, erectae, marginibus retroflexis.

PEDUNCULI supraxillares, solitarii, furcati dichotomique, longitudine ferè petiolorum, spicati.

SPICAE conjugatae, multiflorae, revolutae, longae.

FLORES sessiles, secundi, bractea ovata, subpurpureâ, persistenti, calycis longitudine.

CALYX purpurascens, quinquedentatus, acutus.

COROLLA alba.

DRUPAE pisi magnitudine, hirsutae, subrotundae, calyce coronatae.

NUX quinquelocularis, pentagona, calyce coronata.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus versus *Cuchero* et *Chincho* vicos.

FLORET Julio, Augusto et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Eadem cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Drupa. 6 Eadem per medium secta. 7 Nux. 8 Eadem transversim secta, loculamenta ostendens. 9 Nuclei.



*LAUGERIA DEPENDENS*. ICON. CXLV. Fig. b.

2. L. foliis ovatis acutis, spicis brevibus paucifloris dependentibus, bracteis minimis, fructibus trigonis.

ARBOR sexorgyalis.

TRUNCUS erectus, teres, cinereus, ramosissimus.

RAMI *adultiores* glaberrimi, cinerei, fasciis nigrescentibus maculati, subteretes: *juniores* foliosi, obsolete tetragoni, pubescentes, ferruginei coloris.

FOLIA opposita, approximata, decussata, ovata, acuta, integerrima, subtus pubescentia, ferruginea, venosissima, supra nitidiuscula, per venas pubescentia.

PETIOLI breves, semiteretes, ut plurimum pollicares.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, semiamplexicaules, petiolis demidio breviores, ovato-lanceolatae, acutissimae, extrosum conduplicatae, adpressae, purpurascens, deciduae, pubescentes.

PEDUNCULI supraxillares, solitarii, furcati, longitudine ferè petiolorum, spicati.

SPICAE conjugatae, breves, novemflorae, patentissimae, tandem dependentes, rectae.

FLORES sessiles, secundi, bractea minimâ, vix conspicuâ, caducâ stipati.

CALYX minimus, quinquedentatus, obtusus.

COROLLAE *Tubus* purpurascens. *Limbus* albus, fimbriatus.

DRUPAE parvae, oblongae, calyce coronatae.

NUX trilocularis, trigona, rarius bilocularis, saepe quadrilocularis.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus circa *Muña* vicum.

FLORET Augusto, et Septembri.

VARRONIA. LINN. *Gen. pl.* pag. 140.

## CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* tubuloso-campanulatum, quinquedentatum: *denticulis* acutis, erectis; inferum, persistens.

COR. tubulosa, cylindrica, calyce paulò longior; ore patenti, crenato-plicato.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, medio corollae inserta, basi villosa, longitudine corollae. *Antherae* oblongae, erectae, biloculares.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, erectus, staminibus brevior, dichotomus. *Stigmata* quatuor, oblonga, patentia.

PER. *Drupa* ovata, unilocularis, monosperma.

SEM. *Nux* ovata, unilocularis. *Nucleus* ejusdem figurae.

Obs. Differt à Characterè generico *Varroniae* Linnaei, nuce uniloculari monospermâ.

## VARRONIA CRENATA. ICON. CXLVI. Fig. b.

1. V. foliis ovato-subrotundis obtusis crenatis rugosis, pedunculis lateralibus, floribus capitatis.

FRUTEX orgyalis, globosus (*Lantanae* habitu).

CAULIS erectus, ramosissimus, patulus, teres, fuscus.

RAMI confertissimi, tortuosi, teretes, fusci, nudi: *tenuio-*

*res* foliosi, hirsuti, fusco-purpurei.

FOLIA alterna, breviter petiolata, ovata subrotundaque crenata, obtusa, rugosa, venosissima, subtus vix canescentia, utrinque hirsuta, supra aspera.

PEDUNCULI laterales, foliis longiores, solitarii, erecti, biquadrifidi, hirsuti.

FLORES sessiles, in capitulum subglobosum, multiflorum collecti.

CALYCES intus albidi, extus atri, pubescentes.

COROLLA alba, plicata, calyce paulò longior.

STIGMATA quatuor, oblonga.

DRUPA rubra, ovata, unilocularis, calyce seminvoluta.

NUX unilocularis, ovata, rarius bilocularis.

HABITAT in aridis petrosis et argillosis locis *Huanuci*.

FLORET à Novembri ad Februarium.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Stamen. 5 Pistillum. 6 Drupa cum calyce. 7 Nux. 8 Eadem transversim secta aucta. 9 Nucleus.

## VARRONIA DICHOTOMA. ICON. CXLVI. Fig. a.

2. V. foliis ovato-lanceolatis acutis acuminatisque supernè serratis, pedunculis umbellato-spicatis.

FRUTEX biulnaris, parum scaber.

CAULIS erectus, teres, ramosissimus.

RAMI expansi, subteretes: *teneri* obsolete angulati.

FOLIA alterna suboppositaque, breviter petiolata, ovato-lanceolata, acuta acuminataque, integerrima, nonnulla è medio ad apicem serrata, supra retrorsum scabra.

PEDUNCULI axillares terminalesque, umbellato-spicati, erecti, longitudine ferè foliorum.

FLORES in spicas breves, paucifloras.

CALYX quinquedentatus, corollâ dimidio brevior.

COROLLA alba.

STIGMATA quatuor, patula.

DRUPA coccinea, ovata, calyce seminvoluta.

NUX unilocularis.

HABITAT copiosè in *Peruviae* rudertis et petrosis locis ad *Chacahuassi* tractum.

FLORET à Novembri ad Martium.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Stamen. 5 Pistillum. 6 Drupa. 7 Nux. 8 Eadem transversim secta, aucta. 9 Nucleus.

## VARRONIA CYLINDRISTACHYA. ICON. CXLVII.

Fig. a. *macrostachyae* nomine.

3. V. foliis ovatis acutis densè serratis rugosis, spicis longis supraxillaribus terminalibusque.

FRUTEX biorgyalis, erectus, ramosissimus, hirsutus.

RAMI erecti, teretes: *juniores* angulati, striatique.

FOLIA alterna, breviter petiolata, ovata, acuta, densè serrata, rugosa, supra aspera, venosissima.

PETIOLI breves, leviter sulcati.

PEDUNCULI supraxillares terminalesque, spicati.

SPICAE longae, cylindricae, terminales, bifidae trifidaeque.



FLORES numerosi , conferti.

CALYX luteo-virescens.

COROLLA alba , glabra.

STYLUS dichotomus.

DRUPA calyce involuta , alba.

NUX unilocularis , rarius bilocularis.

HABITAT in *Peruviae* sepibus versus *Huassahuassi*, *Acomayo*, *Valle* et *Pati* tractus.

FLORET Decembri , Januario et Febuario.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Drupa cum calyce. 6 Eadem à calyce libera. 7 Nux. 8 Eadem transversim secta. 9 Nucleus.

VARRONIA OBLIQUA. ICON. CXLVII. Fig. b.

4. V. foliis ovatis acutis obliquis obtusè serratis , pedunculis rameis , spicis oblongis.

FRUTEX biulnaris , erectus , ramosus.

RAMI teretes , glabri : *teneri* subangulati , leviter pubescentes.

FOLIA alterna suboppositaque , ovata , acuta , obtusè serrata , supra retrorsum aspera , rugosiuscula.

PEDUNCULI ramei , solitarii , folio breviores , spicati.

SPICAE pollicares , cylindricae.

FLORES numerosi , densi , sessiles.

CALYX quinquedentatus : denticulis acutis.

COROLLA alba.

STYLUS dichotomus. *Stigmata* divergentia.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis versus *Tarmae* et *Acobamba* tractus.

FLORET Decembri , et Januario.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Drupa cum calyce. 6 Eadem à calyce libera. 7 Nux. 8 Eadem per medium secta. 9 Nucleus.

CORDIA. LINN. *Gen. pl.* pag. 139.

CORDIA ROTUNDIFOLIA. ICON. CXLVIII. Fig. a.

1. C. foliis subrotundis ovalibusque crenatis scabris , pedunculis corymboso-dichotomis.

PRUNUS sebestena. PLUK. *Almag.* pag. 306. *phyt. tab.* 217. f. 2.

FRUTEX biorgyalis.

CAULIS erectus , saepè procumbens , valdè ramosus , teres.

RAMI longissimi , lenti , flexuosi ; *juniores* hirsuti.

FOLIA alterna , breviter petiolata , venosissima , rugosa , hispidula , scabra , subrotunda , crenata.

CORYMBI terminales , dichotomi , decem-duodecimflori.

FLORES sessiles , magni , lutei.

CALYX tubulosus , striatus , quinquedentatus : denticulis acutis ; inferus , persistens.

COROLLA magna , infundibuliformis. *Tubus* calycis longitudine , erectus. *Faux* dilatata , patens. *Limbus* 5fidus , plicatus ; *laciniis* ovatis , acutis.

FILAMENTA quinque , subulata , erecta , tubo corollae affixa , basi villosa. *Antherae* ovato-oblongae , concavae.

GERMEN ovatum , acuminatum. *Stylus* filiformis , bifidus , staminum longitudine. *Stigmata* duo , bifida.

DRUPA alba , ovata , acuminata , unilocularis , ciceris magnitudine , calyce semi-involuta , pulpâ viscosâ.

NUX ovata , acuminata , quinesulcata , bilocularis. *Nuclei* oblongi.

Obs. *Corollae Limbus* aliquando 6-7-8fidus , quorum numerum sequitur staminum , et nucis sulcorum numerus.

HABITAT passim in versuris et arenosis locis *Limae*, *Huaura*, *Surco*, *Miraflores*, *Magdalena* et *Lurin*.

FLORET Majo , Junio et Julio.

VERNACULE *Tina* et *Membrillejo*.

VIRES ET USUS. *Decoctum* ad icterum oculorumque fluxiones levandas usurpatur.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Stamina tubo corollae affixa. 3 Pistillum. 4 Drupa. 5 Nux. 6 Eadem transversim secta. 7 Nuclei.

TOURNEFORTIA. LINN. *Gen. plant.* pag. 104.

TOURNEFORTIA VOLUBILIS. ICON. CXLVIII. Fig. b.

1. T. foliis ovatis acuminatis glabris , petiolis reflexis , pedunculis corymboso-dichotomis , caule scandente.

TOURNEFORTIA (*volubilis*) foliis ovatis acuminatis glabris , petiolis reflexis , caule volubili. LINN. *Sp. pl.* pag. 405.

BRYONIA nigra , fruticosa , racemi ramulis variè implicatis. SLOAN. *Hist. 1.* pag. 234. t. 143. f. 2.

PLANTA fruticosa , scandens , glabra.

CAULIS ramosissimus , teres , cinereus.

RAMI consimiles : *juniores* foliosi , angulosi , virides.

FOLIA alterna , nonnulla subopposita , breviter petiolata , ovata , acuminata , integerrima , subrepanda , crassiuscula , aliquando basi parum excavata.

PEDUNCULI terminales , corymboso-dichotomi , subpaniculati.

FLORES spicati , subsessiles , secundi.

SPICAE incurvae , divergentes.

COROLLA luteo-viridis ; *limbo* plicato.

BACCA nigra , tetrasperma.

SEMINA obovata , bilocularia.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus versus *Pozuzo* vicum.

FLORET Augusto , et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Eadem cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Bacca cum calyce. 6 Baccæ dimidia pars per medium secta cum calyce. 7 Semina. 8 Semen transversim sectum loculamenta ostendens.

TOURNEFORTIA POLYSTACHYA. ICON. CXLIX. Fig. a.

2. T. foliis ovatis acutis rugosis hirsutis , pedunculis termi-



nalibus corymboso-dichotomis.

PLANTA fruticosa, biorgyalis, hirsuta, leviter canescens.

CAULIS erectus, ramosissimus, infernè teres.

RAMI angulosi, compressiusculi: *teneri* canescentes.

FOLIA alterna, nonnulla opposita, petiolata, ovata, acuta, integerrima, venosissima, rugosa.

PETIOLI ut plurimum pollicares.

CORYMBI terminales lateralesque, dichotomi, polystachyi.

SPICAE secundae, laxae, recurvae, multiflorae.

FLORES alterni, sessiles.

COROLLA alba, intus glabra. *Tubus* calyce longior, virescens.

BACCAE albae, tetraspermae.

SEMINA unilocularia.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis ad *Huassahuassi* et *Chenchin* vicos.

FLORET Decembri, Januario et Febuario.

VERNACULE *Antaccra*.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Bacca. 6 Semina.

TOURNEFORTIA UNDULATA. ICON. CXLIX.

Fig. b.

3. T. foliis oblongo-lanceolatis acutis lineatis rugosis, pedunculis corymboso-dichotomis polystachyi.

PLANTA fruticosa, biorgyalis, leviter pubescens.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI consimiles: *tenerrimi* angulati, pubescentes.

FOLIA breviter petiolata, sparsa, nonnulla opposita, oblongo-lanceolata, integerrima, undulata, venosissima, leviter pubescentia, lineata, rugosa, coriacea.

PEDUNCULI terminales lateralesque, corymboso-dichotomi, polystachyi.

SPICAE breves, recurvae, multiflorae.

FLORES secundi, sessiles, alternatim bifariam digesti.

CALYCES tubi corollae longitudine: *laciniis* subulatis.

COROLLA alba, extus pubescens.

STYLUS persistens.

BACCA alba, bilocularis, disperma, umbilicata.

SEMINA ossea, bilocularia, basi bicornia.

HABITAT in Provinciae *Camanae* collibus ad *Lomas de Atiquipa*, undè Tafalla iconem et descriptionem nobiscum communicavit.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Pistillum. 4 Corolla scissa cum staminibus. 5 Bacca. 6 Semina. 7 Semen longitudinaliter sectum, nucleos ostendens.

TOURNEFORTIA LONGIFOLIA. ICON. CL. Fig. b.

4. T. foliis oblongo-lanceolatis obliquis venosissimis rugosis margine parum revolutis, pedunculis corymbosis.

PLANTA fruticosa (*Symphyti majoris* habitu) glabra.

CAULIS erectus, ramosus.

RAMI angulati, sulcati.

FOLIA alterna, breviter petiolata, subpedalia, oblongo-lan-

Tom. II.

ceolata, obliqua, rugosa, integerrima, venosissima, marginibus parum revolutis.

CORYMBI terminales, patentes.

SPICAE pauciflorae.

BACCA tetrasperma.

SEMINA trigona.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Pozuzo* sepes.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Bacca cum calyce. 2 Semina coalita. 3 Eadem disjuncta. 4 Semen transversim sectum, nucleum ostendens.

TOURNEFORTIA VIRGATA. ICON. CL. Fig. a.

5. T. foliis ovato-oblongis subundulatis hispidulis, pedunculis terminalibus subdichotomis.

PLANTA suffruticosa, hispidiuscula.

CAULIS erectus, ramosus, infernè teres.

RAMI angulosi, virgati.

FOLIA alterna, ternatim approximata, breviter petiolata, ovato-oblonga, subacuminata, undulata, integerrima, venosa, rugosiuscula.

CORYMBI terminales, paucis spicis.

SPICAE revolutae.

FLORES secundi, conferti.

COROLLA alba.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus in *Huassahuassi* circuitu.

FLORET Decembri, et Januario.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum.

TOURNEFORTIA ANGUSTIFLORA. IC. CLI. Fig. a.

6. T. foliis ovatis obliquo acumine, pedunculis bifurcatis, corollis angustis.

PLANTA suffruticosa, sesquiulnaris, glabra.

CAULIS erectus, ramosus.

RAMI angulosi.

FOLIA alterna, petiolata, ovata, basi inaequalia, acumine obliquo, integerrima, venosissima.

PEDUNCULI terminales, aliquando axillares, furcati bifurcatique, spicati.

SPICAE conjugatae, bipollicares, parum reflexae.

FLORES secundi, alternatim bifariam digesti, breviter pedicellati.

CALYX minimus, quinquepartitus.

COROLLA alba, longissima, extus leviter pubescens. *Tubus* basi inflatus. *Limbus* patenti-reflexus.

FILAMENTA brevissima, ultra dilatationem tubi corollae inserta. *Antherae* lineares, acutae.

STIGMA sessile.

BACCA globosa, alba, umbilicata, disperma.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Chicoplaya* et *Pueblo nuevo*, ubi Joannes Tafalla delineavit et descripsit.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx cum germine aucto.

G



3 Corolla. 4 Eadem cum staminibus scissa. 5 Pistillum magnitudine naturali. 6 Bacca. 7 Baccae dimidia pars cum seminibus. 8 Semen longitudinaliter scissum nuclei loculum ostendens.

VALLESIA. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil. pag. 28.*  
ICON. V.

VALLESIA DICHOTOMA. ICON. CLI. Fig. b.

1. V. foliis ovatis acutis undulatis, racemis dichotomis.  
FRUTEX triulnaris, glaber.  
CAULIS erectus, ramosus.  
RAMI teretes, flexuosi, erecti.  
FOLIA alterna, breviter petiolata, ovata, integerrima, nitida, parum venosa.  
RACEMI terminales foliisque oppositi, dichotomi.  
FLORES breviter pedicellati.  
COROLLA alba, tubo virescente.  
DRUPAE duae, divergentes, albae.  
HABITAT in Peruviae ruderatis ad Icae Provinciam, unde Tafalla iconem et descriptionem nobiscum communicavit.

FLORET Octobri, et Novembri.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Corolla cum staminibus fissa. 3 Stamen. 4 Pistillum cum calyce. 5 Idem absque calyce. 6 Drupae coalitae. 7 Nux.

Obs. In Regio Hort. Matrit. laete in caldario vegetat *Vallesia cymbaefolia* ORTEG. *Decad. V. pag. 58*, quam Cavanill. in suo Opere Icon. et Descript. vol. 3. pag. 50. tab. 297. sub nomine *Rauwolfiae glabrae* inseruit.

RAUWOLFIA. LINN. *Gen. plant. pag. 160.*

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. Perianthium parvum, tubuloso-campanulatum, quinque-dentatum; inferum, persistens.  
COR. infundibuliformis. Tubus basi globosus. Limbus planus, villosus, quinquepartitus: laciniis subrotundis, integris, marginibus revolutis.  
STAM. Filamenta quinque, infra faucem corollae inserta, filiformia, breviter. Antherae erectae, ovatae, acutae, faucem corollae claudentes.  
PIST. Germen subrotundum. Stylus filiformis, staminum longitudine. Stigma capitatum, emarginatum.  
PER. Drupa globoso-turbinata, bisulca, unilocularis, disperma.  
SEM. Noces duae, obovatae, intus concavae, extus convexae, biloculares. Nuclei ejusdem figurae.  
Obs. Flores *R. macrophyllae* in loco natali saepè tetrandri reperiuntur. *R. flexuosa* in hortis culta tetrandros flores saepius profert.

RAUWOLFIA FLEXUOSA. ICON. CLII. Fig. a.

1. R. foliis oblongis obovatisque angustis, racemis flexuosis paucifloris.

FRUTEX biorgyalis, ramosissimus, spinosus.

CAULIS erectus, ramosissimus, teres.

RAMI erecto-patuli, tetragoni.

FOLIA breviter petiolata, opposita, oblonga obovataque, obtusa, integerrima, aliquando emarginata, supra glabra, rugosa, nitida, subtus pubescentia venosissima.

SPINAE axillares, brachiatae: seniores ramosae, foliiferae.

RACEMI breves, è punctis gemmaceis prodeuntes, flexuosi, septem-novemflori.

FLORES parvi, odore suavissimo, praecipue sub meridiem.

COROLLA albo-lutea, Limbus et Faux villosa.

DRUPA nigro-purpurascens, pisi magnitudine.

SEMINA duo, obovata, extus convexa, bilocularia.

HABITAT in Peruviae fruticetis ad Huanuci urbem, in Provincia Huamalis ad Quivilla, et prope Huariaca, Tarmae Provinciae vicum. Colitur in Hort. Reg. Matrit. è seminibus à nobis missis.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERNACULE Turucasa, id est, Spina obtusa.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus fissa. 4 Pistillum. 5 Drupa cum calyce. 6 Nux extus visa. 7 Eadem intus aspecta. 8 Nux transversim secta loculamenta ostendens.

RAUWOLFIA MACROPHYLLA. ICON. CLII. Fig. b.

2. R. foliis obovatis ovatisque emarginatis integerrimisque, racemis erectis multifloris.

FRUTEX biorgyalis, spinosus.

CAULIS erectus, ramosissimus, teres.

RAMI obtusè tetragoni, brachiati, helvoli coloris, granulis adpersi.

FOLIA opposita, breviter petiolata, obovata ovataque, obtusa, emarginata, nonnulla integerrima, supra nitida, subtus pubescentia, venosissima, rugosa, coriacea, patentia.

PETIOLI pubescentes.

SPINAE oppositae, horizontales, teretes, acutae, rigidae: seniores foliiferae, et floriferae.

PEDUNCULI axillares, inter spinas et folia, multiflori.

FLORES breviter pedicellati.

CALYX pentagonus, pubescens; in fructu quadruplò major, expansus, obtusus.

DRUPA nigra, bilocularis, disperma.

COROLLA lutescens, calyce duplò longior, fauce villosa.

SEMINA bilocularia, ovata, intus concava.

Obs. Stamina saepè quatuor.

HABITAT in Peruviae collibus arenosis, versus Atiquipa tractus, ubi Tafalla eam observavit et delineavit.

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE Chama et Spino de cruces dicitur.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum in receptaculo. 5 Drupa cum calyce. 6 Nux intus conspecta. 7 Eadem extus visa. 8 Nuclei dimidia pars loculamenta ostendens.



CERBERA. LINN. *Gen. plantar.* pag. 162.

CERBERA THEVETIA. Icon. CLIII. Fig. b.

1. C. foliis lineari-lanceolatis confertis longis, pedunculis brevissimis paucifloris.

CERBERA (thevetia) foliis linearibus longissimis confertis. LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag. 591.*

AHOVAI nerii folio, flore luteo. PLUM. *Spec. 20. ic. 18.*

FRUTEX biorgyalis, lactifer, glaber.

CAULIS simplex, erectus, supernè ramosus, frondosus.

RAMI erecto-patuli, teretes, infernè nudi, granulis et cicatriculis foliorum adpersi, viridi-glauci.

FOLIA sparsa, patentia, subsessilia, lineari-lanceolata, acuta, integerrima, subtus avenia, supra venosiuscula, nitida, sesquipalmaria, marginibus parum reflexis.

SETAE plures, breves, ex singulis foliorum axillis.

PEDUNCULI ramei et ex ramusculorum divisionibus, suboc- toflori, breves.

PEDICELLI teretes, bracteolis subulatis suffulti.

CALYX campanulatus, quinquepartitus; laciniis ovato-lan- ceolatis, inflexis; inferus, persistens.

COROLLA infundibuliformis, maxima, lutea. Tubus vires- cens, calyce triplò longior, rectus, subpentagonus. Faux clausa. Limbus campanulato-patens, quinquepartitus: la- ciniis subcuneiformibus, obliquis, truncatis, lateribus sibi invicem imbricatis: os tubi villosum, denticulis quin- que, subulatis antheras obtegentibus.

Nectarium anulare, germen ambiens, quinquecrenatum, longitudine germinis.

Denticuli quinque, ad basim staminum, villosi.

FILAMENTA quinque, brevissima: inter denticulos superio- res et inferiores tubo corollae inserta. Antherae triangula- res, acuminatae, biloculares, utrinque dehiscentes.

GERMEN obtusè tetragonum, depressiusculum. Stylus fili- formis, compressus. Stigma capitatum, acuminatum, denticulis viginti recurvis, duplici ordine digestis, orna- tum, denticulis et antheris incarceratum.

DRUPA subrhombea, obtusè subtetragona, apice latior, sul- cis duobus in crucis formam exarata, unilocularis, evony- miformis, pyri parvi magnitudine, viridi-lutea.

NUX triangularis, fulvescens, compressiuscula, apice latior, sulco longitudinali et transversali exarata, quadrilocula- ris. Nuclei ferè orbiculati, compressi, acuminati.

Obs. Nuclei 2 saepius ad maturitatem perveniunt, reliqui abortiunt, et tunc nux bilocularis.

HABITAT in Peruviae nemoribus ad Pampamarca tractum. Colitur in Limae hortis, et in Reg. Hort. Matrit. è se- minibus à nobis missis.

FLORET in Peruvia Februario, et Martio.

VULGO Arbol de Panamá in urbe Lima dicitur.

USUS: E fructibus, Cascabeles nuncupatis, Indi reticulas lon- gas conficiunt, quas in choreis strepitûs causa ad collum et genua appendunt.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Stamina fauci inserta. 3 Pistillum

cum nectario et denticulis. 4 Drupa. 5 Nux clausa. 6 Eadem aperta. 7 Nuclei.

CESTRUM. LINN. *Gen. plantar.* pag. 136.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. Perianthium tubulosum, parvum, quinquedentatum: denticulis ovatis, erectis: inferum, persistens.

COR. infundibuliformis. Tubus longissimus, tenuis, cylin- dricus. Faux subrotunda. Limbus planus, plicatus, quin- quefidus: laciniis ovatis, acutis, aequalibus, marginatis.

STAM. Filamenta quinque, filiformia, ultra medium tubi inserta, deorsum decurrentia. Antherae incumbentes, parvae, tetragonae, biloculares, intra faucem.

PIST. Germen ovatum, longitudine ferè calycis. Stylus fili- formis, longitudine staminum. Stigma capitatum, depres- sum, obsoletè emarginatum.

PER. Bacca oblongo-ovata, bilocularis, intus exsucca.

SEM. pauca, libera, angulata, truncata.

Obs. 1. Calyx in nonnullis Speciebus obtusè pentagonus, in aliis teres; denticulis plus minusve profundis. Filamen- ta in Cestro undulato denticulo ad basim notata, in reli- quis edentula, basi incrassata. Bacca in plerisque Specie- bus oblonga, in aliis ovata, in nonnullis obovata.

Obs. 2. Cestri Genus differt à Lycii Genere; Tubo corollae tenuissimo; Fauce subrotunda; Limbo plicato; laciniis marginatis; Antheris incumbentibus, tetragonis; Stig- mate depresso; Baccâ intus exsuccâ; Seminibus paucis, magnis, angulatis, truncatis.

HABITUS.

Frutices ramosissimi, foetidi. Caules teretes, saepè granu- losi. Rami erecti, aut diffusi. Folia alterna, aut sparsa, breviter petiolata, exstipulata, integerrima. Pedunculi axillares terminalesque, multiflori. Flores sessiles, aut breviter pedicellati, bracteis totidem stipati. Corollae lutescentes, limbo extus purpurascente. Baccae atro- purpureae.

CESTRUM VIRGATUM.

1. C. foliis lanceolatis acutis, ramis floriferis paniculatis, pedunculis corymboso-racemosis.

CESTRUM (parqui) filamentis denticulatis nudisve, cau- le florifero paniculato, stipulis linearibus. L'HERIT. *Stirp. nov. fasc. 4. pag. 73. tab. 36.*

PARQUI FEWILL. *Per. Obs. tom. 3. pag. 52. pl. 32. fig. 1.*

FRUTEX orgyalis, foetidissimus.

CAULIS erectus, infernè ramosissimus, teres, dilutè fuscus, saepe granulosus, glaberrimus.

RAMI virgati, consimiles, supernè paniculati: teneri vi- rides.

FOLIA alterna, petiolata, patentia, lanceolata, acuta, in- tegerrima, undulata, glabra, parum venosa.

PETIOLI breves, supernè plani.



GEMMAE axillares, foliiferae.

PEDUNCULI axillares terminalesque, in paniculae formam, corymboso-racemosi, leviter tomentosi, bracteis lanceolato-linearibus stipati.

FLORES subsessiles sessilesque.

CALYX quinquedentatus, extus leviter tomentosus, intus supernè pubescens, apice atro-purpureus.

COROLLA lutea, calyce triplò major. *Limbus* extus purpurascens; *laciniis* margine tomentoso involutis.

FILAMENTA edentula, medio tubi affixa, basi curvata, incrassata pubescentiaque. *Antherae* tetragonae, biloculares, incumbentes.

STIGMA capitatum, umbilicatum, viride, depressum.

BACCA ovata, atro-purpurea.

SEMINA saepè octo, oblonga, angulata, fusca.

HABITAT passim in *Conceptionis Chile* circuitu.

FLORET Febuario, et Martio.

VERNACULE *Palqui* et *Parqui*.

VIRES ET USUS: Infusum et decoctum ad febres malignas Incolae adhibent. Boves, qui hac plantâ pascuntur, intumescunt et peréunt.

Obs. L'Heritier folia ramulorum inferiora stipulam perperam appellavit, idemque Filamenta denticulata nudave descripsit: nos autem in loco natali filamenta edentula ad basim tantum tumida et villosa offendimus.

CESTRUM AURICULATUM. ICON. CLV. Fig. a.

2. C. foliis ovatis oblongo-lanceolatisque, auriculis obliquè cordatis, ramis floriferis divergentibus, pedunculis corymboso-paniculatis.

CESTRUM (*auriculatum*) filamentis edentatis, stipulis lunatis. L'HERIT. *Stirp. nov. fasc. 4. p. 71. tab. 35.*

HEDIUNDA jasmínio flore. FEWILL. *Per. Obs. tom. 3. p. 25. pl. 20. fig. 3.*

FRUTEX biorgyalis, foetidissimus, glaber.

CAULIS erectus, infernè ramosissimus, fusco-cinereus, saepè lividus.

RAMI teretes, erecti, granulosi, virgati.

FOLIA alterna, petiolata, reflexa, ovata oblongo-lanceolataque, acuta, carinata, integerrima.

AURICULAE axillares, cordatae, obliquae, deciduae; inferiores magnae.

PEDUNCULI axillares, rarius terminales, solitarii, corymboso-paniculati, ut plurimum quatuordecimflori, erecti, filiformes.

FLORES breviter pedicellati sessilesque, bracteolis linearibus, deciduis stipati.

CALYX brevissimus, quinquedentatus, acutus, erectus, pubescens.

COROLLA lutescens atro-purpurascensque, extus villosiuscula.

FILAMENTA edentula.

BACCA atro-purpurea, ovata, internè exsucca.

SEMINA tria in singulo loculo, angulata, truncata.

HABITAT in *Peruviae* versuris, ruderatis et sepibus, passim

ad *Cercado*, *Chancay*, *Cantae* et *Huanuci* Provincias.

FLORET toto anno.

VULGO: *Yerba Hedionda* et *Yerba Santa*.

VIRES ET USUS: Ab Incolis eximium refrigerans et emolliens remedium reputatur, ad ulcera detergenda decoctum inservit: in *Congo* et *Chavalongo* morborum malignitate afflictis infusum propinatur.

Obs. L'Heritier, cujus iconem *Cestri auriculati* incompletam offendimus, descripsit folia oblongo-lanceolata, stipulas lunulatas, et pedunculos terminales et ex axillis superioribus tantum prodeuntes. Nos quidem in loco natali folia juniora oblongo-lanceolata, seniora et superiora ovata, acuta; folia duo inferiora obliqua, cordata, ramusculorum sive gemmarum, quae auriculas diximus, utpote quae nullatenus sunt stipulae; et tandem pedunculos ex axillis superioribus et inferioribus ortos, aliquando terminales observavimus.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla scissa cum staminibus. 3 Bacca. 4 Eadem transversim secta, loculamenta ostendens. 5 Semina.

CESTRUM UNDULATUM. ICON. CLV. Fig. b.

3. C. foliis ovatis acutis undulatis, pedunculis axillaribus terminalibusque gracilibus paucifloris.

FRUTEX triorgyalis, glaber, foetidus.

CAULIS erectus, ramosus, teres, granulosis.

RAMI patentes, consimiles, longi, virgati, tenues.

FOLIA sparsa, breviter petiolata, reflexa, subcarinata, ovata, acuta, integerrima, undulata, nitida.

PETIOLI inflexi.

PEDUNCULI axillares terminalesque, solitarii, filiformes, suboctoflori; in flore folio breviores, in fructu saepè foliorum longitudine.

FLORES breviter pedicellati, bracteolis linearibus, deciduis suffulti.

CALYX corollâ triplò brevior.

COROLLA lutescens; limbo pubescente.

FILAMENTA basi denticulum introrsum emittentia. *Antherae* tetragonae, parvae.

BACCA violacea, obovata, bilocularis, intus exsucca.

SEMINA sex, angulata, truncata, fusca, libera.

HABITAT in *Peruviae* versuris, ruderatis et sepibus, copiosè ad *Huanuci* urbem.

FLORET toto anno.

VERNACULE *Miu* et *Yerba Hedionda*.

VIRES: ut in praecedenti.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Corolla cum staminibus scissa. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Bacca. 6 Eadem transversim secta, loculamenta ostendens. 7 Semina.

CESTRUM LONGIFLORUM. ICON. CLIV. Fig. a.

4. C. foliis ovato-oblongis acutis, pedunculis terminalibus paniculato-racemosis, corollis longissimis.

FRUTEX biorgyalis.

CAULIS erectus, ramosus, teres.



RAMI consimiles, nitidi; *teneri* pubescentes.

FOLIA alterna, breviter petiolata, ovato-oblonga, integerrima, supra nitidissima, venosa, bipalmaria; *juniora* leviter lanuginosa.

PETIOLI subcontorti.

PEDUNCULI terminales, lanigeri, paniculato-racemosi, foliosi: *partiales* axillares, quatuor-sexflori.

FLORES breviter pedicellati, bracteolis solitariis, lanceolatis sustentati.

CALYX lanuginosus, quinquedentatus, denticulis parvis.

COROLLA longissima, sesquipollicaris, purpurascens. *Tubus* curvatus, glaber. *Limbus* marginibus extus lanatus.

BACCA obscurè purpurea, obovata, magna, bilocularis.

SEMINA numerosa, angulata, parva.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus, ad *Chinchao*, *Macora* et *Cuchero* runcationes.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Corolla cum staminibus fissa. 2 Pistillum. 3 Baccæ dimidia pars loculamenta ostendens. 4 Semina.

*CESTRUM RACEMOSUM*. ICON. CLIV. Fig. b.

5. C. foliis lanceolato-ovatis acutis, racemis brevibus compositis 1-3nisque, intermedio productiori.

FRUTEX triorgyalis, glaberrimus, foetidus.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

RAMI consimiles, longi.

FOLIA alterna, petiolata, subhorizontalia, lanceolato-ovata, acuta, integerrima, venosa, supra nitida, bipalmaria.

PETIOLI subcontorti, breves.

PEDUNCULI axillares, solitarii, bini ternique, racemosi; *intermedio* productiori.

CALYX minimus.

BACCA subglobosa, violacea, bilocularis, tetrasperma, parvi pisi magnitudine.

SEMINA oblonga, fusca.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus, per *Chinchao* et *Macora* runcationes.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VULGO: *Yerba Hedionda* appellatur.

Explic. Icon. 1 Bacca per medium secta, loculamenta ostendens. 2 Semina.

*CESTRUM CONFERTUM*. ICON. CLIII. Fig. a.

6. C. foliis ovato-ovalibus acuminatis coriaceis confertissimis, floribus axillaribus congestis sessilibus.

FRUTEX biorgyalis, subinodorus.

CAULIS erectus, supernè ramosissimus, teres, fuscus.

RAMI diffusi, longissimi, subteretes, dilutè fusci, aliquando granulosi, glabri.

FOLIA sparsa, conferta, breviter petiolata, omnia sursum spectantia, ovato-ovalia, acuminata, integerrima, coriacea, utrinque glabra, supra nitida, marginibus leviter revolutis, nervo supra prominulo, venosa: venis utrinque elevatis.

Tom. II.

PETIOLI subcontorti, supra canaliculati, atri, axillis lanuginosis.

FLORES axillares, congesti, sessiles, bracteis totidem suffulti.

BRACTEAE ovales, concavae, extus lanuginosae, ferrugineae.

CALYX viridi-ater, ore ciliatus.

COROLLA lutescens, calyce quadruplò longior. *Limbus* extus ater, marginibus leviter tomentosis.

FILAMENTA edentula.

BACCAE atro-purpureae, pisi magnitudine.

HABITAT in *Peruviae* silvis, ad *Panao*, *Chacalla* et *Muna* vicos.

FLORET à Julio ad Novembrem.

Explic. Icon. 1 Corolla scissa cum staminibus.

*CESTRUM CONGLOMERATUM*. ICON. CLVI. Fig. a.

7. C. foliis lanceolatis acutis, floribus axillaribus numerosissimis sessilibus triglomeratis.

FRUTEX biorgyalis, graveolens, glaber, nitidus.

CAULIS erectus, ramosissimus, teres.

RAMI patentes, teretes.

FOLIA alterna, petiolata, lanceolata, acuta, integerrima, venosa, patentia.

FLORES numerosi, axillares, in tres globulos aggregati, sessiles, bracteis linearibus lanuginosis distincti.

CALYCES apice hirsuti purpureique.

COROLLA lutea, laciniis extus purpurascentibus.

FILAMENTA edentula.

STIGMA concavum.

Obs. Flores nonnulli limbum 6fidum 7fidumque proferunt, cujus laciniarum numerum sequitur staminum numerus.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis, et altis frigidis locis *Huanu* et *Panao*, versùs *Tambillo* tractum.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Pistillum. 4 Stamina tubo corollae inserta.

*CESTRUM STRIGILATUM*. ICON. CLVI. Fig. b.

8. C. foliis cordatis acutis, pedunculis geminis racemoso-paniculatis altero breviori.

FRUTEX biorgyalis, lanugine brevi strigiliformi respersus.

CAULIS ramosissimus, erectus, teres.

RAMI subpatentes, teretes, caule magis pulverulenti.

FOLIA alterna, breviter petiolata, dependentia, cordata, acuta, cum brevi acumine, integerrima, supra glabra.

PEDUNCULI axillares, gemini, paniculato-racemosi, altero breviori.

FLORES subsessiles, bracteolis minimis suffulti.

CALYX corollâ quadruplò brevior.

COROLLA luteo-viridis. *Tubus* curvatus.

FILAMENTA edentula.

BACCA obovata, truncata, obscure violacea.

SEMINA fusca.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus versùs *Pozuzo*, *Chinchao* et *Cuchero* vicos.

FLORET à Junio ad Octobrem.

H



*CESTRUM LANUGINOSUM*. ICON. CLVII. Fig. a.

9. C. foliis ovatis subcordatisque, pedunculis subcorymbosis foliosis; partialibus 6 floris, floribus sessilibus.

FRUTEX triulnaris, lanuginosus, lanugine helvolâ obductus.

CAULIS erectus, ramosus, teres, infernè glaber, granulatus.

RAMI subdependentes, teretes, longi; teneri valde lanuginosi.

FOLIA alterna, breviter petiolata, ovata, nonnulla subcordata, acuta, integerrima, subtus magis lanuginosa, submembranacea, venosissima.

PEDUNCULI axillares, foliis breviores, foliosi, subcorymbosi: *partiales* quinque-sexflori.

FLORES sessiles, bracteolâ lanceolatâ suffulti.

CALYX lanuginosus, brevis, quinquedentatus.

COROLLA luteo-virescens, glabra: limbo extus atro-purpurascens, tomentoso.

FILAMENA edentula, longitudine faucis corollae.

BACCA nigra, tri-quadrisperma.

SEMINA oblonga, intus plana, extus convexa, fusca.

HABITAT in *Peruviae* collibus arenosis ad *Atiquipa* Provinciae *Camanae* vicum.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

STRYCHNOS. LINN. *Gen. pl. pag. 135.*

## STRYCHNOS BRACHIATA. ICON. CLVII. Fig. b.

1. S. foliis oppositis ovatis oblongisque acuminatis quinquenerviis, caule brachiato tereti, floribus corymbosis.

FRUTEX ramosissimus, scandens, cirrifer.

CAULIS obsoletè angulatus, fusco-cinereus.

RAMI longissimi, ramosi, brachiati, dependentes, granulati, obtusè tetragoni.

FOLIA opposita, breviter petiolata, ovata, oblonga ovaliaque, acuminata, integerrima, quinquenervia, nervis lateralibus obsoletioribus, supra nitida, utrinque glabra, densè venosa, venis horizontalibus.

PETIOLI connati, subcontorti.

CIRRI rarissimi, simplices, spirales, breves.

PEDUNCULI axillares terminalesque, solitarii, corymbosi, multiflori.

PEDICELLI breves, bracteolâ lineari-subulatâ, deciduâ stipati.

CALYX minimus, pentaphyllus, hirsutus, deciduus.

COROLLA alba, pentandra, extus hirsuta, calyce quadruplò longior.

BACCA magna, globosa, corticosa, fragilis, viridi-lutescens, dependens, unilocularis, pulpâ luteâ referta.

SEMINA suborbiculata, compressa, plerumque varie angulata, glabra, fulva, cornea, pellucida, crustâ fragili cinereâ tecta, nidulantia.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus imis versus *Pozuzo* vicum, et ad *Tramo* tractum.

FLORET Octobri, et Novembri.

VERNACULE *Taruca-miccuna*, id est, *Comida de Venados*.

USUS. Cervi semina vorant, undè nomen vernaculum.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem cum staminibus fissa. 5 Stamina aucta. 6 Pistillum. 7 Bacca per medium secta. 8 Semen.

CAPSICUM. LINN. *Gen. pl. pag. 135.*

## CAPSICUM FRUTESCENS.

1. C. caule fruticoso scabriusculo, pedunculis solitariis. LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag. 522.*

PLANTA bipedalis, annua, glabra.

CAULIS erectus, dichotomus, pentagonus, nodosus, angulis acutis scabriusculis, lineolis prominulis, viridioribus adpersus.

RAMI tetragoni, consimiles.

FOLIA è latere singulae dichotomiae solitaria, ovata, acuta, deflexa, integerrima, basi inaequalia, apice obliquo, margine undulata, venosissima, nervo supra prominulo, longè petiolata.

PETIOLI incurvi, ad basim articulati, superius bisulci.

PEDUNCULI ex dichotomiis, solitarii, erecti, longitudine petiolorum, obsoletè tetragoni, supernè inferneque incrassati, versus basim articulati.

CALYX campanulatus, quinquedentatus.

COROLLA alba, calyce duplò longior.

BACCA conica, parva, erecta, glabra, nitida, lutea.

HABITAT copiosè in *Peruviae* cultis.

FLORET ferè toto anno.

VERNACULE *Arnaucho*, et *Aji Arnaucho*.

USUS. Fructus magni usus est in *Peruvia* ad cibos condiendos.

## CAPSICUM PUBESCENS.

2. C. caule suffruticoso, foliis ovatis acutis apice obliquo, pedunculis angulatis, fructibus subrotundis nutantibus.

PLANTA suffruticosa, 4-5 pedalis, pubescens.

CAULIS erectus, angulatus, nodosus, dichotomus, lineolis adpersus, geniculis atro-purpureis.

RAMI consimiles, patentissimi.

FOLIA è latere singulae dichotomiae, solitaria, ovata, acuta, apice obliquo, integerrima, venosissima, ferè bullata, nervo supernè prominulo.

PETIOLI incurvati, supra bisulci, breves, propè basim articulati.

PEDUNCULI è dichotomiis, solitarii, rarius gemini, uniflori, petiolis longiores, angulosi, supernè incrassati.

COROLLA violacea, laciniis acutis.

BACCA subrotunda, depressiuscula, magnitudine mediocris Mali, crassa, valde mordicans, viridi-lutea.

HABITAT affatim in *Peruviae* cultis, praesertim ad *Panatahuarum* Provinciam et in *Andium* nemoribus.

FLORET per totum ferè annum.

VERNACULE *Roccoto* nuncupatur.

USUS. Fructus quamvis valde mordicanti sapore praeditos,



in condimentis frequenter Incolae adhibent.

**SOLANUM.** LINN. *Gen. pl. pag.* 134.

**SOLANUM CALYGNAPHALUM.**

1. S. caule inermi fruticoso, foliis lanceolatis repandis, umbellis oppositifoliis tomentosis, baccis nutantibus.

FRUTEX biorgyalis.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

RAMI consimiles, patentes.

FOLIA alterna, petiolata, lanceolata, acuta, integerrima, repanda, glabra, nitida.

PEDUNCULI oppositifolii, tomentosi.

FLORES umbellati, pedicellati.

CALYCES tomentosi.

COROLLA violacea, calyce triplò major.

BACCAE nutantes, atro-rubrae, saponaceae, Avellanarum nucum magnitudine.

HABITAT in *Peruviae* umbrosis et calidis locis ad *Tarmae* oppidum, et in *Acobamba* sepibus.

FLORET Majo, et Junio.

VERNACULE *Nuñunya* dicitur.

USUS: Feminae fructibus aut baccis maturis faciem fucant.

**SOLANUM CRISPUM.** ICON. CLVIII. *Fig. a.*

2. S. caule inermi fruticoso, foliis ovatis subcordatisque undulato-crispis acuminatis, floribus corymbosis.

FRUTEX subtriorgyalis, glaber, amarissimus.

CAULIS solitarius, erectus, supernè ramosissimus, teres.

RAMI patentes, flexuosi, teretes: *teneri* angulati.

FOLIA alterna, petiolata, ovata subcordataque, undulato-crispa, integerrima, supra nitida.

PETIOLI breves, supra leviter sulcati.

PEDUNCULI oppositifolii terminalesque, erecti.

CORYMBI multiflori.

COROLLA dilute violacea, calyce duplò major.

BACCA albo-lutescens, pisi magnitudine.

HABITAT in *Chile* ruderalis, copiosè in *Conceptionis* urbis sepibus, et ad *Carcamo* et *Palomares* tractus.

FLORET Septembri, et Octobri.

VERNACULE *Natre* appellatur.

VIRES ET USUS: Incolae decoctum, vel infusum ad febres inflammatorias *Congo* et *Chavalongo* dictas, in frequenti usu habent.

Explic. Icon. 1 Stamen. 2 Bacca transversim secta. 3 Semina.

**SOLANUM LINEATUM.** ICON. CLVIII. *Fig. b.*

3. S. caule inermi fruticoso, foliis geminis ovatis acuminatis lineatis subtus villosis, pedunculis interfoliaceis unifloris.

PLANTA fruticosa, biulnaris.

CAULIS erectus, teres, glaber, ramosus.

RAMI diffusi, flexuosi, teretes: *teneri* hirsuti, helvoli.

FOLIA gemina, altero duplò majori, breviter petiolata,

ovata, acuminata, lineata, integerrima; *seniora* margine parum revoluta, subtus densè hirsuta, supra glabra; *juniora* utrinque hirsuta, plana.

PEDUNCULI interfoliacei, solitarii, uniflori, filiformes, supernè incrassati, hirsuti.

CALYX hirsutus, decemfidus; *laciniis* subulatis.

COROLLA alba, longitudine calycis.

BACCA globosa, calyce incarcerata, fusca, ciceris magnitudine.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Muña* vicum.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Stamen. 2 Capsula transversim secta locamenta ostendens. 3 Semina.

**SOLANUM FILIFORME.** ICON. CLIX. *Fig. b.*

4. S. Caule inermi fruticoso, foliis ovatis cordatisque obtusis, pedunculis lateralibus filiformibus bifidis subumbellatis.

PLANTA fruticosa, pubescens, orgyalis, (habitu *Salviae*).

CAULIS erectus, ramosus, teres, granulatus.

RAMI patentes, granulati; *juniores* hirsuti.

FOLIA alterna, petiolata, ovata cordataque, obtusa, integerrima, utrinque densè pubescentia, venosa.

PETIOLI longi, hirsuti, tenues.

PEDUNCULI laterales, filiformes, bifidi.

FLORES subumbellati, cernui.

CALYX quinquefidus, pubescens.

COROLLA albo-caerulea, calyce triplò major.

HABITAT in *Peruviae* collibus ad *Lomas de Atiquipa*, undè Tafalla plantae nonnulla specimina exsiccata nobiscum communicavit.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum.

**SOLANUM CYMOSUM.** ICON. CLX. *Fig. a.*

5. S. caule inermi herbaceo, foliis ovato-lanceolatis per petiolum decurrentibus, pedunculis rameis, floribus cymosis.

PLANTA herbacea, sesquipedalis, glabra, annua.

CAULIS erectus, ramosus, angulatus.

RAMI patentes, consimiles, parum flexuosi.

FOLIA alterna, petiolata, ovato-lanceolata, integerrima, per petiolum decurrentia, plana, patentia.

PEDUNCULI ramei, solitarii, foliis breviores, leviter pubescentes.

FLORES cymosi, parvi, breviter pedicellati, erecti; in fructu racemosi, secundi.

CALYX quinquefidus, acutus, minimus.

COROLLA caerulescens, calyce duplò major, patens.

BACCAE rubrae, dependentes, pisi parvi magnitudine.

HABITAT in *Peruviae* cultis, versuris et subhumidis locis per *Limae* et *Chancay* Provincias.

FLORET Majo, Junio et Julio.



*SOLANUM NIGRUM.*

6. *S. (nigrum)* caule inermi herbaceo, foliis ovatis dentato-angulatis, racemis distichis nutantibus. LINN. *Sp. pl.* tom. 1. pag. 514.

*HABITAT* copiosè in *Peruviano* et *Chilensi* Regno.

*FLORET* toto anno.

*VULGO* : *Yerba mora*.

*Obs.* In diversis locis mirum quàm variat.

*SOLANUM BIFORMIFOLIUM.* ICON. CLXI. *Fig. a.*

7. *S.* caule inermi suffruticoso flexuoso, foliis geminis oblongo-lanceolatis; altero minimo orbiculato, pedunculis unifloris interfoliaceis.

*PLANTA* suffruticosa, orgyalis.

*CAULIS* erectus, teres, ramosus, fuscus.

*RAMI* flexuosi, angulosi, hispiduli.

*FOLIA* gemina, parum obliqua, integerrima, subtus per venas nervosque, supra per nervos tantum hispidula: alterum parvum, orbiculatum, basi excavatum, subsessile: alterum quadruplò majus, breviter petiolatum, lanceolatum, acuminatum, integerrimum.

*PEDUNCULI* interfoliacei, saepius bini, aliquando 3-4-5ni, uniflori, filiformes, hispidi, basi attenuati, erecto-incurvi.

*CALYX* decempartitus, hispidus: *laciniis* subulatis.

*COROLLA* purpureo-violacea, semiquinquefida, patens.

*ANTHERAE* luteae.

*BACCA* luteo-rubra, calyce incarcerata, pisi magnitudine.

*SEMINA* luteo-fusca.

*HABITAT* in *Peruviae* nemoribus ad *Chinchao* runcationes.

*FLORET* Augusto, et Septembri.

*Explic. Icon.* 1 Stamen.

*SOLANUM PHYLLANTHUM.*

8. *S.* caule alato, foliis decurrentibus ovatis subtriangularibusque, racemis oppositifoliis, floribus pendulis.

*SOLANUM (phyllanthum)* caule herbaceo alato: foliis floriferis. CAVAN. *Ic. vol. 4. p. 35. tab. 359. f. 1.*

*PLANTA* bipedalis, herbacea, asperiuscula, annua.

*RADIX* ramosa, tenuis, fibrillosa, albida.

*CAULIS* erectus, subdichotomus, teres, alatus è decursu foliorum, ramosus.

*RAMI* patuli, consimiles.

*FOLIA* alterna, decurrentia; *superiora* plerumque opposita; *alterum* longius, angustius, spathulatum, pedunculi-ferum: *reliqua* ovata subtriangulariaque, integerrima, dentata angulosaque.

*PEDUNCULI* oppositifolii, usque ad foliorum discum decurrentes, postea divergentes solitarii, ferè bipollicares, furcati.

*FLORES* alterni, longè pedicellati, racemoso-paniculati, secundi, nutantes.

*CALYX* quinquefidus; *laciniis* linearibus, obtusis.

*COROLLA* albo-purpurea, aliquando albo-caerulea, calyce triplò major.

*ANTHERAE* oblongae, luteae.

*BACCAE* rotundae, dependentes, pisi magnitudine.

*SEMINA* lutescentia.

*HABITAT* affatim in *Limae*, *Chançay* et *Lurin* arenosis locis.

*FLORET* Majo, et Junio.

*SOLANUM MONTANUM.* ICON. CLX. *Fig. b.*

9. *S.* caule inermi herbaceo, radice tuberosa globosa, foliis ovatis integris laciniatisque, pedunculis 3-7floris.

*SOLANUM (montanum)* caule inermi herbaceo, foliis subcordatis repandis. LINN. *Sp. pl. tom. 1. p. 514.*

*SOLANUM* tuberosum minus, atriplicis folio, vulgò *Papa montana*. FEW. *Per. Obs. 3. p. 62 planch. 46.*

*PLANTA* herbacea, hispidiuscula, pedalis.

*RADIX* tuberosa, subrotunda, fibrillosa.

*CAULIS* erectus, ramosus, striato-angulatus.

*RAMI* alterni, supernè dichotomi.

*FOLIA* alterna, ovata, integra lobata laciniataque: *inferiora* longè petiolata; *superiora* sessilia, saepè petiolata, nonnulla decurrentia.

*PEDUNCULI* oppositifolii terminalesque, longi, 3-7flori, infra medium folio unico saepius integro, sessili.

*FLORES* alterni, pedicellati, erecti.

*CALYX* quinquepartitus; *laciniis* linearibus, obtusis.

*COROLLA* caerulea, calyce triplò major.

*BACCAE* flavescens, pisi magnitudine.

*HABITAT* in collibus arenosis et saxosis *Limae* et *Chançay*.

*FLORET* Junio, et Julio.

*VERNACULE* *Papas de Lomas* dicitur.

*Usus*: Radix ad sues saginandos eximia.

*SOLANUM VARIEGATUM.* ICON. CLXII. *Fig. a.*

10. *S.* caule inermi perennante, foliis lanceolatis basi inaequalibus excavatis, floribus cymosis, fructu maximo ovato.

*MELONGENA* laurifolia, fructu turbinato variegato. FEW. *Per. Obs. t. 2. p. 735. pl. 26.*

*PLANTA* herbacea, bipedalis et ultra, pubescens, perennis.

*CAULIS* erecto-procumbens, angulatus, nodosus, radicans, ramosus.

*RAMI* consimiles.

*FOLIA* sparsa, longè petiolata, lanceolata, repanda, integerrima, basi excavata, inaequalia.

*PEDUNCULI* ramei terminalesque, longi, teretes, multiflori.

*FLORES* cymosi, cernui.

*CALYX* quinquepartitus: *laciniis* lanceolatis.

*COROLLA* albo-caerulea, alba violaceaue.

*ANTHERAE* violaceae, aut luteae.

*BACCA* ovata, acuminata, laevis, nitida, alba, purpureo colore variegata, pendula, ferè *Citri Limonis* figurâ, 1-2palmaris.

*SEMINA* lutea, lentiformia.



*HABITAT* copiosè in *Peruviae* cultis.

*FLORET* ab Augusto ad Novembrem.

*VULGO*: *Pepino de la tierra*.

*VIRES ET USUS*. Fructus edules, Melonis sapore, sed eorum nimius usus febres intermittentes et dysenterias excitat.

*Obs.* Planta taleolis propagatur.

*Explic. Icon.* 1 Bacca transversim secta loculamenta ostendens. 2 Semina.

*SOLANUM SERICEUM*. *ICON. CLXI. Fig. b.*

11. S. caule inermi fruticoso, ramis gracilibus, foliis ovatis sericeis integerrimis, pedunculis lateralibus 2-6floris.

PLANTA fruticosa, triulnaris.

CAULIS erectus, teres, fuscus, glaber, ramosus.

RAMI longissimi, diffusi, filiformes, subteretes, graciles: *teneri* tomentosi, foliosi.

FOLIA alterna, solitaria, longè petiolata, ovato-lanceolata, acutiuscula, angusta, parva, integerrima, utrinque sericea, incana.

PEDUNCULI laterales, 2-6flori, tenues, densè pubescentes.

CALYCES quinquefidi, obtusiusculi, tomentosi.

COROLLA intus violaceo-caerulea, extus sericea, quinqueloba, calyce triplò major.

BACCA rubra, pisi magnitudine.

*HABITAT* in *Huassahuassi* nemoribus imis, calidis.

*FLORET* Decembri, et Januario.

*Explic. Icon.* 1 Stamen.

*SOLANUM ACUTIFOLIUM*. *ICON. CLXII. Fig. b.*

12. S. caule inermi suffruticoso flexuoso, foliis geminis ternisque lanceolatis integerrimis, pedunculis unifloris interfoliaceis.

PLANTA suffruticosa, hirsuta.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

RAMI flexuosi, hispidiusculi, supernè dichotomi.

FOLIA plerumque gemina, altero minimo, rarius subverticillato-terna, inaequalia, breviter petiolata, lanceolata, acuta, angusta, integerrima, utrinque hispidula, deflexa.

PEDUNCULI interfoliacei terminalesque, solitarii, uniflori, hispiduli, capillares, supernè incrassati.

CALYX hispidus, decemdentatus; denticulis subulatis.

COROLLA alba, profunde quinqueloba; laciniis lanceolatis, remotis.

ANTHERAE luteae.

BACCAE subrotundae, ciceris magnitudine, aurantii coloris.

*HABITAT* in *Muña* nemoribus calidis.

*FLORET* Julio, et Augusto.

*SOLANUM ANGUSTIFOLIUM*. *ICON. CLXIII. Fig. b.*

13. S. caule inermi fruticoso, ramis pulverulentis, foliis lanceolato-linearibus longis, racemis rameis subcorymbosis.

FRUTEX triulnaris.

*Tom. II.*

CAULIS erectus, teres, ramosissimus.

RAMI consimiles; *juniore*s virgati, pulverulenti, foliosi.

FOLIA alterna, petiolata, ferè bipalmaria, lanceolato-linearia, acuta, integerrima, undulato-repanda, valde venosa, rugosiuscula, subtus magis pulverulenta.

PEDUNCULI ramei, racemoso-corymbosi, pulverulenti, multiflori.

CALYX semiquinquefidus, pulverulentus.

COROLLA albo-violacea, calyce duplò major, profunde quinquefida, extus pulverulenta.

BACCA subovata, nigra, ciceris magnitudine.

SEMINA lutescentia.

*HABITAT* in nemoribus *Huanuci* ad *Acomayo* tractus.

*FLORET* Junio, et Julio.

*Explic. Icon.* 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Stamina. 4 Pistillum.

5 Bacca cum calyce. 6 Eadem transversim secta loculamenta ostendens. 7 Semina.

*SOLANUM LANCEOLATUM*. *ICON. CLXIV. Fig. a.*

14. S. caule inermi fruticoso, ramis pulverulentis, foliis lanceolatis acutis, racemis terminalibus, corollis magnis.

FRUTEX biorgyalis, pulverulentus.

CAULIS erectus, teres, ramosus, fuscus, glaber.

RAMI patentes, angulati: *teneri* foliosi.

FOLIA sparsa, breviter petiolata, lanceolata, acuta, integerrima, supra nitida, parum undulata, sesquipalmaria.

RACEMI terminales, subcorymbosi, multiflori.

CALYCES corollà sextuplò breviores.

COROLLA magna, patentissima, quinqueloba, acuminata, violacea.

ANTHERAE luteae.

BACCAE nigrae, cerasi magnitudine.

*HABITAT* in *Peruviae* nemoribus ad *Muña* et *Tambo nuevo*.

*FLORET* Septembri, et Octobri.

*SOLANUM NITIDUM*. *ICON. CLXIII. Fig. a.*

15. S. caule inermi fruticoso, ramis glabris nitidis, foliis ovato-lanceolatis acutis, racemis terminalibus subcymosis.

FRUTEX biulnaris, glaber, nitidus.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

RAMI teretes, flexuosi, nitidi.

FOLIA alterna, petiolata, ovato-lanceolata, acuta, integerrima, leviter repanda, venosa; venis horizontalibus, ramosis.

PETIOLI basi incrassati.

RACEMI terminales, subcymosi, pulverulenti.

CALYX quinquefidus; *laciniis* ovatis, acutis.

COROLLA calyce quadruplò major, quinqueloba, albo-violacea, extus pulverulenta.

BACCAE nigrae, ciceris magnitudine.

*HABITAT* in *Peruviae* nemoribus ad *Tarmae* Provinciam.

*FLORET* Majo, et Junio.

*VERNACULE Rapace.*



*Explic. Icon.* 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Stamina. 4 Pistillum.  
5 Bacca cum calyce. 6 Eadem per medium secta locu-  
lamenta ostendens. 7 Semina.

*SOLANUM ACUMINATUM.* ICON. CLIX. *Fig. a.*

16. S. caule inermi fruticoso, foliis geminis ovatis oblon-  
gisque acumine stricto, racemis lateralibus, floribus se-  
cundis.

PLANTA fruticosa, glabra, nitida.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI consimiles.

FOLIA petiolata, integerrima cum acumine stricto subspha-  
celato, supra nitidiora, alternatim gemina; *altero* duplò  
minori, ovato; *majori* oblongo.

RACEMI laterales, solitarii, ferè bipollicares, folio triplò  
breviores, multiflori.

FLORES duplici serie alternantes, secundi, pedicellis tenui-  
bus, supernè incrassatis.

CALYX quinquefidus, obtusus, corollà triplò brevior.

COROLLA parva, profunde quinqueloba, alba: *lobis* acutis.

BACCA globosa, ciceris magnitudine, nigricans.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Chinchao* vicum.

FLORET Julio, et Augusto.

*Explic. Icon.* 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Sta-  
mina. 4 Pistillum. 5 Bacca.

*SOLANUM INCURVUM.* ICON. CLXIV. *Fig. b.*

17. S. caule herbaceo, foliis ovatis acuminatis, racemis  
geminis, altero breviori, pedicellis incurvis secundis.

PLANTA herbacea, bipedalis.

CAULIS erectus, glaber, articulationibus incrassatus, an-  
gulatus, ramosus.

RAMI consimiles, patentiusculi.

FOLIA alterna, longè petiolata, ovata, acuminata, utrin-  
que pubescentia, integerrima, venosa, sesquipalmaria.  
*Folium* parvum è singulis axillis.

PETIOLI folio duplò breviores, hirsuti.

RACEMI axillares, gemini, bifidi, altero breviori.

FLORES duplici ordine alternantes, secundi.

PEDICELLI incurvati, longi, uniflori, violacei, hirsuti.

CALYX campanulatus, leviter quinquefidentatus, pubescens,  
brevis.

COROLLA albo-violacea, calyce triplò longior.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Muña* vicum.

FLORET Augusto, et Septembri.

*SOLANUM OBLONGUM.* ICON. CLXV. *Fig. b.*

18. S. caule inermi suffruticoso, foliis geminis oblongis  
acuminatis; altero maximo, racemis lateralibus brevissi-  
mis, floribus secundis.

PLANTA suffruticosa, glaberrima, biulnaris.

CAULIS teres, laevis.

RAMI consimiles.

FOLIA gemina, inaequalia, petiolata, oblonga ovataque,

acuminata, integerrima; nervo extus bisulco: *majora*  
tripalmaria; *parva* quadruplò minora.

RACEMI laterales, longitudine petiolorum.

FLORES duplici ordine alternantes, secundi, parvi.

CALYCES quinquefidentati, obtusi.

COROLLA profunde quinquefida, patens, albo-violacea, ca-  
lyce duplò major.

BACCA lutescens, ciceris magnitudine.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Pillao* tractus.

FLORET Augusto, et Septembri.

*Explic. Icon.* 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Sta-  
mina. 4 Pistillum.

*SOLANUM NUTANS.* ICON. CLXVI. *Fig. a.*

19. S. caule inermi fruticoso, foliis oblongo-ovatis acumi-  
natis, racemis brevissimis oppositifoliis, floribus secun-  
dis nutantibus.

FRUTEX biorgyalis, ferrugineus.

CAULIS erectus, ramosissimus.

RAMI teretes, granulosi, lanuginosi, ferruginei: *teneri*  
subangulosi.

FOLIA alterna, petiolata, oblongo-ovata, acuminata, inte-  
gerrima, venosissima, subtus lanuginosa, ferruginea,  
supra glabriuscula.

RACEMI oppositifolii, recurvi, brevissimi, ferè sexdecim-  
flori.

FLORES duplici serie secundi, subspicati, breviter pedi-  
cellati: *plures* decidui.

PEDICELLI curvati, lanuginosi.

CALYCES lanuginosi, quinquefidi; *laciniis* ovatis.

COROLLA alba, brevis, calyce duplò major.

BACCA globosa, lutea.

SEMINA lutescentia.

HABITAT in *Peruviae* ruderatis passim in *Pillao* circuitu.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE *Chuculate.*

*Explic. Icon.* 1 Stamina. 2 Semen.

*SOLANUM DICHOTOMUM.* ICON. CLXVI. *Fig. b.*

20. S. caule inermi fruticoso, foliis oblongis acuminatis in-  
canis, corymbis terminalibus dichotomis multifloris.

FRUTEX triorgyalis, incanus, tomentosus.

CAULIS erectus, crassiusculus, teres, supernè ramosus.

RAMI patentiusculi, teretes, saepè granulosi: *teneri* erecti,  
tomentoso-pulverulenti, canescentes.

FOLIA sparsa, patentia, in summitatibus ramorum, oblon-  
ga, acuminata, integerrima, latiuscula, tripalmaria, ca-  
nescentia, subtus densè tomentosa.

PETIOLI uni-bipollicares.

CORYMBI terminales, magni, dichotomi, incani, multiflori.

FLORES pedicellati, parvi.

CALYCES quinquefidi: *laciniis* acutis.

COROLLA profunde quinquefida, acuta, patens, calyce du-  
plò major, violacea.

BACCA lutea, avellanae nucis magnitudine.



*HABITAT* in *Huanuci* Provincia ad torrentium margines.

*FLORET* Julio, Augusto et Septembri.

*Explic. Icon.* 1 Stamina. 2 Racemi pars cum fructibus.

*SOLANUM SESSILE.* *ICON.* CLXVII. *Fig. a.*

21. S. caule inermi fruticoso, foliis oblongo-spathulatis sessilibus, pedunculis terminalibus recurvo-pendulis, floribus capitato-umbellatis.

FRUTEX biorgyalis, glaber.

CAULES plures, erecti, simplicissimi, teretes, supernè angulosi.

FOLIA sparsa, conferta, erecta, sessilia, oblongo-spathulata, acuminata, integerrima, pedalia et ultra, ad basim crispa, valde venosa.

PEDUNCULUS terminalis, solitarius, unicus è singulo caule, spithamaeus, recurvus.

FLORES in capitulum dichotomo-trifidum, numerosi, breviter pedicellati, parvi.

PEDICELLI erecti, in fructu curvati, inaequales.

CALYCES quinquefidi; *laciniis* brevibus, obtusis.

COROLLA alba, calyce triplò major, profunde quinquefida; *laciniis* acutis.

ANTHERAE atro-purpureae.

BACCA alba, cerasi magnitudine.

SEMINA parva, lutescentia.

*HABITAT* in *Peruviae* ruderatis ad *Muña* vicum.

*FLORET* Junio, Julio et Augusto.

*Explic. Icon.* 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Stamina. 4 Bacca. 5 Semina.

*SOLANUM OBLIQUUM.* *ICON.* CLXV. *Fig. a.*

22. S. caule inermi suffruticoso, foliis cordatis obliquis acutis, pedunculis lateralibus recurvis, floribus secundis.

FRUTEX biorgyalis, glaber.

CAULIS erectus, teres, variegatus.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, petiolata, cordata, acuta, obliqua, supra nitida, leviter pubescentia.

PEDUNCULI laterales, spicati, revoluti.

FLORES duplici serie, secundi: *superiores* breviter pedicellati; *inferiores* pedicellis longissimis, incurvis.

CALYX quinquefidus; *laciniis* subrotundis.

COROLLA purpureo-violacea, profunde quinquefida: *laciniis* lanceolatis, calyce quadruplò major.

ANTHERAE violaceae.

BACCA oblonga, utrinque acutiuscula.

*HABITAT* in *Peruviae* nemoribus, ad *Chinchao* vicum.

*FLORET* Augusto, et Septembri.

*Explic. Icon.* 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Bacca cum calyce.

*SOLANUM OPPOSITIFOLIUM.* *ICON.* CLXVIII. *Fig. a.*

23. S. caule fruticoso, foliis oblongis acuminatis, pedunculis oppositifoliis bi-quadrifloris.

PLANTA fruticosa, orgyalis, glabra.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

RAMI erecti, nitidi.

FOLIA alterna, breviter petiolata, oblonga, acuminata, leviter undulato-repanda, utrinque glabra, supra nitida, viridia, mitissima, parum venosa.

PETIOLI brevissimi, sulcati.

PEDUNCULI oppositifolii, teretes, bi-quadriflori.

CALYX quinquedentatus, in flore parvus, in fructu magnus, ferè urceolatus.

COROLLA alba, quinquefida; *laciniis* uncinatis.

ANTHERAE luteae.

*HABITAT* in *Peruviae* nemoribus ad *Vitoc* vicum, undè Tafalla iconem nobiscum communicavit.

*FLORET* Augusto, et Septembri.

*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Bacca intra calycem.

*SOLANUM GLANDULOSUM.* *ICON.* CLXVII. *Fig. b.*

24. S. caule suffruticoso scandente, foliis geminis ovato-cordatis, pedunculis 3-5nis interfoliaceis, denticulis calycinis glandulaeformibus.

PLANTA suffruticosa, scandens, glabra.

CAULIS teres.

RAMI consimiles.

FOLIA gemina, breviter petiolata, subaequalia, ovato-cordata, basi inaequalia, acuta, integerrima, repanda, venosissima.

PEDUNCULI interfoliacei, 3-4-5ni, uniflori, pollicares, inaequales, teretes, supernè incrassati.

CALYX turbinatus, angulato-striatus, carnosus: *laciniis* decem, rarius 12-14, glandulaeformibus, alternis majoribus: *striis* in fructu oblitteratis.

COROLLA alba, patentissima, limbo involuto, plicato, obsolete quinquelobo.

BACCA globosa, dilute coccinea.

SEMINA obtusè acuminata, albida.

*HABITAT* in *Peruviae* nemoribus ad *Vitoc* Provinciae *Tarmae* vicum.

*FLORET* Augusto, et Septembri.

*Explic. Icon.* 1 Calyx. 2 Corolla scissa cum staminibus. 3 Pistillum cum calyce. 4 Baccae dimidia pars cum calyce loculamenta ostendens. 5 Semina.

*SOLANUM GRANDIFLORUM.* *IC.* CLXVIII. *Fig. b.*

25. S. caule arboreo, foliis ovatis sinuatis integerrimisque; racemis rameis recurvis, floribus secundis magnis.

ARBOR sexorgyalis.

TRUNCUS erectus, teres, frondosissimus, crassus.

RAMI teretes: *teneri* subangulati, lanuginosi.

FOLIA alterna, petiolata, ovata, sinuato-angulata integerrimaque, repanda, subtus lanuginosa venosissima, supra hispida, basi inaequalia.

PETIOLI bipollicares, leviter sulcati.

PEDUNCULI ramei, solitarii, multiflori, breves, racemosi.



FLORES duplici serie alternantes, secundi.

CALYX quinquepartitus, lanuginoso-hispidus, crescens.

COROLLA magna, violacea, zonis quinque extus lanuginosis, intus dilutioribus.

ANTHERAE violaceae.

STYLUS violaceus. *Stigma* leviter emarginatum.

BACCA magna, lutescens, lanuginosa, dependens.

SEMINA lutescentia.

*Obs.* Lanugo omnium plantae partium fulvescens in stellae formam, in calycibus lanugo penicilli instar.

*HABITAT* in *Peruviae* nemoribus imis et calidis ad *Pozuzo*.

*FLORET* Augusto, et Septembri.

*SOLANUM ANCEPS*. ICON. CLXIX. *Fig. a.*

26. S. caule herbaceo, foliis oblongo-lanceolatis, pedunculis axillaribus 2-3nis brevissimis, fructibus conicis ancipitibus.

PLANTA herbacea, tripedalis.

CAULIS teres, parum ramosus.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, petiolata, oblongo-lanceolata, acuta, integerrima, utrinque glabra.

PEDUNCULI axillares, bini ternique, breves, inaequales, racemosi, pauciflori.

FLORES secundi, breviter pedicellati, duplici serie.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* subrotundis.

COROLLA parva, calyce duplò major, virescens.

BACCA conica, anceps, versus apicem multiangularis, albicans.

*HABITAT* in *Peruviae* nemoribus ad *Cuchero* tractus.

*FLORET* Julio, et Augusto.

*Explic. Icon.* 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Bacca.

*SOLANUM PUBESCENS*. ICON. CLXIX. *Fig. b.*

27 S. caule fruticoso, foliis ovatis acutis, racemis lateralibus, floribus secundis.

FRUTEX biorgyalis, pubescens.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI consimiles; *teneri* pubescentes, foliosi.

FOLIA sparsa, petiolata, ovata, acuta, integerrima, utrinque pubescentia.

PEDUNCULI ramei, solitarii, racemosi, foliis duplò breviores, pauciflori, pubescentes.

FLORES secundi, duplici serie alternantes.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* acutis, in fructu reflexis.

COROLLA albo-lutescens.

BACCA globosa, nitida, glaberrima, aurantii coloris, cerasi magnitudine.

SEMINA fulvescentia.

*HABITAT* in *Peruviae* nemoribus ad *Cuchero* tractus.

*FLORET* Januario, et Februario.

*Explic. Icon.* 1 Baccae dimidia pars inferior loculamenta ostendens. 2 Semina aucta.

*SOLANUM ANGULATUM*. ICON. CLXX. *Fig. a.*

28. S. caule bienni, foliis cordatis sinuato-angulatis, racemis lateralibus brevissimis paucifloris recurvis.

*SOLANUM* amplissimo anguloso hirsutoque folio, fructu aureo maximo. *Few. Per. Obs. t. 3. p. 62. planch. 46.*

PLANTA biennis, ulnaris, hirsutissima.

RADIX perpendicularis, ramosa, fibrillosa, lutescens.

CAULIS erectus, parum ramosus, teres.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, petiolata, amplissima, cordata, sinuato-angulata, venosissima.

PETIOLI tripollicares.

PEDUNCULI ramei et ex dichotomiis, racemosi, breves, recurvi, pauciflori.

FLORES breviter pedicellati, duplici serie secundi.

CALYX quinquefidus: *laciniis* acutis.

COROLLA albo-violacea, calyce paulò longior.

BACCA globosa, parvi citri aurantii magnitudine et colore, lanugine brevi tecta, tandem glabra, nitida, fragrans.

SEMINA lutescentia.

*HABITAT* in *Peruviae* hortis.

*FLORET* à Junio ad Septembrem.

*VERNACULE* *Naranjitas de Quito.*

*VIRES ET USUS*: Fructus in *Mixtura* florum odoris gratia, et succi guttas aliquas in potu (*Mate* dicto) Feminae adhibent.

*Obs.* Linnaeus Synonimiam *Solani* *Fewill.* ad *Solanum macrocarpon* perperam retulit.

*Explic. Icon.* 1 Flos integer.

*SOLANUM QUERCIFOLIUM*.

29. S. caule suffruticoso, foliis laciniato-pinnatifidis, cymis lateralibus multifloris.

*SOLANUM* (*quercifolium*) caule inermi subherbaceo angulato flexuoso scabro, foliis pinnatifidis, racemis cymosis.

*LINN. Sp. pl. tom. 1. pag. 511.*

*SOLANUM* foliis quernis. *Few. Per. Obs. p. 722. pl. 15.*

*HABITAT* in *Peruviae* et *Regni Chilensis* versuris, ad *Tarmae* oppidum, et in *Colchagua* Provincia versus *Rio claro*.

*FLORET* Aprili, et Majo.

*SOLANUM RUNCINATUM*.

30. S. caule herbaceo anguloso, foliis laciniato-pinnatifidis, corymbis terminalibus dichotomis.

PLANTA herbacea, succosa, fragilis, hispidiuscula, tripedalis.

CAULIS procumbens, angulosus, ramosus; angulis è petiolorum basi utrinque decurrentibus.

RAMI consimiles.

FOLIA subruncinata, laciniato-pinnatifida; *laciniis* sursum deorsumque curvatis, supra nitidiuscula, utrinque scabriuscula, alterna, patentia, per petiolum decurrentia.

FLORES terminales, in corymbum dichotomum.



COROLLA violacea, calyce triplò major, revoluta.

ANTHERAE flavae.

BACCA globosa, parva, lutea.

HABITAT in *Peruviae* et *Chilensis Regni* ruderatis et versuris.

FLORET in *Chile* Augusto, et Septembri; in *Peruvia* per totum ferè annum.

*SOLANUM PINNATIFIDUM*. ICON. CLXX. Fig. b.

31. S. caule herbaceo alato, foliis decurrentibus pinnatifidis, floribus paniculatis.

PLANTA herbacea, subpedalis, succosa.

RADIX fusiformis, fibrillosa.

CAULIS erectus, teres, alatus, ramosus, fragilis, pilosus; pilis raris.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, decurrentia, pinnatifida; laciniis profundè dentatis.

PEDUNCULI longi, teretes, paniculati.

FLORES pedicellati, cernui, secundi.

CALYX quinquepartitus; laciniis linearibus.

COROLLA dilutè caerulea, aliquando purpurascens, calyce quadruplò major.

BACCA dependens, pisi magnitudine, lutea.

HABITAT in *Peruviae* arenosis ad *Limae* et *Chancay* Provincias, copiosè in *Torreblanca* et *Jequan* collibus.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Flos integer. 3 Baccae dimidia pars inferior loculamenta ostendens. 4 Semina.

*SOLANUM MULTIFIDUM*. ICON. CLXXI. Fig. a.

32. S. caule herbaceo, foliis multifidis, pedunculis dichotomo-paniculatis.

PLANTA herbacea, hirsuta, pedalis.

CAULIS erectus, infernè divisus, teres.

FOLIA alterna, per petiolum decurrentia, semiamplexicaulia, multifida.

PEDUNCULI terminales lateralesque, longissimi, dichotomo-paniculati, multiflori, infra medium foliolo unico, lanceolato, trifido aut integro.

CALYX quinquepartitus: laciniis linearibus, obtusis.

COROLLA obscurè caerulea.

BACCA dependens, calyce quadruplò major.

Obs. *Solano pinnatifido* maximè affine.

HABITAT in *Peruviae* collibus ad *Pongo* Provinciae *Cama-nae* vicum.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flos integer postice visus. 2 Idem antice conspectus. 3 Pistillum cum calyce.

*SOLANUM LYCOPERSICUM*.

33. S. caule inermi herbaceo, foliis pinnatis incisis, racemis simplicibus. LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag. 513.*

COLIVUR in *Peruviae* hortis.

FLORET toto anno.

Tom. II.

VERNACULE *Tomate*.

Obs. 1. In ruderatis maritimis abundat S. *Lycopersici* Varietas illa, quam C. *Bauhinus* *Solanum racemosum* cerasorum formà nuncupat. PINAX. pag. 167. Prodr. 90.

Obs. 2. Haec Varietas, quae ab Incolis *Tomate redondo* appellatur, *Planta* est herbacea, hirsuta; *Caule* procumbente, tereti; *Foliis* impari abruptè pinnatis; *Foliolis majoribus* ovatis, acutis, serrato-incisis; *minoribus* minimis, orbiculatis; *Racemis* caulinis, longis, bipartitis; *lobo altero* plerumque bifido; *Floribus* secundis, longè pedicellatis; *Pedicellis* longis, filiformibus, bracteolis subrotundis suffultis; *Corollâ* luteâ; *Baccâ* rubrâ.

*SOLANUM PERUVIANUM*.

34. S. caule herbaceo, foliis interruptè pinnatis, impari majori; minoribus sessilibus, racemis bipartitis dichotomis foliosis.

*SOLANUM (peruvianum)* caule inermi herbaceo, foliis pinnatis incisis tomentosis, racemis bipartitis foliosis, bacis subpilosis. LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag. 514.*

*LYCOPERSICON* Pimpinellae sanguisorbae folio. FEWILL.

Per. Obs. tom. 3. pag. 37. pl. 25.

PLANTA herbacea, pubescens, incana, prostrata, tripedalis.

RADIX ramosa, fibrillosa.

CAULIS teres, ramosus.

RAMI consimiles, graciles.

FOLIA alterna, interruptè pinnata, impari majori, leviter tomentosa: *foliola* heterophylla, obtusa aut acuta: *majora* petiolata, crenata, aut incisa; *minora* subrotunda, sessilia, aut breviter petiolata.

PEDUNCULI laterales terminalesque, dichotomi.

FLORES laxè racemosi, secundi, longè pedicellati.

PEDICELLI tenues, in flore erecti, bracteolâ subreniformi stipati.

CALYCES quinquepartiti: laciniis linearibus, acutis.

COROLLA lutea, quinquefida: laciniis acutis, reflexis.

BACCA globosa, rubra, nutans, ciceris magnitudine.

HABITAT in *Peruviae* aridis locis, versuris et ruderatis copiosè ad *Limae* et *Chancay* Provincias.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

VULGO: *Tomate Cimarron*, id est, *Pomum aureum silvestre*.

*SOLANUM DIFFUSUM*. ICON. CLXXI. Fig. b.

35. S. caule suffruticoso, ramis virgatis diffusis, foliis impari-pinnatis, foliolis oblongis, pedunculis axillaribus 2-5 floris.

PLANTA suffruticosa (*Jasmini* facie.)

CAULIS ramosus, diffusus, angulatus.

RAMI longissimi, consimiles: *teneri* pubescentes.

FOLIA alterna, secunda, impari-pinnata: *foliola* oblonga, integerrima, acuminata, *extima* majora.

PETIOLI pubescentes.

PEDUNCULI axillares, bini ternique, bi-quinqueflori, inaequales, pubescentes, foliis breviores.



FLORES pedicellati.

CALYX parvus, quinquecrenatus.

COROLLA calyce quadruplò longior, violacea, patens, quinquefida.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Huanuci* Provinciam.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

*SOLANUM TERNATUM*. ICON. CLXXII. Fig. a.

36. S. caule suffruticoso tetragono scandenti radicante, foliis ternatis, pedunculis axillaribus.

PLANTA suffruticosa, glabra.

CAULIS scandens, radicans, obtusè tetragonus.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, longè petiolata, ternata: *foliola* oblongo-lanceolata, integerrima; *lateralibus* obliquis; *intermedio* majori, acuminato.

PEDUNCULI plures, axillares, pauciflori.

FLORES subumbellati, pedicellis subaequalibus.

CALYX parvus, quinquecrenatus.

COROLLA purpureo-violacea, calyce quadruplò major, profunde quinquefida.

BACCA ovato-conica, albicans, ciceris magnitudine.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus humidis versus *Cuchero*.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum.

*SOLANUM CONICUM*. ICON. CLXXII. Fig. b.

37. S. caule herbaceo, foliis impari-pinnatis, foliolis oblongo-lanceolatis, pedunculis axillaribus subternis spicatis, fructu conico.

PLANTA herbacea, bipedalis, annua.

CAULIS erectus; infernè divisus, teres; supernè pilosus, angulatus.

FOLIA alterna, petiolata, impari-pinnata: *foliola* breviter petiolata, oblongo-lanceolata, integerrima, carinata, supra pilosa, nonnulla basi inaequalia; *extima* gradatim majora.

PEDUNCULI axillares, solitarii, bini, saepè terni, erecti, longitudine ferè petiolorum, filiformes, apice recurvati, glabri.

FLORES spicati, secundi, duplici serie alternantes, pedicellati, parvi.

PEDICELLI supernè incrassati.

CALYX quinquepartitus, acutus.

COROLLA albo-caerulea, calyce duplò major.

BACCA conica, alba, drupae oleae magnitudine.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Chinchao* et *Cuchero* tractus.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Bacca transversim secta, loculamenta ostendens. 6 Semina.

*SOLANUM MITE*. ICON. CLXXIII. Fig. a.

38. S. caule herbaceo radicante, foliis impari-pinnatis; foliolis oblongis, racemis axillaribus aggregatis, baccis globosis.

PLANTA herbacea, bipedalis, glabra, mitis, annua.

RADIX fibrosa, albo-lutescens.

CAULIS erectus, simplex, rariùs infernè divisus, radicans, nitidus, flexuosus, obtusè angulatus.

FOLIA alterna, impari-pinnata, petiolata: *foliola* breviter petiolata, oblonga, acuta, integerrima, mitissima, supra nitida, basi obliqua, inaequalia.

PEDUNCULI plures, axillares, petiolis triplò breviores, graciles, pauciflori.

FLORES nutantes, minimi, secundi, pedicellati, duplici serie alternantes.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* subrotundis.

COROLLA alba.

BACCA alba, globosa, magnitudine pisi.

HABITAT in *Panatahuarum* Provinciae nemoribus, ad *Pozuzo* et *Chinchao* vicos in locis humidis, et umbrosis.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum.

*SOLANUM TUBEROSUM*.

39. S. caule inermi herbaceo, foliis interruptè pinnatis, foliolis ovatis, pedunculis subcorymbosis.

*SOLANUM (tuberosum)* caule inermi herbaceo, foliis pinnatis integerrimis, pedunculis subdivisis. LINN. *Sp. pl.* t. 1. p. 513.

PLANTA herbacea, tripedalis, biennis.

HABITAT in *Peruviae* et *Chilensis Regni* cultis, et in collibus *Chancay*, ad *Jequan* et *Pasamayo* praedia.

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE *Papas* Peruviani nuncupant. In Hispania *Patatatas Manchegas*.

Obs. Color florum et radicum maximè variat.

USUS: Culinaris. Vide PARMENTIER *Exam. Chim. des Pommes de terre* pag. 192.

*SOLANUM VIRIDIFLORUM*. ICON. CLXXIII. Fig. b.

40. S. caule fruticoso, foliis cordato-ovatis simplicibus, racemis dependentibus.

PLANTA fruticosa, orgyalis, villosa, mitis.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, petiolata, simplicia, cordato-ovata, acuta, subrepanda, integerrima.

PETIOLI teretes, breves.

PEDUNCULI axillares rameique, racemosi, longitudine ferè foliorum, dependentes.

FLORES pedicellati, alterni.

CALYX semiquinquefidus: *laciniis* acutis, erectis.



COROLLA viridis, profundè quinquefida: *laciniis* ovato-lanceolatis, reflexis.

BACCA oblongo-obovata, villosa, lutescens.

SEMINA lentiformia, lutea.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus, ad *Sancti Antonii de Playa grande* vicum.

FLORET Julio, et Augusto.

Obs. Affine *Solano pendulo*.

Explic. Icon. 1 Corolla scissa cum staminibus. 2 Stamina. 3 Pistillum. 4 Baccae dimidia pars semina ostendens.

*SOLANUM PENDULUM*. ICON. CLXXIV. Fig. a.

41. S. caule fruticoso, foliis pinnatis, foliolis 2-6nis oblique cordatis, racemis dependentibus furcatis.

PLANTA frutescens, biorgyalis.

CAULIS erectus, medullosus, in summitate ramosus.

RAMI patentes, dichotomi, hirsuti.

FOLIA alterna, remota, rarius gemina, pinnata, aliquando simplicia: *foliola* 2-6na, oblique cordata ovataque, acutissima, impari majori, utrinque pubescentia, integerrima, venosissima.

PEDUNCULI ex dichotomiis, solitarii, semipedales, furcati, dependentes, laxè racemosi.

FLORES alterni, pedicellati.

CALYX quinquecrenatus; crenaturis brevi acumine.

COROLLA obscurè purpurea, leviter pubescens, profundè quinquefida: *laciniis* lanceolatis, acutis, apice reflexis, calyce quadruplò major.

BACCA magna, ovata, pyri mediocris magnitudine, lutea.

Obs. Flores quatuor ut plurimum ad maturitatem perveniunt: reliqui praematurè decidunt.

HABITAT in *Panatahuarum* Provinciae nemoribus, praesertim in *Muña* umbrosis locis.

FLORET à Majo ad Augustum.

VERNACULE *Monte Papaya*.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Baccae dimidia pars inferior loculamenta ostendens.

*SOLANUM HAVANENSE*.

42. S. caule inermi frutescente, foliis lanceolatis nitidis integerrimis, pedunculis subbifloris. LINN. *Sp. pl. p. 512*.

HABITAT in *Peruviae* umbrosis locis ad *Acobamba* et *Picoy* Provinciae *Tarmae* vicos.

FLORET Julio, et Augusto.

Obs. Folia aliquando gemina. Pedunculi solitarii, 2-3nique. Reliqua, ut in JACQUIN. *amer. pag. 49. tab. 35*.

*SOLANUM FOETIDUM*.

43. S. caule inermi fruticoso, foliis ovatis dependentibus, umbellis oppositifoliis nutantibus, fructu aureo.

PLANTA frutescens, sexpedalis, foetidissima, glabra.

CAULIS erectus, inermis, ramosus, teres, nitidiusculus.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, deflexa, petiolata, ovata, integerrima, subtus venosa.

PEDUNCULI oppositifolii, multiflori.

FLORES nutantes, umbellati.

COROLLA albo-caerulea, patentiuscula.

ANTHERAE declinatae.

BACCA aurea, parvae nucis juglandis magnitudine.

SEMINA lutea.

HABITAT in *Tarmae* oppidi versuris et ruderatis.

FLORET Julio, et Augusto.

*SOLANUM ASPEROLANATUM*. IC. CLXXIV. Fig. b.

44. S. caule aculeato arboreo, foliis oblongis solitariis gemisque angulatis integerrimis, corymbis rameis subdichotomis.

FRUTEX quinqueorgyalis, aspero-lanatus: *lanugo* lucida, in stellae formam digesta.

CAULIS erectus, simplex, supernè ramosissimus, vix aculeatus.

RAMI *anotini inferiores* glabri, aculeati: *superiores* inermes, lanuginosi, ferruginei.

FOLIA petiolata, lucida: *ramulorum inferiorum juniorum* alterna, oblongo-lanceolata, acuta, angulosa, utrinque lanata: *superiora* alterna geminaque, oblonga, acuminata, basi inaequalia, integerrima, subtus lanuginosa, supra aspero-hispida.

PEDUNCULI ramei, subdichotomi, corymbosi, multiflori.

FLORES pedicellati, duplici serie alternantes.

CALYCES quinquefidi: *laciniis* ovatis, acutis, lanuginosi.

COROLLA alba, extus lanata, calyce duplò major: *laciniis* acutis.

BACCA lutea, nucis avellanae magnitudine.

SEMINA lutescentia.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis, ad *Huassahuassi* arcem.

FLORET Januario, et Februario.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Flos integer. 3 Stamina. 4 Pistillum.

*SOLANUM SCABRUM*. ICON. CLXXV. Fig. a.

45. S. caule aculeato fruticoso, foliis sinuato-angulatis acutis scabris, corymbis dichotomis, floribus intus secundis.

FRUTEX biorgyalis, corymbiformis.

CAULIS erectus, ramosus, leviter angulosus, aculeatus, laevis.

RAMI consimiles.

ACULEI pauci, remoti, minimi, recti, rigidi, fulvescentes, per caulem, ramos, petiolos et foliorum dorsum dispersi.

FOLIA alterna, solitaria, aliquando gemina, petiolata, ovato-oblonga, sinuato-angulata, basi inaequalia, subtus valde venosa, utrinque setis minimis in stellarum formam digestis scabra; angulis acutis.

PETIOLI bipollicares, supra sulcati.

PEDUNCULI ramei, foliis alternantes.

CORYMBI magni, dichotomi.

FLORES secundi, intus spectantes, pedicellati.



PEDICELLI erecti, supernè incrassati, angulosi.

CALYX profunde quinquefidus, acutus.

COROLLA caeruleo-violacea, calyce triplò major: *laciniis* acutis.

BACCA globosa, aurantii coloris, ciceris magnitudine.

HABITAT in *Peruviae* versuris et ruderatis, affatim ad *Muñia* et *Chinchao* tractus.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

VERNACULE *Casiamuru*.

USUS: Baccae loco saponis ad crines et vestimenta abluenda inserviunt.

Explic. Icon. 1 Stamen. 2 Bacca transversim secta. 3 Semina. 4 Villi in stellae formam aucti.

*SOLANUM INCANUM*. ICON. CLXXV. Fig. b.

46. S. caule arboreo aculeato, foliis junioribus 7-9 lobatis; adultis sinuatis, racemis 2-3nis subcorymbosis, floribus secundis.

ARBOR quadriorgyalis et ultra.

CAULIS erectus, crassus, supernè ramosus, teres, aculeatus.

RAMI seniores teretes, inermes; juniores aculeati, glauci, angulati.

ACULEI dispersi, horizontales, erecti recurvique.

FOLIA inermia, alterna, solitaria geminaeque, altero minore, petiolata, ovato-oblonga, nonnulla oblongo-lanceolata, integerrima, sinuata lobataeque, basi inaequalia, supra glabra, nitida, subtus tomentosa, alba, mitissima.

PETIOLI ferè bipollicares, teretes.

RACEMI laterales, suboppositifolii, gemini, terni, quaterni, bifidi, subcorymbosi, tomentosi.

FLORES secundi, 14-20, plures caduci.

CALYX parvus, quinquecrenatus.

COROLLA alba, calyce quadruplò major, patens.

BACCA globosa, parva, lutea, tandem nigra.

SEMINA fulvescentia.

HABITAT in *Peruviae* praeruptis ad torrentium margines *Huanuci*, *Acomayo*, *Chulquillo* et *Camcham*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

VERNACULE *Yurahuacta* et *Yurahuassa*, id est, *Enves blanco* et *Espina blanca*.

USUS: Folia ad ulcera cancrorsa suppuranda, detergenda et cicatricanda valent.

Explic. Icon. 1 Stamen. 2 Bacca per medium secta. 3 Semina.

*SOLANUM INCARCERATUM*. ICON. CLXXVI. Fig. a.

47. S. caule aculeato suffruticoso, foliis geminis cordatis aculeatis, floribus secundis, baccis glabris cancellatis.

PLANTA suffruticosa, densè hirsuta, biulnaris.

CAULIS erectus, ramosus, teres, aculeatus.

RAMI subangulati, patuli, aculeati.

ACULEI rigidi, recti, inaequales.

FOLIA gemina, petiolata, cordata, 5-11 angulata; altero altiori, ferè triplò breviori.

PEDUNCULI ramei, breves, racemosi, incurvati, inermes.

FLORES secundi, duplici ordine alternantes.

CALYX inermis, in flore reflexus, in fructu erectus, baccae longitudine, quinquepartitus: *laciniis* subulatis.

COROLLA albo-violacea.

BACCA intra calycis lacinias incarcerata, alba, oblonga, venosa, glaberrima, cerasi magnitudine.

SEMINA lutescentia.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus, ad *Chinchao* runcationes.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Stamen. 2 Baccae dimidia pars inferior loculos ostendens. 3 Semina.

*SOLANUM STELLATUM*. ICON. CLXXVI. Fig. b.

48. S. caule aculeato fruticoso hispidissimo, setis apice stellatis, foliis lobatis, corymbis magnis dichotomis.

FRUTEX biorgyalis, hispidissimus. *Setae* apice pilis in stellae formam.

CAULIS erectus, teres, aculeatus, supernè ramosissimus.

RAMI in corymbi formam, patentes, subteretes, aculeati.

ACULEI recti, obscurè purpurei.

FOLIA alterna, petiolata; *superiora* nonnulla ovata, integerrima, acuta; *pauca* subrepanda; *reliqua* cordata, basi inaequalia, 7-11 lobata, subspithamaea, subtus valde hirsuta, supra aspera setis minimis, in stellarum formam dispositis, venosissima, rugosiuscula, aculeis nonnullis respersa: *lobis* ovatis, acutis, integerrimis.

PEDUNCULI ramei terminalesque, inermes, corymbosi.

CORYMBI magni, dichotomi.

FLORES secundi, duplici ordine alternantes; *plurimi* caduci.

CALYX lanuginosus, quinquefidus, acutus.

COROLLA alba, extus lanuginosa, profundè quinquefida, calyce triplò longior.

ANTHERAE violaceae, longae.

BACCA globosa, lutescens.

HABITAT in *Peruviae* ruderatis, ad *Pillao* et *Panao* vicos.

FLORET à Majo ad Septembrem.

VERNACULE *Campucasa* et in *Panao* *Huircacasa*.

Explic. Icon. 1 Stamen. 2 Baccae pars dimidia loculos ostendens. 3 Semina.

*SOLANUM LACINIATUM*. ICON. CLXXVII. Fig. a.

49. S. caule aculeato fruticoso scandenti, foliis geminis laciniatis; altero lanceolato integerrimo, racemis filiformibus longissimis.

PLANTA frutescens, bi-triorgyalis, glabra.

CAULIS scandens, subangulatus, ramosus, aculeatus.

RAMI diffusi, angulosi, aculeati.

ACULEI parvi, recurvi, lutescentes.

FOLIA gemina, subsessilia, dorso aculeata; *majora* oblonga, laciniato-lobata: *laciniis* sublaceolatis, acutis, horizontalibus; *alterum* quadruplò minus, ovato-lanceolatum, integerrimum.

PETIOLI brevissimi, decurrentes.

PEDUNCULI laterales, solitarii, aculeati, filiformes, simpli-



ces, folio majori plerumque breviores, aliquando longiores, in fructu dependentes.

FLORES racemoso-spicati, secundi, duplici ordine alternantes, breviter pedicellati.

CALYX parvus, quinquecrenatus.

COROLLA profunde quinquefida; laciniis acutis, patulis, calyce triplo major, caerulea.

BACCA globoso-obovata, magnitudine parvi pyri, aurea.

SEMINA lutea.

HABITAT in nemoribus *Chinchao* et *Cuchero*.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

VERNACULE *Rocotito de Monte*.

USUS: Incolae fructus maturos incoctos comedunt.

*SOLANUM TOMENTOSUM.*

50. S. caule aculeato fruticoso, aculeis acerosis, foliis cordatis inermibus subrepandis: tenellis purpureo-pulverulentis. LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag. 519.*

HABITAT in praeruptis et umbrosis *Tarmae*.

FLORET Majo, et Junio.

VERNACULE *Hormis* appellatur.

*SOLANUM LYCIOIDES.* ICON. CLXXVII. Fig. b.

51. S. caule spinoso fruticoso, foliis oblongis obovatis ovatisque, ramis in spinam desinentibus, pedunculis aggregatis unifloris.

*SOLANUM (lycioides)* caule spinoso fruticoso, foliis ellipticis. LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag. 521.*

FRUTEX orgyalis, spinosus.

CAULIS ramosissimus, expansus, teres, cortice rimoso, cinereo, suberoso.

RAMI subangulati, deflexi.

SPINAE longae, foliosae, floriferae, vix pungentes.

FOLIA alterna, solitaria, aut 4-6-plurave ex eodem puncto, inaequalia, breviter petiolata, integerrima, oblonga, obovata ovataque, supra pubescentia, parum scabra, subtus tomentosa, albicantia: Villis brevibus, lente visis, in stellae formam digestis.

PEDUNCULI axillares, ramei aut ex gemmis, bini, seni, breves, uniflori, tenues, filiformes, infernè attenuati, recurvati.

CALYX campanulatus, pentagonus, quinquedentatus, aliquando decemdentatus: denticulis subulatis, semiteretibus, crassis, strictis; alternantibus brevioribus; inferus, in flore erectus, in fructu patentissimus.

COROLLA rotata, quinqueplicata, quinque emarginata, patentissima, albo-caerulea aut violaceo-caerulea, fundo lutescens; lineis tribus per singulas plicaturas decurrentibus.

FILAMENTA quinque, subulata: duo inferiora breviora, arcuata; tria superiora longiora, quorum duo lateralia arcuata, intermedio recto, paulò breviori. Antherae incarnato-croceae, apice biperforatae.

GERMEN subrotundum. Stylus filiformis, curvatus, superne incrassatus. Stigma emarginatum.

Tom. II.

BACCA globosa, rubro-crocea, bilocularis, pisi magnitudine. SEMINA pauca, ut plurimum octo, anguloso-reniformia, ossea. Nucleus reniformis.

HABITAT in *Peruviae* locis argillosis et petrosis, passim ad *Huanuci* et *Tarmae* Provincias. Colitur in Hort. Reg. Matrit. ubi laetè vegetat è seminibus à nobis missis.

FLORET ferè toto anno, praesertim Octobri, et Novembri.

VERNACULE *Amacasa*, id est, *Spinus non pungens*.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Eadem absque staminibus. 4 Stamina. 5 Pistillum.

PHYSALIS. LINN. *Gen. pl. pag. 134.*

*PHYSALIS PROSTRATA.*

1. P. caule tereti villosa, foliis ovatis obtusis angulatis basi inaequalibus, pedunculis axillaribus unifloris.

*PHYSALIS (prostrata)* ramosissima, caule procumbente tereti hirsuto, foliis subcarnosis. L'HERIT. *Stirp. nov. fasc. 3. pag. 43. Icon. 22.*

PLANTA herbacea, villosa, carnosa, annua.

RADIX ramosiuscula, fibrillosa, tenuis.

CAULIS prostratus, ramosus, teres, fragilis.

RAMI consimiles.

FOLIA alterna, superiora aliqua gemina, altero minori, petiolata, ovata, obtusa, angulata, subrepanda, venosa, nonnulla basi inaequalia.

PETIOLI canaliculati, foliorum ferè longitudine.

PEDUNCULI axillares, solitarii, teretes, uniflori, petiolis breviores, erecti, in fructu cernui.

CALYX parvus, inflatus, decagonus, semiquinquefidus, crescens: laciniis acutis, parum reflexis.

COROLLA campanulata, plicata, caerulea, lineis obscurè purpureis maculata, fragrans.

BACCA viridi lutea, intra calycem clausa, globosa, ciceris magnitudine.

SEMINA parva, fulvescentia.

HABITAT in *Peruviae* arenosis ad *Limae* et *Chancay* Provincias, passim ad *Torreblanca*, *Jequan*, *Retes*, *Esquibel* et *Pasamayo* praedia et in *Huaura* collibus.

FLORET Junio, et Julio.

Vulgo: *Campanillas olorosas*.

*PHYSALIS PUBESCENS.*

2. P. caule angulato, foliis cordatis dentato-angulatis, floribus fructibusque pendulis.

*PHYSALIS (pubescens)* ramosissima, foliis villosis viscosis, floribus pendulis. LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag. 509.*

*ALKEKengi* virginianum, fructu luteo. FEWILL. *Per. Obs. tom. 3. pag. 5. pl. 1.*

PLANTA tripedalis, pubescens, viscosa, biennis.

CAULIS erectus, ramosissimus, angulatus, nodosus, striatus.

RAMI consimiles, subdichotomi.

FOLIA alterna, solitaria geminaque; altero minori, petiolata, cordata, acuta, dentato-angulosa, undulata, venosissima.



PETIOLI foliis triplò breviores.

PEDUNCULI axillares et ex divisionibus ramorum, solitarii, recurvati, uniflori, breves.

CALYX semiquinquefidus, acutus, crescens, longitudine tubi corollae.

COROLLA lutea, in centro maculis quinque obscure purpureis notata. *Tubus* intus lanatus. *Limbus* patens.

BACCA globosa, magna, lutea, nutans, intra calycem magnum, inflatum, venoso-reticulatum, membranaceum, angulatum.

SEMINA parva, lutescentia.

HABITAT in *Peruviani* et *Chilensis Regni* cultis et versuris.

FLORET toto anno.

VERNACULE *Capulí* et *Fructus Capulies* nuncupantur.

USUS: Fructus edules, acido-dulces, odorati. Feminae in compositione florum (*Mixtura dicta*) eos adhibent, et crines, odoris gratiâ, ipsis ornant.

#### PHYSALIS ANGULATA.

3. P. caule angulato, foliis oblongo-lanceolatis dentatis integerrimis, floribus fructibusque dependentibus.

PHYSALIS (*angulata*) ramosissima, ramis angulatis glabris, foliis ovatis dentatis. LINN. *Sp. pl. tom. I. p. 509.*

PLANTA herbacea, bipedalis, glabra, annua.

CAULIS erectus, ramosissimus, quinqueangularis.

RAMI anguloso-striati, patuli.

FOLIA gemina, altero minori, solitariaque, petiolata, oblongo-lanceolata, dentata integerrimaque, venosa: denticulis incurvatis.

PETIOLI foliis triplò breviores.

PEDUNCULI axillares, solitarii, uniflori, erecti, longitudine ferè petiolorum, filiformes, tenues.

CALYX quinqueangulatus, semiquinquefidus; *laciniis* acutis, erectis.

COROLLA lutea caeruleaque, calyce duplò major, in medio maculata; *limbo* quinquefido, acuto.

ANTHERAE caeruleae.

BACCA globosa, luteo-virescens, cernua, intra calycem clausum, inflatum, angulatum, membranaceum, venoso-reticulatum.

HABITAT in *Peruviae* segetibus et ruderalis, passim in *Limae* et *Chancay* Provinciis.

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE *Capulí Cimarron*, id est, *Falso Capulí*.

VIRES: Diureticâ vi pollet.

#### PHYSALIS SUBTRIFLORA. ICON. CLXXVIII. Fig. a.

4. P. caule angulato, foliis ovatis acutis integerrimis villosis, pedunculis 2-3nis unifloris, fructibus cernuis.

PLANTA herbacea, bipedalis, villosa, annua.

CAULIS erectus, angulatus, ramosus.

RAMI patentes, subdichotomi.

FOLIA alterna, ex divisionibus ramorum, solitaria geminaque, ovata, acuta, integerrima, venosa; nonnulla basi inaequalia.

PEDUNCULI axillares et ex divisionibus ramulorum, bini, ternique, uniflori, breves, filiformes, graciles, erectiusculi.

CALYX quinquedentatus, angulatus, tenuis, corollâ triplò brevior.

COROLLA lutea, semiquinquefida, acuta, venosa, patentiuscula.

BACCA nutans, globosa, pisi magnitudine, lutescens, intra calycem suburceolatum, membranaceum, tenue.

SEMINA parva, lutescentia.

HABITAT in praeruptis *Cantae* Provinciae versus *Obragillo* et *S. Bonaventurae* vicis.

FLORET Martio, et Aprili.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Eadem cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Baccae dimidia pars loculos ostendens. 6 Semen.

#### SARACHA. Gen. pl. Flor. Per. et Chil. p. 31. ICON. XXXIV.

##### SARACHA PUNCTATA. ICON. CLXXVIII. Fig. b.

1. S. foliis ovato-oblongis solitariis, corollis punctatis.

PLANTA suffruticosa, bi-tripedalis.

CAULIS ramosus, teres, fuscus.

RAMI consimiles: *teneri* angulosi, pulverulenti.

FOLIA alternatim sparsa, petiolata, ovato-oblonga, integerrima, venosissima, pulverulenta, supra glabra.

PEDUNCULI ex apicibus ramulorum vel gemmarum, aggregati, uniflori, ad basim attenuati, corollâ paulò longiores.

FLORES nutantes.

CALYX glaber: *lacinae* ovato-subrotundae, obtusae.

COROLLA maxima, campanulata, tandem patens, laciniis reflexis, luteo-purpurascens, punctis purpureis maculata, extus pulverulenta.

STAMINA anulo tubi corollae inserta, erecta.

HABITAT in alpibus *Muña* et *Panao* ad *Tambo nuevo* et *Portachuelo*, et in *Canta* prope *Obragillo* vicum.

FLORET Augusto et Septembri in *Muña* et *Panao*, mensibus Martio et Aprili in *Canta*.

VIRES ET USUS: Folia contusa anodynâ, depuratoriâ et emollienti virtute pollent.

Obs. Sapor foliorum amarissimus.

Explic. Icon. 1 Calyx cum pistillo. 2 Stamina.

##### SARACHA BIFLORA. ICON. CLXXIX. Fig. a.

2. S. foliis ovatis subgeminis, pedunculis bifloris.

PLANTA bipedalis, pubescens, perennis.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI angulati.

FOLIA alterna geminaque, ovata, acuta, integerrima, venosa.

PEDUNCULI laterales, solitarii, biflori, rarissime triflori.

FLORES cernui.

COROLLA campanulata, tandem patens, laciniis acutis, ve-



nosa, luteo-viridis.

STAMINA corollâ duplò longiora, erecta.

BACCA alba, subrotunda, depressiuscula, pisi magnitudine.

HABITAT in *Peruvia* ad *Huassahuassi* vicum inter segetes, et sepes. Colitur in Hort. Reg. Matrit. è seminibus à nobis missis.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERNACULE *Tomatillo Cimarron*, id est, *Pomum aureum* parvum silvestre.

VIRE ET USUS: Folia contusa et axungiae suillae mixta emollienti et anodynâ vi pollent.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Corolla cum staminibus. 3 Pistillum. 4 Bacca. 5 Eadem per medium secta. 6 Semina.

SARACHA CONTORTA. ICON. CLXXX. Fig. a.

3. S. foliis ovatis angulato-dentatis integrisque, pedunculis multifloris umbellatis.

PLANTA herbacea, ulnaris, annua.

RADIX fibrosissima, albidiuscula.

CAULIS erectus, pentagonus, quinesulcatus, cavus, ramosus, glaber, infernè livido-violaceus.

RAMI consimiles, alterni dichotomique, pubescentes.

FOLIA alterna, petiolata, ovata; *inferiora* solitaria, angulato-dentata; *superiora* gemina, altero minori, basi inaequalia, integerrima, obliqua, acuta, utrinque pubescentia per petiolum decurrentia.

PETIOLI semiteretes, foliis triplò breviores.

PEDUNCULI ex dichotomiis et ex axillis superioribus, solitarii, contorti, sulcati, 6-10 flori, declinati.

FLORES umbellati, nutantes, pedicellati.

PEDICELLI uniflori, sulcati, contorti.

COROLLA albo-lutescens, campanulata, tandem patentissima; laciniis acutis.

STAMINA basi hirsuta.

BACCA globosa, nigra, pisi magnitudine.

HABITAT in praeruptis *Cantae* ad *Obragillo* vicum. Colitur in Hort. Reg. Matrit. è seminibus à nobis missis.

FLORET per totum ferè annum.

VIRE: Folia emollientia et anodyna sunt.

Explic. Icon. 1 Calyx anticè visus. 2 Idem posticè aspectus. 3 Flos integer. 4 Pistillum. 5 Bacca. 6 Eadem per medium secta. 7 Semina.

SARACHA PROCUMBENS. ICON. CLXXX. Fig. b.

4. S. foliis geminis ovatis integerrimis, pedunculis subquadrifloris umbellatis.

ATROPA (*procumbens*) caule herbaceo procumbente: foliis geminis inaequalibus ovatis glabris, floribus umbellatis. CAVAN. Icon. vol. 1. pag. 53. n. 80. tab. 72.

PLANTA herbacea, tripedalis.

CAULIS procumbens, ramosissimus, dichotomus, cavus, angulosus, sulcatus, pubescens.

RAMI consimiles.

FOLIA gemina, altero breviori, aliquando solitaria, ovata,

per petiolum decurrentia, patentia, parum undulata, venosissima: *tenuiora* supra nitida, dorso et margine villosa.

PEDUNCULI interfoliacei, solitarii, bi-tri-quadriflori, villosi, in flore patentes, in fructu nutantes, contorti.

CALYCES villosi, in flore et fructu expansi, ante et post florescentiam pentagoni.

COROLLA albo-lutescens, primum ovata, plicata, deinde campanulata, patentiuscula, tandem patentissima, rotata, in centro viridiuscula, margine pubescens.

STAMINA basi tubi inserta, erecta, aequalia.

BACCA glabra, nitida, venosa, ciceris magnitudine.

SEMINA lentiformia, basi vix emarginata.

HABITAT in *Cantae* Provincia ad *S. Bonaventurae* vicum.

Colitur in Reg. Hort. Matrit. è seminibus à nobis missis.

FLORET Januario, et Febuario.

VIRE: Folia anodyna et depuratoriam virtutem habent.

Explic. Icon. 1 Calyx anticè visus. 2 Idem posticè. 3 Corolla cum staminibus. 4 Bacca per medium secta semina ostendens. 5 Semina.

SARACHA DENTATA. ICON. CLXXIX. Fig. b.

5. S. foliis geminis ovatis integris dentatisque, pedunculis subquadrifloris.

PLANTA herbacea, pubescens, procumbens, annua.

RADIX fusiformis, fibrosa, albida.

CAULIS è radice ramosissimus.

RAMI procumbentes, semipedales, dichotomi, angulosi, tenues.

FOLIA gemina, altero breviori, breviter petiolata, ovata, oblonga lanceolataque, integerrima, aut dentata.

PEDUNCULI ex dichotomiis interfoliaceique, solitarii, filiformes, tri-quadriflori, aliquando quinqueflori.

FLORES umbellati, cernui, breviter pedicellati.

COROLLA utrinque villosa, albo-violacea, pellucida, fundo punctis decem viridibus notata, campanulata, tandem patens, rotata, laciniis acutis.

BACCA crocei coloris, parvi pisi magnitudine.

SEMINA rugosiuscula.

HABITAT in versuris *Cantae* ad *Obragillo* vicum.

FLORET Januario, et Febuario.

VIRE: Folia cum axungia suilla cocta et in cataplasmatibus formam contusa ad tumores emolliendos et illorum dolores sedandos adhibentur.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus. 3 Stamina. 4 Pistillum. 5 Bacca cum calyce. 6 Eadem transversim secta. 7 Semina.

## CALYDERMOS.

### CHARACTER GENERICUS NATURALIS.

CAL. *Perianthium* ovatum, quinqueangulatum, quinquepartitum: angulis acutis, compressis: *laciniis* sagittatis, acuminatis, venosissimis: inferum, crescens, persistens. COR. campanulata. *Tubus* brevis. *Limbus* patentiusculus,



- quinqueplicatus, quinquelobus, obtusus.
- STAM. *Filamenta* quinque, subulata, basi dilatata, incurvata, ultra basim corollae inserta. *Antherae* erectae, conniventes, ovato-sagittatae, didymae, biloculares.
- PIST. *Germen* conico-ovatum, 3-5 gonum, insidens receptaculo elevato, brevi, cyathiformi. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* capitatum, 3-5 sulcatum, pentagonum.
- PER. *Bacca* globosa, exsucca, 3-5 locularis, tecta calyce membranaceo, subscarioso, venoso-reticulato, quinquepartito, pentagono; angulis magnis, compressis.
- SEM. numerosa, orbiculato-reniformia, compressa, inserta receptaculis oblongis, fungoso-carnosis, demum siccis.

## CHARACTER DIFFERENTIALIS.

- Corolla* campanulata. *Stamina* incurvata. *Bacca* exsucca, 3-5 locularis, intra calycem magnum, membranaceum, pentagonum, venoso-reticulatum.
- Obs. 1. Calydermon Genus hoc nuncupavimus ob calycis consistentiam membranaceam, baccam maturam includentis.
- Obs. 2. Quanquam hanc plantam Genus constituere à *Physalide* plane diversum cum Adansonio et Jussieo sentimus; *Nicandrae* tamen nomen, quod ei Jussieus indidit, non retinemus, utpote alii Plantae ab Aubletio *Potalia* et *Nicandra* ab Schrebero et Gmelino vocatae, antea accommodatum.
- Obs. 3. Calydermos à *Physalidis* Genere differt calyce; corollâ campanulatâ, quinquelobâ; et baccâ exsuccâ, 3-4-5-loculari.

## CALYDERMOS EROSUS.

1. C. caule pentagono, foliis ovatis eroso-angulatis, pedunculis unifloris erectis, fructibus cernuis.
- ATROPA* (*physalodes*) caule herbaceo, foliis sinuato-angulatis, calycibus clausis acutangulis. LINN. *Sp. pl. t. 1. p. 505.*
- ATROPA physalodes*. JACQ. *Obs. 4. p. 12. tab. 98.*
- ALKEKENGİ* amplo flore violaceo. FEW. *Per. Obs. tom. 2. p. 724. pl. 16.*
- NICANDRA*. ANT. LAUR. JUSS. *Gen. pl. p. 125.*
- PLANTA herbacea, quadripedalis, glabra, annua.
- RADIX ramosa, fibrosissima.
- CAULIS erectus, obtusè pentagonus, sulcatus, supernè ramosissimus, dichotomus.
- RAMI è singula dichotomia tres, rarius duo, consimiles.
- FOLIA alterna, solitaria, nonnulla gemina, ovata, eroso-angulata, valde venosa, per petiolum decurrentia.
- PETIOLI ad basim utrinque maculâ purpureo-violaceâ notati.
- PEDUNCULI ex dichotomiis et lateribus petiolorum, solitarii, uniflori, nudi, in flore erecti, in fructu cernui.
- CALYX in flore viridis, in fructu helvolus, maximus, venoso-reticulatus, membranaceus, subscariosus.
- COROLLA calyce duplò major. *Tubus* albus, intus caeruleus.

*Limbus* violaceus.

BACCA lutescens, parvae nucis moschatae magnitudine.

SEMINA fulva, parva, scabriuscula.

HABITAT in segetibus, ruderatis et versuris *Limae*, *Chan-cay* et *Huanuci*.

FLORET in toto anno.

VERNACULE *Capulí Cimarron*, et in Huanuco *Ccarapamacmam*, id est, *Jarrito*, sive *Orzita de pellejo*.

ATROPA. LINN. *Gen. pl. pag. 134.*

## ATROPA UMBELLATA. ICON. CLXXXI. Fig. a.

1. A. caule frutescente, foliis ovatis cordatisque integerrimis et angulatis, floribus umbellatis, corollis revolutis.
- PLANTA frutescens, quadripedalis.
- CAULIS erectus, ramosus, flexuosus, fragilis, glaber, teres, dichotomus.
- RAMI dichotomi, consimiles.
- FOLIA alterna, solitaria geminaque, petiolata, venosa, obsoletè pubescentia: *inferiora* ovato-cordata, angulata; *superiora* ovata, integerrima.
- PEDUNCULI axillares, solitarii, breves, multiflori, dependentes.
- FLORES 7-12 ni, pedicellati.
- PEDICELLI inaequales, graciles, vix pubescentes.
- CALYX levissime pubescens, profunde quinquefidus: *laciniis* acutis.
- COROLLA in fundo mellifera, calyce triplò major. *Tubus* cylindricus, obscure purpureus. *Limbus* patens, profunde quinquefidus, revolutus, luteus.
- STAMINA tubo corollae breviora.
- STYLUS longitudine corollae. *Stigma* capitatum.
- BACCA globosa, alba, pisi magnitudine.
- SEMINA lutescentia, parva.
- HABITAT in collibus et praeruptis *Chan-cay*, *Limae* et *Lurin*.
- FLORET Octobri, et Novembri.

## ATROPA BIFLORA. ICON. CLXXXI. Fig. b.

2. A. caule fruticoso, foliis ovatis acutis integerrimis, pedunculis bifloris, staminibus corollâ longioribus.
- PLANTA fruticosa, leviter pubescens, bipedalis.
- CAULIS erectus, ramosus, teres, infernè glaber.
- RAMI nutantes; *teneri* subangulati.
- FOLIA alterna, petiolata, ovata, acuta, integerrima, venosa: *inferiora* solitaria: *superiora* gemina; altero paulò majori.
- PEDUNCULI interfoliacei aut laterales, solitarii, bifidi, biflori, foliis breviores.
- FLORES cernui; altero praecotiori.
- CALYX quinquefidus, vix pentagonus: *laciniis* acutis, patulis.
- COROLLA calyce triplò longior, suburceolata, longitudinaliter striata, extus villosa. *Tubus* albo-viridis, aliquando purpurascens. *Limbus* luteo-viridis, quinquepartitus: *laciniis* erectis, acutis.



FILAMENTA corollâ longiora. *Antherae* ovatae, dilute caeruleae.

STIGMA bilobum, caeruleum.

BACCA subrotunda, depressiuscula, alba, pisi magnitudine, in calyce patenti.

SEMINA parva, lutescentia.

HABITAT in praeruptis et locis humidis *Tarmae*, *Cantae* et *Huaroheri* versus *Huassahuassi*, *Culluay* et *Div. Joannis de Matucana* vicos.

FLORET Novembri, et Decembri.

#### ATROPA BICOLOR.

3. A. caule fruticoso, foliis ovatis angulatis, pedunculis 3-4floris, corollâ rubro-viridi.

PLANTA fruticosa, orgyalis.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI consimiles: *teneri* angulati.

FOLIA alterna, petiolata, solitaria geminaeque, ovata, acuta, angulata, glabra.

PEDUNCULI axillares, teretes, tri-quadriflori.

COROLLA tubulosa, obscure rubra; limbo viridi.

HABITAT in umbrosis *Huaroheri* versus *S. Matthaei*, *Surco* et *S. Joannis de Matucana* vicos.

FLORET Martio, et Aprili.

#### ATROPA ASPERA.

4. A. caule herbaceo, foliis ovatis geminis; altero minori, floribus solitariis cernuis, corollis subdecemfidis.

PLANTA herbacea, hirsuta, aspera, ferè bipedalis.

CAULIS erectus, angulatus, dichotomus, purpurascens.

RAMI consimiles.

FOLIA gemina, petiolata, ovata oblongo-lanceolataque, integerrima, subrepanda: altero minori.

FLORES interfoliacei, et ex dichotomiis, solitarii, pedunculati, cernui.

COROLLA luteo-caerulea, in centro violacea, campanulata, patens, vix decemfida: *laciniis* quinque alternis acutis; *alteris* quinque emarginatis.

FILAMENTA hirsuta, violacea.

BACCA alba, pisi magnitudine.

SEMINA fulvescentia.

HABITAT in collibus *Limae* nominatis *Amancaes*.

FLORET Octobri, et Novembri.

#### LYCIUM. LINN. Gen. pl. pag. 136.

LYCIUM UMBELLATUM. ICON. CLXXXII. Fig. b.

1. L. inerme, foliis oblongo-lanceolatis, pedunculis rameis, floribus umbellatis, calycibus pentagonis.

PLANTA frutescens, triorgyalis.

CAULIS erectus, infernè ramosissimus, teres, granulis adspersus.

RAMI erecto-patuli, teretes, granulati: *teneri* sublanuginosi.

FOLIA alterna, breviter petiolata, oblongo-lanceolata, ferè bipalmaria, integerrima, patentia, supra glabra, subtus Tom. II.

vix pulverulenta: ex axillis *Gemma* diphylla; *foliolis* retroflexis, ovatis, inaequalibus.

PEDUNCULI ramei, breves, multiflori.

FLORES longè pedicellati, umbellati, pedicellis inaequalibus, supernè incrassatis.

CALYX quinqueangulatus, quinquefidus: *laciniis* acuminatis.

COROLLA violacea, calyce quadruplò longior. *Limbus* leviter plicatus, patens: *laciniis* acutis, vix reflexis.

FILAMENTA subulata, medio tubi inserta, glabra, deorsum decurrentia.

GERMEN obtusè pentagonum. *Stylus* staminibus brevior. *Stigma* vix emarginatum.

BACCA pisi magnitudine, aurantii coloris, unilocularis, polysperma.

SEMINA parva, lutescentia, reniformia, compressa, nidulantia.

HABITAT in sepibus et versuris ad *Obragillo*, Provinciae *Cantae* vicum.

FLORET toto anno.

VERNACULE *Mancapaqui*, id est, *Quiebra Ollas*.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla scissa cum staminibus. 3 Pistillum cum stigmate bifido. 4 Idem cum stigmate trifido. 5 Bacca.

#### LYCIUM AGGREGATUM. ICON. CLXXXII. Fig. a.

2. L. inerme, foliis oblongis acutis undulatis subtus tomentosis, floribus axillaribus aggregatis numerosissimis.

FRUTEX biorgyalis, leviter tomentosus, canescens, inermis.

CAULIS erectus, teres, medullosus, aliquando granulatus, ramosus, in florescentia ferè defoliat.

RAMI patuli, consimiles.

FOLIA primum fasciculata, inaequalia, tandem sparsa, petiolata, oblonga, acuta, undulata, integerrima, subtus tomentosa, incana, supra glabra, utrinque venosa; *majora* bipalmaria.

FLORES ex gemmis et anulis anni praecedentis, numerosi, aggregati, manè noctuque valdè fragrantés, pedicellati.

PEDICELLI graciles, supra incrassati, inaequales.

CALYX parvus, quinquecrenatus, crescens.

COROLLA alba, calyce quadruplò major. *Tubus* brevis, rectus. *Faux* sensim ampliata. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* ovatis, acutis, reflexis, maculâ viridi notatis.

FILAMENTA subulata, è medio tubi, longitudine corollae, imberbia. *Antherae* ovatae, basi excavatae, luteae.

STYLUS declinatus. *Stigma* vix emarginatum.

BACCA globosa, pisi magnitudine, aurantii coloris, bilocularis, nitida.

SEMINA reniformia, lutescentia, minima.

HABITAT passim in *Limae*, *Chancay*, *Cantae* et *Huanuci* vallibus et praeruptis, ad sepes et versuras.

FLORET toto anno.

VERNACULE *Mancapaqui*, *Quiebra Ollas* et *Mullaca*.

Usus: Lignum in foco cum strepitu comburitur, et ollas de-



jicit conquassatque, unde nomen *Quiebra Ollas* accepit.  
*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Corolla cum staminibus scissa. 3 Pistillum in receptaculo. 4 Bacca cum calyce.

*LYCIUM SPATHULATUM.* ICON. CLXXXIII. *Fig. b.*

3. *L. inerme* foliis obovato-spathulatis, floribus fasciculatis axillaribus.

FRUTEX biorgyalis, inermis, glaber.

CAULIS erectus, teres, ramosissimus.

RAMI patentissimi, consimiles: *teneri* obsoletè angulati.

FOLIA fasciculata, inaequalia, postea alterna, petiolata, obovato-spathulata oblongaque, obtusa, integerrima, utrinque nitida: *majora* bipollicaria.

PEDUNCULI fasciculati, è singulis punctis gemmaceis plures, inaequales, uniflori, teretes, tenues, supernè crassiores, erecti.

CALYX truncatus, leviter quinqueidentatus, in fructu quinquecrenatus.

COROLLA tubulosa, calyce quintuplò major, supernè sensim ampliata, violacea; limbo quinquefido, pubescente.

FILAMENTA subulata, ultra basim inserta, infernè pubescentia, corollae tubo breviora. *Antherae* ovatae, basi excavatae, luteo-violaceae.

STYLUS longitudine staminum.

BACCA rubro-lutea, pisi magnitudine.

SEMINA parva, lutescentia.

HABITAT passim in circuitu et sepibus *Huanuci* urbis.

FLORET Majo, Junio et Julio.

*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Bacca in calyce per medium secta. 6 Semina.

*LYCIUM OBOVATUM.* ICON. CLXXXIII. *Fig. c.*

4. *L. spinosum*, foliis obovatis obtusissimis, spinis foliosis; vetustioribus nudis, floribus paucis nutantibus.

FRUTEX subbiorgyalis, spinosus, glaberrimus.

CAULIS erectus, ramosissimus, teres, subcinereus.

RAMI patentes, diffusi, consimiles.

SPINAE solitariae, rigidae, saepe foliiferae et floriferae.

FOLIA fasciculata, inaequalia, postea sparsa, petiolata, obovata, obtusissima, integerrima, leviter venosa, crassiuscula.

PEDUNCULI solitarii, axillares, uniflori, graciles, supernè incrassati.

FLORES cernui.

CALYX corollâ sextuplò brevior, quinquecrenatus: *crenaturis* cum minimo acumine.

COROLLA purpureo-violacea, tubulosa: *limbo* quinquefido, pubescente, patulo.

STAMINA corollae longitudine, ultra basim inserta.

STYLUS corollâ longior.

BACCA aurantii coloris, ciceris parvi magnitudine.

SEMINA parva, fulvescentia.

HABITAT in circuitu et sepibus *Tarmae* oppidi.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VULGO: *Espino*.

*Explic. Icon.* 1 Calyx. 2 Corolla scissa cum staminibus. 3 Pistillum.

*LYCIUM SALSUM.* ICON. CLXXXIII. *Fig. a.*

5. *L. spinosum* ramis gracilibus, spinis foliosis, foliis obovato-oblongis sessilibus, floribus solitariis.

FRUTEX biorgyalis, spinosus, salsus.

CAULIS erectus, ramosissimus, teres, cinereo-pallescent.

RAMI sparsi, longissimi, dependentes, leviter striati, graciles, spinâ terminati.

SPINAE sparsae, patulae, longae, foliosae, floriferae, spinulis rigidis saepè onustae.

FOLIA fasciculata, inaequalia, postea sparsa, retroflexa, sessilia, crassiuscula, obovato-oblonga, integerrima, avenia.

PEDUNCULI è punctis gemmaceis, solitarii, teretes, uniflori, breves, supernè incrassati.

FLORES penduli, parvi.

CALYX parvus, quinqueidentatus.

COROLLA infundibuliformis, albo-purpurea. *Tubus* brevis, angustus. *Faux* sensim ampliata, villosa. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* oblongis, obtusis, reflexis, venosis.

FILAMENTA coarctationi tubi inserta, longitudine corollae. *Antherae* ovatae, basi vix excavatae.

STYLUS staminibus paulò brevior.

BACCA ferè exsucca, bilocularis, oblongo-ovata, acuminata.

SEMINA minuta, compressa, subtrigona, libera, luteo-fusca.

HABITAT in *Peruviae* littoribus ad *Lurin* sepes.

FLORET Decembri, et Januario.

VERNACULE *Cachicasa*, id est, *Espino salado*.

## CERDANA. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil. p. 37.*

### CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* tubulatum, decemstriatum, quinqueidentatum: inferum, persistens.

COR. infundibuliformis, marcescens, persistens. *Tubus* longitudine calycis. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* oblongis, patentibus.

*Nectarium* minimum, cyathiforme, quinquecrenatum, germen ambiens.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, fauci corollae inserta, basi hirsuta, laciniarum longitudine. *Antherae* oblongae, basi bifidae, versatiles, biloculares.

PIST. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, bifidus, staminibus brevior. *Stigmata* duo, oblonga, bipartita.

PER. oblongum, striatum, calyce et corollâ tectum, quadriloculare.

SEM. solitaria, oblonga.

Obs. 1. Corolla germine adulto pentapetala apparet, et germen ipsum loculamentum unum, alterumve amittit.

Obs. 2. Pericarpium immaturum offendimus.



## CHARACTER DIFFERENTIALIS.

*Pericarpium* tetraspermum. *Calyx* tubulosus, decemstriatus. *Corolla* infundibuliformis; *limbo* quinquepartito. *Filamenta* fauci corollae inserta. *Nectarium* germen ambiens. *Stigmata* duo, bipartita.

## CERDANA ALLIODORA. ICON. CLXXXIV.

1. C. foliis oblongis ovatisque, floribus paniculatis.  
ARBOR subquadrangulata, frondosissima, glabra.  
TRUNCUS erectus, rectus, teres, cinereus.  
RAMI teretes: *teneri* virides, nitidi.  
FOLIA alterna, petiolata, oblonga ovataque, acuminata, integerrima, plana, subtus venosa, submembranacea, utrinque nitida, ut plurimum sesquipalmaria.  
PETIOLI semiteretes, breves.  
RACEMI terminales, maximi, decompositi, ferè paniculati.  
CALYX submembranaceus.  
COROLLA alba, venosiuscula, marcida ferruginei coloris.  
NECTARIUM luteum.  
HABITAT in *Peruviae* nemoribus versus *Pozuzo* et *Muña* vicos, in tractu de la *Cormilla* et ad *Sancti Antonii de Playa grande* vicum. Duæ arbores per nos è *Peruvia* translatae in Hort. Reg. Mat. laetè in caldario vegetant.  
FLORET Julio, et Augusto.  
VULGO: *Arbol del Ajo*.  
USUS: Indi corticibus et foliis ad cibos condiendos utuntur.  
Obs. Cum huiusmodi arbores secantur, odorem gravissimum emittunt, et penetrantissimum, qui oculorum aciem perstringit. Cortices recenter evulsi odorem valde foetidum, vulpis urinae haud multum absimilem, spirant; postea verò Folia, uti etiam Cortex, allium maximè redolent, unde nomen ab Incolis Arbor accepit. Quaedam exiguae Formicae, quarum punctio acrem intolerabilemque pruriginem diu persistentem excitat, frequenter has arbores infestantes folia devorant, ita ut vix ulla inveni-ri possint integra.  
Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus. 4 Eadem scissa cum eisdem. 5 Nectarium. 6 Pistillum. 7 Flos marcidus. 8 Pistillum adultum. 9 Germen adultum transversim sectum loculamenta ostendens. 10 Seminum rudimenta.

## JUANULLOA. Gen. pl. Fl. Per. et Chil. p. 27. ICON. IV.

## JUANULLOA PARASITICA. ICON. CLXXXV.

1. J. foliis oblongis acuminatis, racemis dependentibus dichotomis.  
PLANTA frutescens, parasitica.  
RADIX fibrosa.  
CAULES plures, dependentes, teretes, parum ramosi, in florescentiae tempore foliis ferè nudi.  
RAMI consimiles: *teneri* medullosi, purpurascens.  
FOLIA quinque, sexve ex eodem puncto gemmaceo, postea

alterna, petiolata, oblonga, acuminata, subrepanda, integerrima, subtus albicantia, crassiuscula, parum venosa.  
PETIOLI teretes, supernè sulcati, basi vix curvati, foliis duplò breviores.

RACEMI terminales rameique, dependentes, dichotomi.

PEDICELLI breves, teretes.

CALYX, Corolla, et Bacca punicei coloris.

BACCA magni cerasi magnitudine.

SEMINA violacea, nidulantia.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus versus *Pozuzo* et *Sancti Antonii de Playa grande* vicos supra truncos arborum.

FLORET Augusto, et Septembri.

Obs. Sapor foliorum asper, et parum adstringens est.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Stamina tubo corollae affixa. 4 Pistillum. 5 Bacca in receptaculo. 6 Eadem transversim secta loculamenta ostendens. 7 Semen.

## DESFONTAINIA. Gen. pl. Fl. Per. et Chil. pag. 29. ICON. V.

## DESFONTAINIA SPINOSA. ICON. CLXXXVI.

1. D. foliis ovatis dentato-spinosis, floribus solitariis.  
FRUTEX biorgyalis, glaberrimus.  
CAULIS erectus, ramosissimus, teres, cortice cinereo, secedente obtectus.  
RAMI brachiati, tanquam cauli infixi, ferè articulati, cinereo-lutei.  
FOLIA petiolata, opposita, patentia, ovata, dentato-spinosa, coriacea, supra nitida, venosa.  
PETIOLI breves, velut ramis infixi.  
PEDUNCULI axillares, striati, petiolis longiores, uniflori.  
CALYX villosus, corollâ triplò brevior.  
COROLLA pollicaris, coccinea. *Limbus* internè lutescens.  
BACCA alba, parvi pruni magnitudine.  
SEMINA fusca, nitida.  
HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Churupallana* praedium in Provincia *Tarma*, et inter *Muña* et *Pozuzo*.  
FLORET Octobri, et Novembri.  
Obs. Sapor foliorum amarissimus, ad *Gentianam* accedens.  
Folia masticata papyrus luteo colore tingunt. Frutex ad sepes conficiendas perutilis, et ob florum pulchritudinem ad hortorum ornamentum adhiberi dignus.  
Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla scissa cum staminibus. 3 Pistillum. 4 Bacca cum calyce transversim secta loculamenta ostendens. 5 Semina.

## NYCTERISITION. Gen. pl. Fl. Per. et Chil. pag. 30. ICON. V.

## NYCTERISITION FERRUGINEUM. IC. CLXXXVII.

1. N. foliis oblongo-ovatis, floribus aggregatis.  
ARBOR quadrangulata, frondosa.  
TRUNCUS erectus, rectus, crassus, subferrugineus.  
RAMI patentes, teretes, cinerei; superiores erecto-patuli, ferruginei.



**FOLIA** sparsa, oblongo-ovata, subacuminata, acumine emarginato, petiolata, integerrima, subcarinata, horizontaliter venosa; supra nitidissima, glaberrima; subtus sericea, ferruginea, splendentia.

**FLORES** axillares, aggregati, breviter pedicellati, ferè viginti ex singula axilla.

**CALYCES** sericei, ferruginei coloris.

**COROLLA** albo-lutea, extus ferruginea, pubescens.

**GERMINA** tomentosa, fulvescentia.

**HABITAT** in *Cuchero*, *Chinchao* et *Pillao* ad *Chacahuassi* nemoribus imis et calidis.

**FLORET** Octobri, et Novembri.

**VERNACULE** *Chichimicuna*, id est, *Vespertilium* *cibus*.

**Obs.** Lignum durissimum et fulvi coloris est. Arbor incisa succum lacteum exsudat, qui aëri expositus sanguineum colorem acquirit. Sapor foliorum subadstringens est.

**Explic. Icon.** 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Eadem scissa cum staminibus. 4 Stamina. 5 Pistillum.

### SAMOLUS. LINN. *Gen. plant.* pag. 119.

#### SAMOLUS VALERANDI.

**SAMOLUS.** LINN. *Sp. pl. tom. 1. pag. 472.*

**PLANTA** herbacea, bipedalis, glabra.

**CAULIS** erectus, ramosus.

**RAMI** virgati, interdum procumbentes, radicanes.

**FOLIA** integerrima, crassiuscula: *radicalia* obovato-spathulata, bipalmaria; *caulina* oblonga ovaliaque.

**PANICULA** longissima, erecta.

**PEDICELLI** ultra medium bracteolâ lineari-lanceolatâ stipati.

**COROLLA** alba, aliquando albo-caerulea.

**HABITAT** in *Limae*, *Chancay*, *Huanuci* et *Chilensis* *Regni* locis humidis et scaturiginibus.

**FLORET** toto anno in *Peruvia*.

### LYGODISODEA. *Gen. pl. Flor. Per. et Chil.* pag. 32. *ICON. V.*

#### LYGODISODEA FOETIDA. IC. CLXXXVIII. *Fig. b.*

**I. L.** foliis cordatis acutissimis, caule volubili.

**PLANTA** fruticosa, volubilis, foetida.

**CAULIS** longissimus, valde ramosus, alternatim compressus et sulcatus.

**RAMI** brachiati, teretes, funiculiformes.

**FOLIA** opposita, petiolata, cordata, acutissima, integerrima.

**PETIOLI** lateraliter reflexi, breves.

**STIPULAE** interfoliaceae, ovatae, acutae.

**PEDUNCULI** axillares, folio dimidiò breviores, brachiati, multiflori, subcorymbosi.

**PEDUNCULI** et *Pedicelli* bracteolis ovatis, acuminatis suffulti.

**COROLLA** albo-purpurea, calyce multò longior.

**CAPSULA** pallescens.

**SEMINA** nigra, margine albo cincta.

**HABITAT** in *Peruviae* nemoribus ad *Muña* et *Pozuzo* vicos.

**FLORET** Julio, et Augusto.

**VERNACULE** *Yurahuanium*, id est, *Bejuco blanco*.

**Usus:** Indi ad trabes loco funium hujus caule ligandas, et ad alios usus utuntur.

**Explic. Icon.** 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Pistillum cum calyce. 5 Capsula basi hians. 6 Semina receptaculo utrinque affixa. 7 Semina libera.

### MACROCNEMUM. LINN. *Gen. pl.* pag. 120.

#### CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

**CAL.** *Perianthium* campanulato-cyathiforme, quinquecrenatum; *crenaturis* subrotundis, erectis: superum, deciduum.

**COR.** infundibuliformis. *Tubus* parum curvatus, calyce paulò longior. *Faux* dilatata. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* ovatis, acutis, patentibus, apice incrassatis.

**STAM.** *Filamenta* quinque, subulata, compressa, fauci inserta, basi villosa, corollâ breviora. *Antherae* oblongae, lineares, incumbentes, basi bifidae, biloculares, corollae longitudine.

**PIST.** *Germen* turbinatum. *Stylus* filiformis, declinatus, longitudine staminum. *Stigma* bilobum: *lobis* lanceolatis, compressis.

**PER.** *Capsula* turbinata, truncata, compressiuscula, umbilicata, utrinque sulcata, striata, apice longitudinaliter dehiscens, bilocularis, bivalvis: *valvulis* duplicatis; *exterioribus* corticosis, integris; *interioribus* callosis, bipartibilibus, carinatis. *Dissepimentum* contrarium.

**SEM.** plurima, minima, cuneiformia, margine obsoleto cincta. *Receptacula* obovata, cymbaeformia, callosa.

#### MACROCNEMUM CORYMBOSUM. *ICON. CLXXXIX.*

**I. M.** foliis ovato-oblongis basi excavatis carinatis sessilibus plicatis coriaceis, corymbis magnis.

**FRUTEX** ut plurimum quadriulnaris.

**CAULES** plures, simplices, erecti, infernè nudi, supernè foliosi, teretes, saepè granulis adpersi, colore cinereo-fusco variegati.

**FOLIA** opposita, horizontalia, sessilia, pedalia et ultra, ampla, ovato-oblonga, basi excavata, carinata, plicata, lineata, integerrima, coriacea, supra nitida, venosissima.

**STIPULAE** supraxillares, interfoliaceae, bipartitae: *laciniis* lanceolatis, acutissimis, erectis, adpressis, membranaceis, lineatis.

**CORYMBI** terminales, magni, brachiati, multiflori.

**PEDUNCULI** et *Pedicelli* bracteolis lanceolatis, acutis, minimis sustentati.

**CALYX** purpurascens, ad basim ut plurimum granulosus, coriaceus.

**COROLLA** crassa, intus albida, extus obscure purpurea, fauce villosa.

**CAPSULA** fusco-purpurascens, tandem atra.

**SEMINA** fulvescentia.

**HABITAT** in *Andium* collibus et runcationibus calidis, versus *Chinchao*, *Acomayo*, *Pillao* et *Muña* vicos.



*FLORET* à Junio ad Septembrem.

*VERNACULE* *Ccaratu*, id est, *Cuero de Vaca*.

*Obs.* Quamvis Cortex parum amarus sit, Collectores tamen *Cinchonarum* Corticis illum admiscere solent, quae fraus facile dignosci potest colore *Macrocnemi* corticum intus albo, et sapore amariuscule, viscido.

*Explic. Icon.* 1 Calyx. 2 Corolla cum staminibus scissa. 3 Pistillum. 4 Capsula aperta. 5 Receptacula extus et intus conspecta. 6 Semina.

*MACROCNEMUM MICROCARPON.* IC. CLXXXVIII.

*Fig. a.*

2. *M.* foliis oblongis obtusè acuminatis subtus pubescentibus, racemis terminalibus, floribus congestis sessilibus.

*FRUTEX* quadriorgyalis.

*CAULIS* erectus, teres, supernè ramosus, fusco-nigrescens.

*RAMI* consimiles, fusci: *juniores* foliosi, vix striati, obsolete angulati, obscurè purpurei.

*FOLIA* opposita, petiolata, patentia, oblonga, nonnulla oblongo-obovata, obtusè acuminata, integerrima, supra glabra, nitida, subtus pubescentia, venosa; venis inflexis.

*PETIOLI* pubescentes, breves.

*STIPULAE* supraxillares, interfoliaceae, bipartitae: *laciniis* acutis, petiolis dimidiò brevioribus, adpressis, membranaceis.

*RACEMI* terminales, tripalmes, compositi.

*PEDUNCULI* brachiati, bracteis subulatis sustentati.

*FLORES* congesti, sessiles, bracteolis ovatis, acutis distincti.

*CALYX* parvus, quinque-dentatus, deciduus.

*COROLLA* alba, calyce quadruplò major: *laciniis* reflexis.

*CAPSULA* turbinata, parva.

*SEMINA* minutissima, fulvescentia.

*HABITAT* in *Chinchao* et *Cuchero* nemoribus imis calidis per runcationes.

*FLORET* Junio, et Julio.

*Explic. Icon.* 1 Corolla cum staminibus. 2 Eadem scissa, stamina ostendens. 3 Pistillum cum calyce. 4 Capsula aperta. 5 Semina.

*MACROCNEMUM VENOSUM.* ICON. CXC. *Fig. b.*

3. *M.* foliis oblongis acuminatis venosissimis lineatis, nervo venisque pubescentibus, racemis terminalibus, floribus sessilibus.

*FRUTEX* biorgyalis.

*CAULIS* erectus, parum ramosus, teres, glaber.

*RAMI* teneri, obsolete tetragoni.

*FOLIA* opposita, petiolata, oblonga, acumine acuto, integerrima, venosissima, supra lineata, subtus reticulata, dorso venisque pubescentia, ferè tripalmaria.

*STIPULAE* interfoliaceae, bipartitae: *laciniis* lanceolatis, acutissimis, adpressis, petiolis duplò longioribus, membranaceis, striatis, rubescentibus.

*RACEMI* terminales, brachiati, multiflori, compositi, pubescentes.

*Tom. II.*

*PEDUNCULI* bracteolis subulatis suffulti.

*FLORES* sessiles, parvi.

*CALYX* minimus.

*COROLLA* alba, parva.

*HABITAT* in *Peruviae* nemoribus imis calidis, versùs *Acomayo* et *Pati* tractus.

*FLORET* Augusto, et Septembri.

*Obs.* Pericarpium non offendimus.

*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum cum calyce.

*PORTLANDIA.* LINN. *Gen. plant. pag. 121.*

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

*CAL.* *Perianthium* quinquepartitum: *laciniis* subulatis, patulis; superum, persistens.

*COR.* infundibuliformis. *Tubus* erectus, calyce multò longior. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* oblongis, patentibus deflexis.

*STAM.* *Filamenta* quinque, filiformia, basi corollae inserta, tubo longiora. *Antherae* erectae, lineares, ferè tetragonae, biloculares, corollâ longiores, divergentes.

*PIST.* *Germen* turbinatum, leviter angulatum. *Stylus* filiformis, angulosus, staminum longitudine, erectus. *Stigma* lineare, obtusum, obsolete emarginatum.

*PER.* *Capsula* turbinata, didyma, bisulca, longitudinaliter nervosa, compressiuscula, calyce coronata, bilocularis, apice bivalvis: *valvulis* duplicatis, bifidis: *interioribus* callosis. *Dissepimentum* contrarium.

*SEM.* plura, lentiformia, margine brevi, orbiculari, membranaceo cincta. *Receptaculo* oblongo, dissepimento utrinque adnato imbricata.

*Obs.* Ad hoc Genus referendas esse *Cinchonam corymbiferam* FORSTER, *caribaeam* JACQUIN, *lineatam*, *floribundam*, *brachycarpam*, *angustifoliam*, *longifloram*, *spinosam* VAHL, et *Cinchonam philippicam* CAVANILLES censem.

*PORTLANDIA CORYMBOSA.* ICON. CXC. *Fig. a.*

1. *P.* floribus corymbosis, foliis ovatis acutis lanceolatisque, stipulis subovatis.

*FRUTEX* triorgyalis, glaber.

*CAULIS* erectus, teres, supernè ramosus, cortice cinerescente, amarissimo.

*RAMI* patentes, supernè foliosi, secundum articulationes compressiusculi, saepè granulosi.

*FOLIA* opposita, breviter petiolata, patentia, ovata, acuta lanceolataque, integerrima, supra nitida, subcoriacea.

*STIPULAE* interfoliaceae, supraxillares, semicirculares, acuminatae, marcescentes, persistentes.

*CORYMBI* terminales, brachiati, multiflori.

*PEDICELLI* bracteolis subulatis suffulti.

*CALYX* tubo corollae duplò brevior.

*COROLLA* candida, calyce 4plò longior. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* patentibus, tandem deflexis.

N



CAPSULA fusco-fulva, turbinata, compressiuscula, didyma, bisulca, decemnervis.

SEMINA fulvescentia, margine dilutiori cincta.

HABITAT in Andium praeruptis et imis locis calidis, inter Chacilla et Muña vicos, praesertim versus Santo Domingo collem.

FLORET Majo, et Junio.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Pistillum cum calyce. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Capsula calyce coronata.

5 Eadem aperta, à calyce et epidermide exteriori libera.

6 Receptaculum alterum cum seminibus. 7 Semina.

### CINCHONA. LINN. Gen. plantar. pag. 121.

#### CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. Perianthium parvum, campanulatum, quinquedentatum: denticulis acutis, erectis; superum, persistens.

COR. infundibuliformis. Tubus calyce multò longior, cylindricus, vix curvatus. Faux subrotunda. Limbus planus, quinquepartitus: laciniis patentibus, ovato-lanceolatis, intus hirsutis.

STAM. Filamenta quinque, filiformia, ferè medio tubi inserta, fauce breviora. Antherae inclusae, incumbentes, lineari-oblongae, basi bifidae, biloculares, longitudinaliter utrinque dehiscentes.

PIST. Germen oblongum, truncatum, parvum, obsolete striatum, umbilicatum. Stylus filiformis, longitudine staminum. Stigma bilobum: laciniis oblongis, erectis.

PER. Capsula oblonga, obsolete compressa, bisulca, decemstriata, coronata, umbilicata, bilocularis, bivalvis, sulco à basi ad apicem longitudinaliter utrinque dehiscens: valvulis margine extrorsum divergentibus, cymbiformibus, apice connexis, duplicatis; exterioribus corticosis, fragilibus, in siccitate ab interioribus defixis; interioribus integerrimis, callosis, nitidis, marginibus introflexis, dissepimentum constituentibus.

SEM. In singulo loculo numerosa, imbricata, ovalia, compressa, margine oblongo, membranoso, inaequaliter lacero, basi emarginato cincta. Receptacula linearia, utrinque acuta.

Obs. 1. Limbus Cinchonae grandiflorae glaber.

Obs. 2. Capsularum Cinchon. grandiflorae et dichotomae Valvulae post dehiscentiam supernè divergunt, et calyces C. grandiflorae adulto germine decidunt; reliquarum verò Specierum Valvulae usque ad decidentiam ferè apice connexae, calyce coronatae persistunt.

Obs. 3. Cinchonae Genus à Portlandiae et Macrocnemi Generibus, quibus magis affine est, differt Filamentorum et Antherarum insertionem et longitudinem; Capsularum structuram et dehiscentiam; Valvularum et Seminum figuram, reliquisque notis minus insignibus, quae in Characterem generico consuli possunt.

#### HABITUS.

Arbores procerae aut humiles. Trunci solitarii, aut plures,

erecti. Rami teretes, scabri, aut laeves, cicatriculis annularibus ab insertionem stipularum provenientibus notati: teneri obtusè tetragoni, saepius sulcati. Folia opposita, petiolata, integerrima, venosa, supra nitida: tenera antice viscosa, adpressa. Stipulae interfoliaceae, oppositifoliae, supraxillares, basi connatae, subovatae, antice visco agglutinatae, caducae. Panicula terminalis, brachiata, foliosa, plerumque magna, subracemosa, vel Inflorescentia subcorymbosa. Pedunculi et Pedicelli tetragonales. Flores breviter pedicellati. Bractae parvae, deciduae. Corollae extus tomentosae, aut glabrae, limbo hirsuto aut rarius glabro. Capsulae leviter aut profundè striatae. Semina alà utrinque elongatà, lacerà cincta. Color purpureus, frequens in paniculis et inferioribus venis foliorum. Materies lignosa sublutescens. Arbores undique incisae succum gumosum rubicundiusculum exudant, infernè disseccatae plures ramos emittunt.

#### CINCHONA NITIDA. ICON. CXCI.

1. C. foliis obovatis nitidis, paniculà brachiata, corollis albo-purpureis; limbo parum hirsuto.

CASCARILLO officinal. HIP. RUIZ. Quinolog. Art. II. p. 56. ARBOR procera, 10-40 ulnaris, glabra.

TRUNCI plures, 3 ad 5, aliquando solitarii, erecti, divergentes, stoloniferi, teretes. Cortex extus scaber, fusco-nigricans, saepè ex fusco et cinereo colore variegatus; intus obscurè fulvus, amarissimus, acidulus, non ingratus.

RAMI seniores teretes, patentes, scabri, fusco-atrici, cinereo colore variegati: teneri obtusè quadrangulares, fusci.

FOLIA opposita, petiolata, obovata, integerrima, nitidissima, plana, marginibus ad basim revolutis, subtus venosa, venis saepè purpurascens: nonnulla ovali-oblonga ovato-oblongaque, 1-2 palmaria.

PETIOLI pollicares, subtus semiteretes, supra planiusculi, purpurei.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, basi coadunatae, oblongae, obtusae, caducae, intus rubescentes, marginibus reflexis.

PANICULA terminalis, composita, subracemosa, rubescens, 2-3 palmaris.

PEDUNCULI brachiati, tetragoni, multiflori.

FLORES breviter pedicellati.

PEDICELLI bracteolis subulatis stipati.

CALYX parvus, purpureus.

COROLLA alba, extus dilute purpurea, vix semipollicaris. Limbus parum hirsutus.

CAPSULA oblonga, angusta, supernè attenuata, rubescens, coronata, decemstriata.

SEMINA ovalia, fulva, margine membranaceo, oblongo, helvolo, inaequaliter denticulato cincta.

HABITAT in Andium montibus altis nemorosis frigidis ad Pampamarca, Chacahuassi, Casape, Casapillo, Cayumba, Sapan, Cuchero aliisque tractibus, et in montibus Provinciarum Huamalies, Tarmae et Xauxae.



*FLORET* Majo, Junio et Julio.

*VULGO*: *Cascarillo fino* et *Quino fino*.

*VIRE*s: Antifebrilis, tonica, adstringens, roborans, stomachica, antiseptica, suppurationem promovens.

*Obs. 1.* In Provinciis *Huanuci*, *Tarmae*, *Huamalties* et *Xauxae* haec Species pro vero, et genuino cortice Peruviano et majori pretio, quàm reliquae Species nostrae venundatur. An eadem cum *C. officinali*?

*Obs. 2.* Hanc Speciem mense Julio anni 1780 in *Cuchero* descripsimus.

*Explic. Icon.* 1 Semina.

*CINCHONA HIRSUTA.* ICON. CXCI.

2. *C. foliis ovalibus crassis margine reflexis; terminalibus subcordatis, floribus corymbosis, corollis purpurascen-  
tibus tomentosis, limbo hirsuto.*

*CASCARILLO delgado.* RUIZ. *Quinolog. Art. III. p. 60.*

ARBOR quinqueulnaris, tenuis.

TRUNCUS solitarius, saepe plures, erecti, teretes, utplurimum sex-octove pollicum crassi, parum ramosi, atri.

*Cortex* extus niger, ex fusco et cinereo colore variegatus, scaber; intus fulvus, amarissimus, acidulus, non ingratus.

RAMI erecti, teretes: *juniores* obtusè quadrangulares, quadrisulcati, pubescentes, foliosi, post hirsutiei ferrugineae delapsum atri.

FOLIA opposita, approximata, petiolata, ovalia, crassa, subtus valde pubescentia, supra nitida, venosa, venis approximatis; marginibus parum reflexis; integerrima, patentiuscula, plana; *terminalia* et *juniora* plerumque ferè cordata; *nonnulla* oblonga.

PETIOLI purpurei, breves, pubescentes, supra leviter canaliculati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, basi coadunatae, ovatae, oblongae, obtusae, marginibus retroflexis, interius rubicundiores, caducae.

PEDUNCULI terminales, compositi, brachiati, tetragoni, quadrisulci, multiflori.

FLORES corymboso-umbellati, breviter pedicellati.

PEDICELLI tetragoni, bracteolâ subulatâ, deciduâ suffulti.

CALYX purpureus, quinquedentatus: *denticulis* subulatis, longiusculis.

COROLLA purpurascens, calyce sextuplò longior, extus tomentosa. *Tubus* intus glaber. *Limbus* patens, hirsutissimus; villis albis.

FILAMENTA tubo corollae infra medium inserta, *Antherae* lineares, basi bifidae, faucis longitudine, luteae.

CAPSULA oblonga, magna, pollicaris, calyce coronata, profundè decemstriata, obscurè purpurea, post exsiccationem atra, à basi ad apicem dehiscens in duas valvulas cymbiformes, apice coalitas.

SEMINA fulva, membranâ scariosâ, helvolâ, latâ cincta.

HABITAT in *Andium* montibus nemorosis, altis et frigidis locis versùs *Pillao* et *Acomayo*.

*FLORET* à Majo ad Octobrem.

*VERNACULE* *Cascarillo fino delgado*.

*USUS*: Haec Species à mercatoribus eodem ferè pretio aestimatur ac praecedens. Nos equidem efficacitate hanc illam aequare, seu etiam antecellere existimamus.

*Obs.* Anno 1787 hanc Speciem in *Pillao* locis altis descripsimus.

*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Capsula hians. 6 Semina.

*CINCHONA LANCEOLATA.*

3. *C. foliis lanceolato-oblongis glabris, paniculâ brachiata magnâ, floribus subcorymbosis, corollis roseo-purpureis, limbo hirsuto.*

*CASCARILLO lampiño.* RUIZ. *Quinolog. Art. IV. p. 64.*

ARBOR sexorgyalis, glaber; comâ frondosiusculâ, patulâ.

TRUNCUS solitarius, saepe plures, erecti, teretes, crassi.

*Cortex* extus fuscus, parum variegatus, vix scaber; intus lutescens, praecedentibus et sequentibus amarior, acidulus, non ingratus.

RAMI teretes, erecto-patuli: *juniores* foliosi, obtusè tetragoni, secundum articulationes vix compressiusculi.

FOLIA opposita, petiolata, lanceolato-oblonga ovali-oblongaque, integerrima, plana, patentia, utrinque-glaberrima, subtus venosa, venis purpureis.

PETIOLI semipollicares, purpurascen-tes.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, oppositae, ovatae, obtusae, planae, adpressae, basi coadunatae, caducae.

PANICULA terminalis, magna, brachiata, composita, foliifera.

PEDUNCULI multiflori, subcorymbosi.

PEDICELLI *bracteolis* subulatis, deciduis suffulti.

CALYX purpurascens, brevis, quinquedentatus, persistens.

COROLLA roseo-purpurea. *Limbus* hirsutus, patens.

STAMINA infra medium tubi inserta, basi hirsuta.

CAPSULA oblonga, angusta, ferè pollicaris, leviter striata, calyce coronata, à basi ad apicem hians, rubro-fusca.

SEMINA ovalia, fulvescentia, margine oblongo, helvolo, membranaceo, obsolete lacero-dentato cincta.

HABITAT in *Andium* montibus altis frigidis et nemorosis ad *Muña*, *Panao*, *Pillao* et *Cuchero* tractus.

*FLORET* à Majo ad Octobrem.

*VERNACULE*: *Cascarillo bobo amarillo*, sive *Quino bobo amarillo* propter Corticum colorem internum.

*Obs. 1.* Cortices saporem et colorem *Quinae* de *Calisaya* nuncupatae maximè aemulantur.

*Obs. 2.* Hujus Speciei Iconem in hoc Volumine repraesentare non possumus, cujus scilicet Imaginis jacturam fecimus in toties deplorato Navis Alcantarensis naufragio: verum, ubi à Tafalla nostro novam ejusdem plantae figuram, quam ab eo petiimus, acceperimus, ipsam confestim in lucem edemus.

*Obs. 3.* In montibus *Muña* hanc Cinchonam anno 1786 offendimus.



*CINCHONA PURPUREA*. ICON. CXCI.

4. *C.* foliis oblongo-ovalibus ovatisque purpurascens, paniculâ brachiata magnâ, floribus subcorymbosis, corollis albo-purpureis, limbo hirsuto albo.

*CASCARILLO morado*. RUIZ. *Quinolog. Art. V. p. 67.*

ARBOR quadriorgyalis; comâ frondosiusculâ, patulâ.

TRUNCUS solitarius, erectus, teres, parum crassus. *Cortex* extus fuscus, laevis; intus dilute fulvus, amarus, acidulus, non ingratus.

RAMI teretes: *juniores* quadrangulares, glabri, foliosi, sulcati.

FOLIA opposita, petiolata, patentia, plana, ut plurimum tripalmaria, oblongo-ovalia ovataque, integerrima, supra nitida, subtus venosa, purpurea; *tenera* inferius pubescentia; *adulta* utrinque glabra.

PETIOLI semiteretes, pollicares, purpurei.

STIPULAE supraxillares, interfoliaceae, oppositae, basi connatae, ovato-cordatae, obtusae, adpressae, caducae.

PANICULA terminalis, foliosa, subracemosa, magna.

PEDUNCULI brachiati, longi, tetragoni, compressi.

FLORES corymbosi, breviter pedicellati.

PEDUNCULI et *Pedicelli* bracteolis subulatis, deciduis stipati.

CALYX minimus, quinquedentatus, obscure purpureus.

COROLLA extus leviter tomentosa. *Tubus* dilute ruber. *Limbus* supra hirsutus, albus, infra purpurascens: *laciniis* patentissimis, apice vix reflexis.

FILAMENTA infra medium tubi inserta, breviter. *Antherae* lineares, basi bifidae, inclusae.

GERMEN tomentosum.

CAPSULA oblonga, angusta, decemstriata, rubro-fusca, calyce coronata, à basi ad apicem hians.

SEMINA fulva, alâ lineari utrinque acutâ, lacerâ, fulvescenti cincta.

*HABITAT* in *Andium* montibus imis nemorosis et nocte frigidiusculis passim ad *Chinchao*, *Pati*, *Muña*, *Iscutunam*, *Casape*, *Casapillo* et *Chihuamccala* tractus.

*FLORET* à Majo ad Septembrem.

*VERNACULE* *Cascarillo bobo de hoja morada*.

*Obs.* Hanc Speciem in *Pati* montibus mense Julio anni 1780 primùm invenimus.

*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Stamen. 5 Pistillum. 6 Capsula aperta. 7 Receptaculum cum seminibus. 8 Receptaculum alterum absque seminibus. 9 Semina.

*CINCHONA MICRANTHA*. ICON. CXCI.

5. *C.* foliis ovalibus obtusis, paniculâ maximâ, floribus numerosis parvis, corollis albis; limbo lanato.

ARBOR viginti-triginta ulnaris; comâ frondosâ terminatus.

TRUNCUS saepè solitarius, erectus, crassus, teres. *Cortex* scaber, fusco-cinereus, valde amarus, acidulus.

RAMI patuli, teretes, cortice fusco-nigrescenti obducti: *teneri* foliosi, obtusè tetragoni, glabri.

FOLIA opposita, petiolata, ovalia, nonnulla ovali-obova-

ta, integerrima, obtusa, obsoletè acuminata, ampla, patentia, plana, ut plurimum quadripalmaria; supra nitida, glaberrima, subtus venosa, ad basim venarum leviter pubescentia: *venis* purpureis; *majoribus* alternis; *minoribus* interstinctis.

PETIOLI breves, vix pollicares, supra plano-canaliculati, subtus semiteretes.

STIPULAE supraxillares, interfoliaceae, oppositae, ovatae, connatae, caducae.

PANICULA terminalis, maxima, subracemosa, foliosa, floridissima, tomentosa, subhelvola.

PEDUNCULI vix striati, tetragoni, compressiusculi, *communes* brachiati: *partiales* oppositi alternique; omnes bracteis ovato-subulatis, deciduis stipati.

FLORES numerosi, in corymbos parvos, multifloros congesti, subsessiles, bracteis minimis, acutis suffulti.

CALYX minimus, quinquedentatus: *denticulis* acutis, dilute purpurascens.

COROLLA parva, ut plurimum trilinearis, extus tomentosa: *Limbus* patens, intus lanatus, albus, extus rubescens; *laciniis* parvis.

FILAMENTA breviter, infra medium tubi corollae inserta. *Antherae* lineares, filamentis longiores, inclusae.

STYLUS longitudine ferè staminum. *Stigma* bilobum.

CAPSULA oblonga, acuta, leviter decemstriata, fusca, calyce coronata, à basi ad apicem dehiscens: *valvulis* apice coalitis, basi semotis.

SEMINA parva, fulva, alâ lineari, utrinque acutâ, inaequaliter lacerâ cincta.

*HABITAT* in *Andium* montibus altis frigidis et nemorosis, versus vicum *Sancti Antonii de Playa grande*, ubi Joannes Tafalla anno 1797 eam observavit, et iconem cum nonnullis exemplaribus siccis et descriptionem nobiscum communicavit.

*FLORET* Majo, Junio et Julio.

*VULGO*: *Cascarillo fino* Incolae nuncupant.

*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Pistillum cum calyce. 3 Corolla. 4 Eadem scissa cum staminibus. 5 Stamen. 6 Capsula. 7 Eadem aperta. 8 Semen.

*CINCHONA OVATA*. ICON. CXCV.

6. *C.* foliis ovatis subtus tomentosis, paniculâ brachiata, floribus subcorymbosis, corollis purpureis; limbo hirsuto.

*CASCARILLO palido*. RUIZ. *Quinolog. Art. VII. p. 74.*

ARBOR sexorgyalis; comâ frondosâ, patente.

TRUNCUS erectus, simplex, teres, ramosus. *Cortex* extus cinereo-lutescens, parum compactus, laevis, rarius variegatus, intus obscure fulvus; amarissimus, acidulus, admodum ingratus, levis.

RAMI *seniores* erecto-patentes, teretes: *juniores* obtusè quadrangulares, pubescentes, fusci, supernè foliosi.

FOLIA approximata, opposita, petiolata, ovata, ampla, integerrima, patentia, plana, supra nitidissima, subtus tomentosa, venosa, venis purpurascens: *tenera* utrinque tomentosa; *nonnulla* ovato-ovalia.



PETIOLI purpurei, sesquipollicares.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, magnae, basi connatae, adpressae, ovatae, obtusae, integerrimae, aveniae, virescentes, caducae.

PANICULA terminalis, magna, foliosa, subracemosa, composita.

PEDUNCULI brachiati, longi, tetragoni, sulcati, multiflori. FLORES subcorymbosi, breviter pedicellati.

PEDICELLI bracteolis subulatis, deciduis sustentati.

CALYX glaber, purpureus, quinquedentatus; *denticulis* parvis, acutis.

COROLLA semipollicaris, extus purpurea, pubescens. *Limbus* patens, intus hirsutus, albus.

FILAMENTA infra medium tubi corollae inserta. *Antherae* lineares, basi bifidae, faucis longitudine.

CAPSULA oblonga, angusta, glabra, leviter striata, calyce coronata, à basi ad apicem dehiscens, bivalvis: *valvulis* cymbaeformibus, apice coalitis.

SEMINA fulva, alà oblongâ leviter lacerâ, helvolâ cincta.

HABITAT in *Andium* montibus imis nemorosis calidis versus *Pozuzo* et *Panao*.

FLORET à Junio ad Octobrem.

VERNACULE *Cascarillo de Pata de Gallareta*.

Obs. Hanc Speciem in *Pozuzo* et *Panao* anno 1784 offendimus.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Capsula aperta. 6 Receptaculum cum seminibus. 7 Receptaculum alterum absque seminibus. 8 Semina.

#### CINCHONA MAGNIFOLIA. ICON. CXCVI.

7. C. foliis oblongis ovalibusque glabris, paniculâ brachiata, floribus subcorymbosis, corollis albis; limbo villosiusculo.

CASCARILLO amarillo. RUIZ. *Quinolog. Art. VI. p. 71.*

ARBOR ferè quadragintaularis, glabra; comâ valde frondosâ, erecto-patenti.

TRUNCUS solitarius, erectus, teres. *Cortex* laeviusculus, fusco-cinereus, intus fulvus, amarus, acidulus, non ingratus.

RAMI seniores teretes, laeves, fusci coloris: *juniores* obtusè tetragoni, foliosi, dilute rubescentes.

FOLIA opposita, petiolata, ampla, oblonga ovaliaque, integerrima, pallescentia, supra nitida, subtus venosa: venis inflexis purpurascensibus: ad basim venarum setis numerosis fasciculatis albidis: *majora* 1-2 pedalia.

PETIOLI semiteretes, purpurei, 1-2 pollicares.

STIPULAE supraxillares, interfoliaceae, oppositae, adpressae, basi coadunatae, obovatae, acuminatae, aveniae, caducae.

PANICULA terminalis, erecta, maxima, composita, foliosa, ferè pedalis, subracemosa.

PEDUNCULI brachiati, longi, multiflori.

FLORES subcorymbosi, pedicellati.

PEDICELLI bractea, minimâ, ovatâ, acutâ, deciduâ stipati.

CALYX purpureus, quinquedentatus, parvus.

Tom. II.

COROLLA ferè pollicaris, odorata, alba. *Limbus* patens, intus parum hirsutus.

FILAMENTA infra medium tubi corollae inserta. *Antherae* intra faucem, oblongae, basi bifidae.

CAPSULA oblonga, magna, ferè sesquipollicaris, obsoletè striata, leviter curvata, calyce coronata.

SEMINA ovalia, fulva, margine oblongo, scarioso, fragili, inaequaliter lacerato cincta.

HABITAT in *Andium* nemoribus calidissimis prope torrentes copiosè ad *Chinchao*, *Cuchero* et *Chacahuassi*.

FLORET Majo, Junio et Julio.

VERNACULE *Flor de Azahar* propter corollae odorem, *Citri Aurantii* florum odori simillimum. Hujus corticem *D. Sebastianus Josephus Lopez Ruiz* primus è Regno novo Granatensi in Hispaniam attulit, unde cum Galliae, Italiae et Angliae Academiis per clar. Casimirum Ortega communicatus est, ejusque usus variis experimentis institutis ubique propagatus.

Obs. Anno 1780 hanc Speciem in *Cuchero* descripsimus.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem scissa cum staminibus. 5 Stamina. 6 Pistillum. 7 Capsula.

#### CINCHONA DICHOTOMA. ICON. CXCVII.

8. C. foliis oblongo-lanceolatis, pedunculis terminalibus dichotomis paucifloris, capsulis angustis linearibus longis.

ARBOR triorgyalis, glabra.

TRUNCUS erectus, teres, supernè ramosus. *Cortex* fuscus, scabriusculus, maculis albidis variegatus, amarissimus, ut reliquae arboris partes, acidulus non ingratus.

RAMI teretes: *terminales* foliosi, obsoletè striati, secundum articulationes compressiusculi, oppositi, plerumque altero abortienti dichotomi.

FOLIA opposita, patentia, oblongo-lanceolata, plana, integerrima, venosa: *venis majoribus* suboppositis, incurvis; *minoribus* numerosis, ferè reticulatis.

PETIOLI breves, trilineares, supra planiusculi.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, oblongo-obovatae, obtusae, petiolis longiores, aveniae, rubicundae, adpressae, basi coadunatae, caducae.

PEDUNCULI terminales, sesquipalmes, ferè vigintisexflori, divisi in dichotomias tres divergentes.

FLORES secundi, breviter pedicellati, bracteis minimis deciduis suffulti.

CAPSULA linearis, infernè parum angustior, ferè bipollicaris, leviter striata, calyce coronata, bivalvis, apice ad basim dehiscens: *valvulis* cymbaeformibus, supernè divergentibus, integerrimis.

SEMINA numerosa, fusca, alà lineari, angustâ, scariosâ, utrinque inaequaliter lacerâ cincta.

HABITAT in *Andium* nemoribus versus *Pueblo nuevo* in *Chicoplaya* tractibus, ubi Joannes Tafalla Speciem detexit, et inde exemplaria sicca nobis anno 1797 missit.

FLORET à Januario ad Aprilem.

Explic. Icon. 1 Germen calyce coronatum. 2 Semina.



## CINCHONA GRANDIFLORA. ICON. CXCVIII.

9. C. foliis ovalibus obovatisque subaveniis coriaceis subtus albidis, corymbis terminalibus, corollis magnis glabris candidis.

ARBOR triorgyalis, glaberrima.

TRUNCUS erectus, teres, solitarius, aliquando plures, superne ramosus. Cortex extus cinereo-fuscus, intus lutescens, amariusculus, sed praecedentibus multo minus.

RAMI teretes, patuli: *teneri* obsolete tetragoni, in summitatibus foliosi.

FOLIA opposita, parum approximata, petiolata, patentia, plana, ovalia obovataque, obtusissima, integerrima, coriacea, supra nitida dilute viridia, subtus albida: *venis partialibus* obsoletis; *majoribus* vix manifestis, erecto-inflexis.

PETIOLI sesquipollicares, supra obsolete canaliculati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, oppositae, magnae, basi connatae, obovatae, obtusae, obsolete striatae, caducae.

CORYMBI terminales, foliosi, patuli, ferè trigintaflori.

PEDUNCULI brachiati, obsolete quadrangulares.

FLORES fragrantissimi, magni, pedicellati.

PEDICELLI uniflori, aut biflori, furcati; *bracteolis* subulatis, deciduis stipati.

CALYX tubulosus, brevis, sesquilinearis, quinquedentatus: *denticulis* acutis, erectis; adulto germine deciduus.

COROLLA candida, ferè tripollicaris, glabra, infundibuliformis. *Tubus* cylindricus, inferne vix pentagonus. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* ovatis, patentissimis, tandem reflexis.

FILAMENTA quinque, brevissima, tubo infra faucem inserta, linearia. *Antherae* incumbentes, lineares, basi bifidae, acutae, biloculares, intra faucem.

GERMEN oblongum. *Stylus* filiformis, antherarum ferè longitudine. *Stigma* bilobum: *lobis* oblongis.

CAPSULA subpalmaris, oblonga, basi angustata, bisulca, obsolete striata, rudimento styli terminata, parum curvata, bilocularis, apice ad basim bivalvis: *valvulis* integerrimis, duplicatis, divergentibus, cymbaeformibus, tandem expansis: *exterioribus* corticosis, deciduis; *interioribus* callosis, extus nervosis: nervis filiformibus, secedentibus.

SEMINA numerosa, minima, fulva, alâ angustâ, lineari, utrinque acutâ, lacerâ, helvolâ cincta. *Receptaculum* magnum in singulo loculo, utrinque cum valvula sese convolvens.

HABITAT in *Andium* nemoribus calidissimis, affatim ad *Pozuzo* fluvii margines; et in novo Regno Granatensi circa praedium *La Quebrada larga*, aliisque locis ejusdem Regni, in quibus *Mestiza*, *Azuzeno*, *Capecape*, *Capecito* et *Cape negro* Incolae nuncupant, teste D. D. Sebastiano Josepho Lopez Ruiz.

FLORET à Januario ad Martium.

Obs. Anno 1784 ad *Pozuzo* ripas hanc Speciem deteximus, descripsimus et delineavimus.

Explic. Icon. 1 Calyx à germine liber. 2 Stamina tubo corollae inserta. 3 Pistillum. 4 Capsulae dimidia pars inferior transversim secta. 5 Semina.

## CINCHONA ROSEA. ICON. CXCIX.

10. C. foliis oblongis obtusè acuminatis, paniculâ brachiata, floribus corymbosis, corollis roseis; limbo margine tomentoso.

CASCARILLO pardo. Ruiz. *Quinolog.* Art. VIII. p. 77.

ARBOR 3oulnaris, frondosissima, florescentiae tempore perpulchra.

TRUNCUS solitarius, erectus, crassus, excavationibus alternis ferè tortuosus, ramosissimus. Cortex extus fuscus, laevis, ex fusco-cinereo variegatus; intus hepatici ferè coloris, valde adstringens, vix amarus.

RAMI teretes: *teneri* secundum articulationes compressi, obsolete quadrangulares, foliosi.

FOLIA opposita, petiolata, palmaria, oblonga, obtusè acuminata, integerrima, glabra, nitida, subtus venosa: *venis majoribus* alternis; *minoribus* interstinctis, tenuibus.

PETIOLI breves, parum curvati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, obovatae, obtusae, basi connexae, aveniae, caducae, purpureae, extus pubescentes.

PANICULA terminalis, erecta, brevis, composita, multiflora, subracemosa.

PEDUNCULI brachiati, pubescentes, ferruginei, compressi.

FLORES subcorymbosi, breviter pedicellati.

PEDICELLI et *Pedunculi* bracteolis parvis, ovatis, acutis, ferè connatis sustentati.

CALYX minimus, quinquedentatus, purpurascens.

COROLLA quadrilinearis, rosea. *Tubus* subcylindricus, leviter curvatus. *Faux* glabra. *Limbus* patentissimus, tomentosus, disco glabro.

FILAMENTA subulata, declinata, basi hirsuta, infra medium tubi inserta. *Antherae* ovatae, basi bifidae, parvae, fauce parum exsertae.

CAPSULA bilocularis, vix curvata, calyce coronata.

HABITAT in *Andium* nemoribus imis, copiosè ad *Pozuzo* et *S. Antonii de Playa grande* tractus.

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE *Asmonich*.

USUS: Feminae his floribus templa et Divorum simulacra ornant.

Obs. 1. Quaedam exiguae et ex rubro nigrescentes Formicae, *Tragineras*, id est convectores seu muliones ab incolis appellatae folia *Cinchonae roseae* avidè appetunt, atque adeo sub arboris florescentiae initio ita ea perforant et comminunt, ut vix unum aut alterum folium integrum invenire liceat.

Obs. 2. Hanc Speciem anno 1784 adumbravimus.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Ea-



dem cum staminibus scissa. 5 Stamina. 6 Pistillum cum calyce. 7 Capsula calyce coronata.

SCHWENKFELDA. LINN. *Gen. pl.* p. 123.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* superum, quinquepartitum, persistens: *laciniis* lineari-subulatis, reflexis.

COR. infundibuliformis. *Tubus* longitudine ferè calycis. *Faux* villosa. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* lanceolatis, acutis, patentibus.

STAM. *Filamenta* quinque, brevissima, filiformia, tubo infra faucem inserta. *Antherae* lineares, basi bifidae, incumbentes, inclusae.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* quinque, acuta, longitudine ferè corollae.

PERIC. *Bacca* globosa, pentagona, quinquelocularis, calyce coronata.

SEM. plurima, ovata, minima.

Obs. 1. Numerus stigmatum et capsulae loculamentorum saepè quaternarius.

Obs. 2. Cl. *Schreberus* Sabiceas *Aublet. Guyan. tab.* 75. et 76. quarum fructificationes cum nostrâ plantâ congruunt, ad *Schwenkfeldae* Genus retulit.

SCHWENKFELDA UMBELLATA. IC. CC. *Fig. a.*

1. S. foliis ovatis acutis, pedunculis axillaribus umbellatis.

PLANTA suffruticosa, volubilis, hispidula.

CAULIS teres, ramosus, glaber.

RAMI teretes: *teneri* hispidi.

FOLIA opposita, petiolata, ovata, acuta, integerrima, venosa, lineata, patentia, plana.

PETIOLI pollicares, supra leviter canaliculati.

STIPULAE interfoliaceae, oppositae, ovatae, petiolis connatae, acutae, integerrimae, persistentes, striatae, magnae.

PEDUNCULI axillares, petiolis paulò longiores, patentes, solitarii.

FLORES umbellati, involucrati, breviter pedicellati.

UMBELLA composita, trifida.

INVOLUCRUM diphyllum: *foliolis* ovato-lanceolatis, acutis, integerrimis, persistentibus.

PEDICELLI bracteâ lineari-subulatâ, deciduâ suffulti.

COROLLA alba.

BACCA hirsuta, albicans.

SEMINA minima, lutescentia.

HABITAT in *Andium* nemoribus, ad *Cuchero*, *Macora* et *Chinchao* tractus.

FLORET à Junio ad Septembrem.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Bacca calyce coronata. 6 Eadem transversim secta loculamenta ostendens. 7 Semina.

CAMPANULA. LINN. *Gen. pl.* pag. 117.

CAMPANULA FILIFORMIS. ICON. CC. *Fig. c.*

1. C. capsulis bilocularibus apice dehiscentibus, foliis linearibus; *inferioribus* denticulatis, floribus terminalibus ternatis.

PLANTA herbacea, pedalis, glabra, annua.

RADIX filiformis, tortuosa, caulibus crassior, albidiuscula.

CAULES plures, filiformes, erecti, graciles, teretes, striati.

RAMI pauci, consimiles.

FOLIA alterna, distantia, linearia, erecta, sessilia; *inferiora* denticulata; *superiora* integerrima.

PEDUNCULI terminales, ternati, uniflori.

CALYX acutus, corollâ triplò brevior, patulus.

COROLLA albo-caerulea.

STIGMA bipartitum.

CAPSULA calyce paulò longior, bilocularis, imperforata, apice in duas valvulas dehiscens.

SEMINA numerosa, minima, nigra.

HABITAT in aridis locis *Conceptionis Chile*, ad *Puntilla* et *Carcamo* tractus.

FLORET Decembri, et Januario.

VERNACULE *Unuperguen*.

USUS: Infusum calidum flatu discutit.

Explic. Icon. 1 Capsula cum calyce. 2 Semina.

CAMPANULA BIFLORA. ICON. CC. *Fig. b.*

2. C. capsulis trilocularibus, foliis ovatis sessilibus crenatis, floribus binis axillaribus sessilibus.

PLANTA herbacea, hispidula, subpedalis, annua.

RADIX tenuis, fibrillosa, albidiuscula.

CAULIS solitarius, rarius duo tresve, simplicissimus, filiformis, gracilis, angulatus, erectus.

FOLIA alterna, sessilia, ovata, crenata, subcarinata.

FLORES axillares, gemini, sessiles; altero praecotiori.

CALYX 3-4-5 partitus: *laciniis* acutis, erectis.

COROLLA calyce triplò longior, caerulea.

CAPSULA trilocularis, prope apicem poris tribus dehiscens.

SEMINA plura, minima, nigra.

HABITAT in *Peruviae* collibus arenosis ad *Cercado*, *Cantae* et *Chanay* Provincias.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Capsula cum calyce. 2 Semina.

HIPPOTIS. *Gen. pl. Fl. Per. et Chil.* pag. 33.

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* auriculaeforme, acutum, integerrimum, superum, coloratum, persistens.

COR. infundibuliformis. *Tubus* curvatus, calyce longior. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* obovatis, obtusis, integerrimis, reflexis.

*Nectarium* breve, cyathiforme, quinquecrenatum, germen ambiens.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, curvata, basi villosa,



incrassata, infra medium tubi inserta, eoque breviora.

*Antherae* ovatae, incumbentes, biloculares.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, curvatus, longitudine tubi. *Stigma* oblongum; bifidum; *laciniis* adpressis.

PER. *Bacca* ovata, bilocularis, calyce coronata.

SEM. plurima, minima, cuneiformia.

#### CHARACTER DIFFERENTIALIS.

*Bacca* bilocularis, calyce auriculiformi coronata. *Corolla* infundibuliformis, curvata. *Nectarium* germen ambiens. *Stigma* bifidum; *laciniis* adpressis.

#### HIPPOTIS TRIFLORA. ICON. CCI.

1. H. foliis obovato-oblongis acuminatis, pedunculis trifloris.

FRUTEX biorgyalis, hirsutus.

CAULIS erectus, ramosus, articulationibus villis purpureis obvallatis, teres, cinereus.

RAMI consimiles, supernè foliosi, ad articulationes incrassati.

FOLIA opposita, petiolata, obovato-oblonga, acuminata, integerrima, venosissima, patentia, bipalmaria et ultra.

PETIOLI breves, semiteretes, supernè leviter sulcati.

STIPULAE duae, interfoliaceae, supraxillares, oppositae, ovatae, inter se convolutae, caducae.

PEDUNCULI axillares, filiformes, foliis dimidiò breviores, triflori, cernui, in fructu dependentes.

FLORES breviter pedicellati: *Pedicelli laterales* bracteolâ subulatâ, deciduâ stipati.

CALYX purpureo-ruber.

COROLLA laccae coloris, basi virescens. *Tubus* intus rubrolutescens. *Nectarium* luteum, parvum, crassiusculum.

BACCA purpureo-rubra, hirsuta.

SEMINA fusi coloris.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus, versùs *Cuchero*, *Macora* et *Marimarchahua*.

FLORET à Majo ad Augustum.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem scissa cum staminibus. 5 Pistillum. 6 Nectarium. 7 Bacca calyce coronata. 8 Baccae dimidia pars inferior loculamenta cum seminibus ostendens. 9 Semina.

#### PSYCHOTRIA. LINN. Gen. pl. pag. 125.

##### CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* minimum, quinquedentatum: *denticulis* acutis; superum, persistens.

COR. infundibuliformis. *Tubus* calyce longior. *Faux* dilatata. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* ovatis, acutis, patentibus, apice reflexis.

STAM. *Filamenta* quinque, filiformia, breviora, infra faucem inserta. *Antherae* incumbentes, lineares, basi bifidae, biloculares, corollâ breviores.

PIST. *Germen* subrotundum, umbilico prominenti. *Stylus* filiformis, staminum longitudine. *Stigma* bilobum: *lobis* oblongis, crassiusculis, obtusis.

PER. *Bacca* ovalis, coronata, unilocularis, disperma.

SEM. ovata, ossea, hinc convexa sulcata, inde plana laevia.

Obs. *Corollae Tubus* in nonnullis Speciebus basi apiceque dilatatus; *Stamina* in plerisque inclusa. *Bacca* in aliis ovata, in aliis globosa.

#### HABITUS.

*Frutices* erecti, aut *Herbae* repentes. *Caules* teretes. *Rami* brachiati; *teneri* obtusè tetragoni. *Folia* opposita, integerrima, valde venosa. *Stipulae* interfoliaceae, supraxillares, oppositae, interius glanduliferae, aut ciliatae, plerumque persistentes. *Flores* terminales, racemosi aut paniculati, cymosi aut conferti. *Pedunculi* et *Pedicelli* ferè tetragoni, saepè compressiusculi, bracteis acutis, integerrimis stipati.

Obs. : An sejungendae ab hoc Genere *Psychotria macro-poda* et *gracilis* quae sunt herbae repentes, et calyce habituque à reliquis Speciebus fruticosis non parum dissimiles? Auptotae in plantis vivis dijudicare poterunt.

#### PSYCHOTRIA MACROPHYLLA. ICON. CCII. Fig. a.

1. P. foliis oblongo-lanceolatis amplis, stipulis unidentatis, racemis axillaribus subdichotomis.

PLANTA herbacea, biulnaris, glabra.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

RAMI consimiles.

FOLIA opposita, petiolata, ferè pedalia, tenuia, oblongo-lanceolata, acuta, integerrima, venosa; *venis majoribus* inflexis, alternis; minoribus ramosis, capillaribus: *nervo venisque majoribus* utrinque sulcatis.

PETIOLI bipollicares, supernè leviter sulcati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, parvae, semiamplexicaules, unidentatae, interius ad basim glandulis minimis, oblongiusculis, acutis.

RACEMI axillares, longitudine petiolorum, multiflori.

PEDUNCULI terni, quaterni, striati, bracteis perfoliatis sustentati; *partiales* dichotomi.

FLORES sessiles, parvi.

CALYX minimus, quinquedentatus.

COROLLA alba, vix trilinearis.

BACCA parvi pisi magnitudine, ovalis, obscurè violacea.

SEMINA extus trisulcata.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus versus *Pillao* ad *Iscutunam* tractum.

FLORET Octobri, et Novembri.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Eadem scissa cum staminibus. 4 Stamen. 5 Pistillum cum calyce. 6 Bacca calyce coronata. 7 Semen latere convexo visum. 8 Idem latere plano conspectum.

#### PSYCHOTRIA RETICULATA. ICON. CCII. Fig. b.

2. P. foliis oblongo-lanceolatis venoso-reticulatis, stipulis bidentatis: dentibus subulatis, racemis terminalibus brachiatis.

PLANTA herbacea, biulnaris, pubescens.



CAULIS erectus, teres, supernè obsoletè tetragonus, ramosus, glaber.

RAMI brachiati, tetragoni, erecti.

FOLIA opposita, remota, ferè pedalia, subcoriacea, oblongo-lanceolata, acuta, integerrima, densè venosa, reticulata, subtus magis pubescentia, nervo prominenti; venis majoribus inflexis, purpurascentibus.

PETIOLI semipollicares, supra leviter sulcati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, adpressae, fulvescentes, truncatae, bidentatae: denticulis subulatis, petiolo longioribus, interius ad basim glandulis 7, subulatis, gradatim majoribus.

RACEMI terminales, compositi, bipalmes, erecti.

PEDUNCULI inferiores brachiati: superiores sparsi: communes et partiales angulati, bracteolâ subulatâ ad eorum medium, vel ad basim insertâ.

FLORES congesti, sessiles; bracteolâ minimâ, subulatâ stipati.

CALYX minimus, quinquedentatus.

COROLLA parva, ut plurimum trilinearis, lutea, extus pubescens. *Faux* villosa. *Limbi lacinae* reflexae, acutae.

FILAMENTA faucis basi inserta, brevissima. *Antherae* lineares, laciniis corollae dimidiò breviores.

HABITAT in *Andium* nemoribus versùs *Pillao* per *Chachuassi* runcationes.

FLORET Octobri, et Novembri.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Eadem scissa cum staminibus. 4 Stamen. 5 Pistillum cum calyce.

PSYCHOTRIA AMETHYSTINA. ICON. CCIII. Fig. b.

3. P. foliis oblongis acuminatis, stipulis vaginantibus quadridentatis, racemis terminalibus, corollis baccisque amethystinis.

FRUTEX biorgyalis, in flore speciosus.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI brachiati, erecti, supernè foliosi: teneri tetragoni, villosiusculi, villis deciduis.

FOLIA opposita, petiolata, oblonga, acuminata, integerrima, patentia, subcoriacea, supra glabra, nitida, subtus nervo venisque villosa, venosissima: venis incurvis.

PETIOLI ferè pollicares, supernè sulcati.

STIPULAE supraxillares, interfoliaceae, in vaginae formam connatae, ore interius margine brevi cinctae, bidentatae; dentibus subulatis, longis, erectis; ad basim singuli denticuli glandulae septem, subulatae, gradatim majores.

RACEMI terminales, compositi, hirsuti.

PEDUNCULI et *Pedicelli* bracteolis subulatis stipati.

FLORES breviter pedicellati.

CALYX quinquedentatus, parvus.

COROLLA amethystini coloris, tubulosa, basi et fauce dilatata. *Tubus* intus ad coarctationem villosus. *Limbus* quinquepartitus: laciniis apice reflexo, crasso.

FILAMENTA medio tubi inserta. *Antherae* lineares, inclusae.

BACCA ovalis, calyce coronata, amethystini coloris.

SEMINA hinc plana, inde convexa, quinesulcata.

Tom. II.

HABITAT in *Andium* nemoribus ad *Pillao* et *Huassahuassi* runcationes.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Corolla scissa cum staminibus. 2 Stamen. 3 Pistillum cum calyce. 4 Bacca calyce coronata. 5 Semina extus et intus aspecta.

PSYCHOTRIA MACROBOTRYS. ICON. CCIII. Fig. a.

4. P. foliis lanceolatis pubescentibus longis, stipulis bidentatis, racemis terminalibus longissimis.

PLANTA frutescens, biorgyalis.

CAULIS erectus, teres, glaber, ramosus.

RAMI consimiles, brachiati: teneri obsoletè tetragoni.

FOLIA opposita, petiolata, lanceolata, acuta, integerrima, subtus pubescentia.

PETIOLI semipollicares, supra vix sulcati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, semiamplexicaules, truncatae, adpressae, utrinque dentatae, interius ad basim denticulorum glandulis numerosis, subulatis.

RACEMI terminales, pedales et ultra, erecti, purpurei, multiflori, pubescentes.

PEDUNCULI sparsi subdichotomici, bracteâ minimâ, subulatâ stipati.

FLORES pedicellati.

CALYX minimus, quinquedentatus.

FILAMENTA coarctationi tubi villosae inserta. *Antherae* lineares, inclusae.

COROLLA lutea, tubulosa, parva, pubescens, basi dilatata. *Limbi lacinae* margine purpureae.

BACCA caeruleo-nigra, ovata, compressiuscula, umbilicata, calyce coronata.

SEMINA ovata, hinc convexa quinesulcata, inde plana.

HABITAT in *Andium* nemoribus imis ad *Cuchero* et *Chincho* tractus.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Corolla scissa cum staminibus. 2 Stamen. 3 Pistillum cum calyce. 4 Bacca calyce coronata. 5 Semina utrinque conspecta.

PSYCHOTRIA THYRSIFLORA. ICON. CCIV. Fig. b.

5. P. foliis lanceolatis glabris, stipulis vaginantibus sexdentatis, thyrsis terminalibus.

FRUTEX biorgyalis, glaber.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI brachiati, teretes: teneri obtusè tetragoni.

FOLIA opposita, petiolata, patentia, lanceolata, acuta, integerrima, carinata, venosa; venis alternis, inflexis.

PETIOLI semipollicares, supra leviter sulcati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, in vaginae formam truncatae, sexdentatae, denticulis utrinque tribus; intermedio ovato, obtuso, ciliato; lateralibus subulatis.

THYRSUS terminalis, ferè bipalmaris, subracemosus, compositus.



PEDUNCULI brachiati subdichotomique, bracteolis minimis, subulatis stipati.

CALYX minimus, quinquedentatus, lutescens.

COROLLA lutea, tubulosa, basi dilatata.

FILAMENTA coarctationi villosae tubi inserta. *Antherae* lineares, inclusae.

BACCA ovata, purpureo-nigra, umbilicata, calyce coronata.

SEMINA ovata, hinc convexa quinesulcata, inde plana laevia.

HABITAT in *Andium* nemoribus ad *Cuchero* runcationes.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Eadem scissa cum staminibus. 4 Pistillum cum calyce. 5 Bacca calyce coronata. 6 Semina.

*PSYCHOTRIA OBOVATA*. ICON. CCIV. Fig. a.

6. P. foliis obovatis acuminatis amplis, stipulis emarginatis, thyrsis terminalibus, corollis tubulosis.

PLANTA suffruticosa, triulnaris.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

RAMI brachiati, obtusè tetragoni; *teneri* quadrisulcati.

FOLIA opposita, patentia, ferè pedalia, ampla, petiolata, obovata, acuminata, integerrima, venosa: nervo et venis subtus pubescentibus: venis majoribus incurvis, intermediis suboppositis; reliquis alternis; minoribus interstinctis.

PETIOLI pollicares, supra parum sulcati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, oppositae, semiamplexicaules, basi in vaginae formam connatae, emarginatae; *laciniis* ovatis, obtusis, integris, intus glanduliferis.

THYRSI terminales, magni, compositi, subracemosi, rubicundi, leviter pubescentes.

PEDUNCULI patentes: *inferiores* oppositi, *reliqui* sparsi: *communes partialesque* bracteis subulatis, reflexis stipati.

FLORES breviter pedicellati.

CALYX minimus, quinquecrenatus, ciliatus.

COROLLA tubulosa, basi dilatata, purpurea, ad coarctationem tubi intus villosa.

FILAMENTA infra faucem inserta. *Antherae* inclusae.

BACCA globosa, umbilicata, calyce coronata, purpurea.

SEMINA hemisphaerica, hinc sulcata, inde laevia.

HABITAT in *Andium* nemoribus ad *Chinchao* et *Pillao*.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Corolla scissa cum staminibus. 2 Pistillum cum calyce.

*PSYCHOTRIA SULPHUREA*. ICON. CCV. Fig. a.

7. P. foliis obovato-cuneiformibus acuminatis, stipulis emarginatis, racemo paniculato, corollis infundibuliformibus.

PLANTA fruticosa, biorgyalis, glabra.

CAULIS erectus, ramosus, teres, cinereus.

RAMI brachiati, supernè foliosi, obtusè tetragoni.

FOLIA opposita, approximata, petiolata, obovato-cuneifor-

mia, acuminata, patentia, lutescentia, subcoriacea, ut plurimum bipalmaria, integerrima, venosissima; venis inflexis, alternis oppositisque.

PETIOLI breves, trilineares, supra canaliculati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, semiamplexicaules, ovatae, emarginatae, adpraessae, interius glanduliferae.

RACEMI terminales, paniculati, sesquipalmes, erecti.

PEDUNCULI multiflori; *inferiores* oppositi; *superiores* sparsi; *communes partialesque* tetragoni, compressi, bracteis subulatis stipati.

CALYX minimus, quinquecrenatus.

COROLLA infundibuliformis, sulphurei coloris. *Tubus* infra faucem villosus.

FILAMENTA ultra medium tubi inserta. *Antherae* lineares, corollae longitudine.

BACCA subrotunda, nigrescens, umbilicata, calyce coronata, piperis nigri magnitudine.

SEMINA hinc convexa quinesulcata, inde plana laevia.

HABITAT in *Andium* nemoribus frigidiusculis ad *Pillao* et *Iscutunam* tractus.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

Usus: Planta amarissima tincturam intensè luteam perpulchram praestat; ideoque Incolae ad gossypium lanasque inficiendas foliis ramulisque utuntur.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Bacca. 6 Semina utrinque visa. 7 Stipulae interius conspectae.

*PSYCHOTRIA ALBA*. ICON. CCV. Fig. b.

8. P. foliis lanceolatis, stipulis obovatis integerrimis striatis deciduis, racemo paniculato, corollis et baccis albis.

PLANTA fruticosa, biorgyalis, glabra.

CAULIS erectus, teres, parum ramosus.

RAMI patentes, obtusè tetragoni, in summitatibus foliosi.

FOLIA opposita, petiolata, lanceolata, acuta, integerrima, ad axillas venarum punctis excavatis.

PETIOLI ferè pollicares, supra plani.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, obovatae, crassiusculae, striatae, integerrimae, basi interiori hirsutae, deciduae, anulis hirsutis.

RACEMI terminales, paniculati, compositi, bipalmes.

PEDUNCULI gemini, multiflori; *exteriores* breviores, reflexi; *interiores* brachiati.

PEDICELLI dichotomi sparsique.

BRACTEAE ad basim pedunculorum et pedicellorum, ovatae, acutae, connatae.

CALYX minimus, quinquedentatus.

COROLLA alba, infundibuliformis. *Tubus* calyce multò longior. *Faux* hirsuta. *Limbus* quinquepartitus; *laciniis* ovato-lanceolatis, apice reflexis.

FILAMENTA infra faucem inserta. *Antherae* lineares, longitudine corollae.

BACCA ovalis, candida, pisi magnitudine.

SEMINA hinc convexa quinesulcata, inde plana laevia.



*HABITAT* in *Andium* montibus nemorosis per *Pozuzo*, *Mu-  
ña* et *Chinchao* tractus.

*FLORET* Junio, Julio et Augusto.

*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum  
staminibus. 4 Pistillum.

*PSYCHOTRIA CAPITATA.* ICON. CCVI. *Fig. a.*

9. *P.* foliis oblongis acuminatis, stipulis bifidis, floribus ca-  
pitatis sessilibus bracteis obvallatis.

PLANTA fruticosa, triularis.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

RAMI teneri, foliosi, obtusè tetragoni, compressiusculi.

FOLIA opposita, petiolata, oblonga, acuminata, nonnulla  
sublanceolata, integerrima, venosissima, subtus pubes-  
centia: *venis* alternis oppositisque, inflexis.

PETIOLI semipollicares, supra canaliculati.

STIPULAE supraxillares, interfoliaceae, magnae, adpressae,  
connatae, bifidae: *laciniis* ovatis, integerrimis, obtusis,  
deciduis; interius ad basim glanduliferae, hirsutae.

PEDUNCULI terminales, brachiati, compressi, pollicares,  
bracteis semilanceolatis acutis, basi concavis, suffulti.

PEDICELLI communes compressi, basi villis obvallati.

FLORES in capitulum, bracteis ovatis, acutis, integerrimis  
circumdatum, congesti, sessiles.

CALYX quinquedentatus: *denticulis* ovatis, acutis.

BACCA ovalis, umbilicata, calyce coronata, atra.

*HABITAT* in *Andium* montibus nemorosis per *Chinchao* run-  
cationes.

*FLORET* Junio, Julio et Augusto.

*Explic. Icon.* 1 Germen cum calyce. 2 Bacca calyce coro-  
nata. 3 Semina utrinque visa.

*PSYCHOTRIA CYMOSA.* ICON. CCVI. *Fig. b.*

10. *P.* foliis oblongo-lanceolatis acutis, stipulis utrinque  
bidentatis, cymis terminalibus, calycibus quinqueparti-  
tis longis.

PLANTA suffruticosa, ulnaris, glabra.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

RAMI brachiati: *teneri* compressiusculi, obtusè tetragoni.

FOLIA opposita, petiolata, ut plurimum bipalmaria, oblon-  
go-lanceolata, acuta, integerrima, supra nitida, venosa,  
venis alternis, rarissimis oppositis.

PETIOLI breves, leviter canaliculati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, oppositae, semiam-  
plexicaules, truncatae, brevissimae, utroque latere den-  
ticulo subulato, interius ad basim glanduloso.

CYMAE terminales, breves, 20-30 florum, violaceae.

PEDUNCULI compressi, striati, bracteolis subulatis stipati.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* subulatis, longis, patulis.

COROLLA violaceo-purpurea. *Tubus* prope basim villosus.

BACCA ovalis, coronata, violacea, umbilicata.

SEMINA hinc convexa quinesulcata, inde plana laevia.

*HABITAT* in *Andium* nemoribus, imis calidis, versùs *Pi-*

*llao* ad *Chacahuassi* et *Pampamarca* tractus.

*FLORET* Junio, et Julio.

*Explic. Icon.* 1 Germen cum calyce. 2 Bacca cum calyce.  
3 Semina utrinque aspecta.

*PSYCHOTRIA VILLOSA.* ICON. CCVII. *Fig. a.*

11. *P.* foliis oblongo-obovatis hirsutis, stipulis ovatis acu-  
tis deciduis, paniculâ racemosâ brachiatâ.

PLANTA fruticosa, biorgyalis, villosa: villis rubro-ferru-  
gineis.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI brachiati, teretes, ad articulationes pilis rubris cinē-  
ti: *juniores* obtusè tetragoni, sulcati.

FOLIA opposita, petiolata, oblongo-obovata, acuminata, in-  
tegerrima, venosa, venis alternis inflexis.

PETIOLI trilineares, supra plani, leviter sulcati.

STIPULAE oppositae, interfoliaceae, supraxillares, ovatae,  
acutae, caducae.

PANICULA brachiata, subracemosa.

PEDICELLI bracteis marginalibus, acuminatis, minimis suf-  
fulti.

CALYX minimus, quinquedentatus.

BACCA rubra, globosa, depressiuscula, calyce coronata, um-  
bilicata, piperis nigri magnitudine.

SEMINA hinc convexa quinesulcata, inde plana laevia.

*HABITAT* in *Andium* montibus nemorosis ad *Chinchao* et  
*Cuchero* runcationes.

*FLORET* Majo, et Junio.

*Explic. Icon.* 1 Bacca calyce coronata. 2 Semina utrinque  
conspecta.

*PSYCHOTRIA FOVEOLATA.* ICON. CCVII. *Fig. b.*

12. *P.* foliis lanceolatis subtus ad apicem nervi foveolis  
quatuor, stipulis obovatis caducis, paniculâ in fructu  
cernuâ.

PLANTA fruticosa, triorgyalis, glabra.

CAULIS erectus, ramosissimus, teres.

RAMI patentes: *teneri* obtusè tetragoni, foliosi.

FOLIA opposita, petiolata, lanceolata, acuta, integerrima,  
venosa, venis incurvis, subtus versus apicem nervi fo-  
veolis quatuor oblongis ad ortum venarum.

PETIOLI semipollicares, supra sulcati.

STIPULAE oppositae, supraxillares, interfoliaceae, obova-  
tae, adpressae, integerrimae, caducae.

PANICULA terminalis, subracemosa, in flore erecta, in fruc-  
tu cernua.

PEDUNCULI brachiati, gemini, exteriores breviores, refle-  
xi, bracteolis minimis, ovatis, connatis stipati.

FLORES sessiles, terni, quaterni, quini, aut seni.

CALYX minimus, quinquedentatus.

COROLLA parva, albo-lutea.

BACCA subrotunda, umbilicata, calyce coronata, rubicun-  
da, piperis nigri magnitudine.



SEMINA hinc convexa quinesulcata, inde plana laevia.

HABITAT in *Andium* nemoribus ad *Chinchao* et *Cuchero* tractus.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Bacca calyce coronata. 2 Semina utrinque visa.

PSYCHOTRIA MITIS. ICON. CCVIII. Fig. b.

13. P. foliis lanceolatis supra mitibus subtus glabris, stipulis anularibus emarginatis, racemis subpaniculatis terminalibus.

PLANTA fruticosa, biorgyalis.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI erecti, teretes; teneri obtusè tetragoni, sulcati.

FOLIA opposita, petiolata, lanceolata, acuta, integerrima, subtus glabra, supra mitissima, venosa; venis alternis oppositisque, incurvis, approximatis; minoribus interstinctis.

PETIOLI bilineares, supra canaliculati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, oppositae, adpressae, anulares, basi connatae, emarginatae, petiolis duplò breviores.

RACEMI terminales, sesquipalmes, ferè paniculati, multiflori.

PEDUNCULI brachiati, tetragoni, sulcati, compressiusculi: communes partialesque bracteis subulatis suffulti.

FLORES sessiles, bracteolis stipati.

CALYX minimus, quinquedentatus.

COROLLA infundibuliformis, lutea, fauce hirsuta.

FILAMENTA infra faucem inserta, brevissima. Antherae lineares, corollà breviores.

GERMEN umbilicatum.

HABITAT in *Andium* nemoribus versùs *Pillao* ad *Chahuassi* tractus.

FLORET Augusto, et Septembri.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Stamen. 5 Pistillum.

PSYCHOTRIA PILOSA. ICON. CCVIII. Fig. a.

14. P. foliis oblongo-obovatis acutis pilosis, stipulis semilanceolatis bifidis, floribus terminalibus cymosis.

PLANTA suffruticosa, bipedalis, pilosa.

CAULIS vix ramosus, tetragonus, supernè sulcatus.

RAMI consimiles.

FOLIA opposita, petiolata, oblongo-obovata, acuta, integerrima, subtus venosa; venis alternis incurvis.

PETIOLI ferè pollicares, supra parum sulcati.

STIPULAE oppositae, interfoliaceae, supraxillares, erectae, longitudine petiolorum, semilanceolatae, ad medium bifidae; laciniis acutis, basi connatae.

CYMAE terminales, breves, bracteis lanceolatis, acutis undique cinctae, caeruleae.

PEDUNCULI graciles, densè pilosi.

CALYCES quinquedentati; denticulis acutis.

BACCA caerulea, calyce coronata, parvi pisi magnitudine.

HABITAT in *Andium* nemoribus locis humidis in *Cuchero* circuitu.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Bacca calyce coronata. 2 Semina.

PSYCHOTRIA VIRGATA. ICON. CCIX. Fig. a.

15. P. foliis oblongis acuminatis coriaceis venosissimis, stipulis bilobis profundè emarginatis, corymbis terminalibus.

FRUTEX triulnaris, glaber, valde amarus.

CAULIS erectus, teres, cinereus, ramosissimus.

RAMI virgati, erecti, albicantes: teneri foliosi, purpurascens, obtusè quadrangulares.

FOLIA opposita, petiolata, approximata, oblonga lanceolataque, acuminata, integerrima, coriacea, venosissima, venis alternis oppositisque inflexis; minoribus reticulatis; nervo rubicundo; marginibus reflexis.

PETIOLI bilineares, supra sulcati.

STIPULAE oppositae, supraxillares, interfoliaceae, longitudine petiolorum, semiamplexicaules, adpressae, bilobae; lobis obtusis, rotundatis; interius ad basim glandulosae.

CORYMBI terminales, breves, multiflori.

PEDUNCULI brachiati: communes partialesque tetragoni, compressiusculi, striati, bracteis subulatis stipati.

FLORES sessiles, congesti.

CALYX minimus, quinquedentatus.

COROLLA infundibuliformis, sulphurei coloris. Faux hirsuta.

STAMINA inclusa.

BACCA ovalis, obscurè caerulea, ciceris magnitudine, calyce coronata, umbilicata.

SEMINA hinc quinesulcata, inde plana laevia.

HABITAT in *Andium* montibus altis nemorosis frigidis versùs *Pillao* et *Muña* ad *Sircai* et *Saria*.

FLORET Augusto, et Septembri.

USUS: Folia exsiccata lutescentia colorem sulphureum speciosum, uti reliquae partes fruticis, praebent.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Corolla scissa stamina ostendens. 3 Stamina. 4 Bacca. 5 Semina utrinque conspecta.

PSYCHOTRIA TRIFIDA. ICON. CCIX. Fig. b.

16. P. foliis lanceolatis acuminatis, stipulis bifidis acutis, pedunculis axillaribus terminalibusque trifidis trifloris.

FRUTEX quinqueulnaris.

CAULIS erectus, teres, ramosissimus, obscurè viridis.

RAMI brachiati: teneri obtusè tetragoni.

FOLIA opposita, petiolata, angusta, palmaria, lanceolata, acuminata, integerrima, supra nitida, subtus per nervum et venas pubescentia, venosa; venis inflexis.

PETIOLI semipollicares, supra canaliculati.

STIPULAE oppositae, interfoliaceae, supraxillares, basi connatae, bifidae: laciniis acutis; interius ad basim glanduliferae.



PEDUNCULI terminales et ex axillis superioribus, trifidi, bracteolis subulatis stipati, compressi.

PEDICELLI laterales triflori, intermedius sexflorus.

FLORES sessiles, bracteolis minimis sustentati.

CALYX minimus, quinquedentatus.

COROLLA infundibuliformis, parva, leviter pubescens, limbo erecto. *Faux* hirsuta.

FILAMENTA infra faucem inserta. *Antherae* lineares, corollâ breviores.

BACCA nigra, coronata, umbilicata, subrotundo-turbinata.

SEMINA hinc convexa quinesulcata, inde plana laevia.

HABITAT in *Peruviae Andium* montibus nemorosis inter *Acomayo* vicum et *Carpis* collem.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Corolla scissa stamina ostendens. 3 Pistillum. 4 Bacca. 5 Semina utrinque conspecta.

*PSYCHOTRIA SUBTOMENTOSA*. ICON. CCX. Fig. a.

17. P. foliis lanceolato-oblongis, stipulis bifidis acutis, pedunculis terminalibus trifidis, floribus capitatis caeruleis.

PLANTA fruticosa, pubescens, biulnaris.

CAULIS erectus, teres, ramosissimus, infernè glaber.

RAMI obtusè tetragoni; *teneri* subtomentosi.

FOLIA opposita, petiolata, lanceolato-oblonga, acuta, integerrima, subtomentosa, subtus canescentia, venosa: venis inflexis.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, basi connatae, bifidae; laciniis acutis, interius glanduliferae.

PEDUNCULI terminales, trifidi; *partiales* bracteis subulatis sustentati.

FLORES sessiles, congesti.

CALYX minimus, quinquedentatus, caeruleus.

COROLLA infundibuliformis, caerulea, hirsuta.

HABITAT in *Peruviae Andium* montibus nemorosis ad *Chinchao*, *Mesapata* et *Maychainio* runcationes.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Flos integer.

*PSYCHOTRIA REPANDA*.

18. P. foliis lanceolatis repandis, stipulis lanceolatis ciliatis, pedunculis paniculato-racemosis, floribus sessilibus.

FRUTEX biorgyalis, glaber.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

RAMI teretes, supernè foliosi, obsoletè tetragoni.

FOLIA opposita, petiolata, lanceolata oblongo-lanceolataque, repanda, integerrima.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, oppositae, basi connatae, lanceolatae, dorso marginibusque ciliatis, caducae.

RACEMI terminales, compositi, bipalmes.

PEDUNCULI brachiati: *communes* et *partiales* compressi, bracteolis ovatis, acutis, parvis stipati.

FLORES sessiles, parvi.

CALYX quinquedentatus, minimus.

Tom. II.

COROLLA minima, lutea. *Faux* villosa.

BACCA purpurea, piperis nigri magnitudine.

SEMINA hinc convexa sulcata, inde plana laevia.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus per *Cuchero* et *Chinchao* runcationes.

FLORET Junio, et Julio.

*PSYCHOTRIA VIRIDIS*. ICON. CCX. Fig. b.

19. P. foliis oblongis acuminatis dorso foveolatis, stipulis lanceolatis, racemis subpaniculatis, corollis viridibus.

PLANTA frutescens, biulnaris, glabra.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

RAMI teretes, supernè obsoletè tetragoni, compressiusculi.

FOLIA opposita, petiolata, oblonga, breviter acuminata, integerrima, venosa, venis ad basim foveolatis inflexis.

PETIOLI breves, canaliculati.

STIPULAE supraxillares, interfoliaceae, oppositae, connatae, lanceolatae, magnae, petiolis duplò longiores, caducae.

RACEMI terminales, subpaniculati, sesquipalmes.

PEDUNCULI brachiati, tetragoni, compressiusculi.

FLORES parvi, sessiles, congesti.

CALYX minimus, quinquedentatus.

COROLLA parva, infundibuliformis, viridis. *Faux* hirsuta.

FILAMENTA infra faucem inserta. *Antherae* inclusae.

BACCA globosa, parvi pisi magnitudine.

SEMINA hinc convexa quinesulcata, inde plana laevia.

HABITAT in *Peruviae Andium* montibus imis nemorosis per *Chinchao* et *Macora* tractus.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Corolla. 2 Eadem scissa stamina ostendens. 3 Stamen auctum. 4 Pistillum.

*PSYCHOTRIA LAXA*. ICON. CCXII. Fig. b.

20. P. foliis oblongis acuminatis, stipulis bifidis, paniculis laxis, bracteis longis reflexis, corollis viridibus.

PLANTA fruticosa, glaberrima, triulnaris.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI brachiati, tetragoni, sulcati, compressiusculi, nitidi.

FOLIA opposita, petiolata, tripalmaria, oblonga, acuminata, integerrima, exsucca, supra nitida, venosa: *venis majoribus* incurvis; *minoribus* interstinctis.

PETIOLI semipollicares, supra leviter canaliculati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, oppositae, breves, bifidae: *laciniis* ovatis, obtusis.

PANICULA longa, laxa, in flore erecta, in fructu dependens.

PEDUNCULI et *Pedicelli* brachiati, compressiusculi, striati, bracteis lanceolatis, longis, deflexis, viridibus stipati.

CALYX minimus, quinquedentatus.

COROLLA luteo-virescens, infundibuliformis, tenuis.

FILAMENTA infra medium tubi inserta. *Antherae* lineares.

BACCA purpureo-virescens, ovata, subdidyma, calyce coronata, pisi magnitudine.



SEMINA hinc convexa sulcata, inde plana laevia.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus ad *S. Antonii de Playa grande* vicum, unde Tafalla iconem et descriptionem nobiscum communicavit.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem scissa cum staminibus. 5 Pistillum. 6 Bacca. 7 Semina utrinque visa.

*PSYCHOTRIA PUNICEA*. ICON. CCXII. Fig. a.

21. P. foliis oblongo-lanceolatis, acutis, stipulis truncatis bidentatis, corymbis puniceis, corollis urceolatis.

PLANTA frutescens, orgyalis, glabra.

CAULIS erectus, teres, ramosus.

RAMI consimiles, rubicundi.

FOLIA opposita, petiolata, oblongo-lanceolata, acuta, undulata, integerrima, tripalmaria, utrinque nitida, venosa, venis incurvatis.

PETIOLI semipollicares, canaliculati.

STIPULAE supraxillares, interfoliaceae, truncatae, utrinque bidentatae: *denticulis* subulatis, petiolo brevioribus, erectis.

CORYMBI terminales, breves, multiflori, punicei.

PEDUNCULI compressiusculi, striati, bracteolis subulatis ad medium et ad eorum basim insertis.

FLORES breviter pedicellati, congesti.

CALYX minimus, quinquecrenatus.

COROLLA punicea, urceolata. *Limbus* brevis; *laciniis* ovatis, acutis.

FILAMENTA medio tubi inserta. *Antherae* lineares, inclusae.

BACCA subrotunda, coronata, utrinque sulcata, ferè didyma.

SEMINA hinc convexa sulcata, inde plana laevia.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus ad *Sancti Antonii de Playa grande* vicum, unde Tafalla iconem et descriptionem nobis missit.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Corolla. 3 Eadem scissa stamina ostendens. 4 Pistillum. 5 Bacca.

*PSYCHOTRIA HYACINTHIFLORA*. ICON. CCXIII. Fig. a.

22. P. foliis obovatis acuminatis amplis, stipulis bifidis, racemis compositis purpureis, floribus violaceis.

PLANTA fruticosa, biorgyalis, glabra.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI consimiles, supernè obtusè tetragonales.

FOLIA opposita, petiolata, ampla, ferè bipalmaria, obovata, acuminata, integerrima, parum undulata, valde venosa: venis horizontalibus, subinflexis.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, oppositae, bifidae: *laciniis* ovatis, obtusis.

RACEMI terminales, magni, compositi.

PEDUNCULI patulo-reflexi: *inferiores* brachiati; *superiores* sparsi.

BRACTEA parva, ovata sub singulis pedunculis et pedicellis.

CALYX minimus, quinqueidentatus, persistens, violacei coloris.

COROLLA violacea, infundibuliformis, basi fauceque dilatata. *Limbus* quinquepartitus, reflexus.

FILAMENTA coarctationi tubi inserta. *Antherae* lineares, intra faucem inclusae, luteae.

GERMEN umbilicatum.

STYLUS limbi ferè longitudine. *Stigma* bilobum: *lobis* patulo-reflexis.

BACCA violaceo-caerulea, subrotundo-ovata, calyce coronata.

SEMINA hinc convexa sulcata, inde plana laevia.

HABITAT in *Andium* nemoribus imis calidis, ad *Chicoplaya* tractus, unde Tafalla iconem missit.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Bacca. 6 Eadem transversim secta. 7 Semina utrinque visa.

*PSYCHOTRIA CAERULEA*. ICON. CCXIII. Fig. b.

23. P. foliis lanceolatis acutis, stipulis ovatis, racemis terminalibus, floribus aggregatis, baccis caeruleis.

FRUTEX biorgyalis, glaber.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI patentes, teretes, flexuosi, supernè obsoletè tetragoni.

FOLIA opposita, petiolata, patenti-deflexa, lanceolata, acuta, integerrima, undulata, venosa, 2-3 palmaria.

PETIOLI breves, supra vix canaliculati.

STIPULAE supraxillares, interfoliaceae, oppositae, petiolis dimidiò breviores, ovatae, integerrimae.

RACEMI terminales, bipalmares, compositi.

PEDUNCULI brachiati, bracteis ovatis sustentati.

FLORES aggregati, sessiles, plures decidui.

CALYX minimus, quinqueidentatus.

COROLLA infundibuliformis, semipollicaris, lutescens. *Limbus* revolutus.

FILAMENTA infra medium tubi inserta, breviter. *Antherae* inclusae.

STYLUS longitudine staminum. *Stigma* bilobum, erectum.

BACCA turbinata, caerulea, parvi ciceris magnitudine.

SEMINA parva, hinc convexa sulcata, inde plana laevia.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus imis calidis, ad *Vitoc* vicum, unde Tafalla iconem nobiscum communicavit.

FLORET Majo, Junio et Julio.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Pistillum cum calyce. 3 Corolla. 4 Eadem scissa, stamina ostendens. 5 Bacca. 6 Semina utrinque conspecta.

*PSYCHOTRIA TINCTORIA*. ICON. CCXI. Fig. a.

24. P. foliis oblongis acutè acuminatis, foveolis ad basim venarum, stipulis lanceolatis, racemis brevibus brachiatis.



FRUTEX triorgyalis, glaber.

CAULIS erectus, teres, ramosissimus.

RAMI teretes: *teneri* foliosi, obsoletè tetragoni.

FOLIA opposita, petiolata, patentia, oblonga, acutè acuminata, parum undulata, integerrima, supra nitida, in axillis venarum foveolata.

PETIOLI semipollicares, canaliculati.

STIPULAE supraxillares, interfoliaceae, oppositae, basi connatae, semilanceolatae, integerrimae, ad basim intus glanduliferae.

RACEMUS terminalis, palmaris.

PEDUNCULI brachiati: *communes* et *partiales* obtusè tetragoni, bracteis parvis, ovatis, acutis stipati.

FLORES sessiles, terni.

CALYX minimus, quinquedentatus, lutescens.

COROLLA albo aut luteo-rubescens. *Faux* hirsuta. *Limbus* revolutus.

FILAMENTA basi hirsuta. *Antherae* inclusae.

STYLUS longitudine corollae. *Stigma* bilobum.

BACCA subrotunda, umbilicata, rubicunda.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus ad *Macora* et *Mesapata* runcationes.

FLORET Augusto, Septembri et Octobri.

USUS: Folia tincturam luteam perpulchram suppeditant. Incolae lintea, lanas et gossypium eo colore imbuunt.

Explic. Icon. 1 Corolla scissa stamina ostendens. 2 Pistillum.

#### PSYCHOTRIA MACROPODA. ICON. CCXI. Fig. b.

25. P. foliis cordatis acutis glabris, stipulis ovatis, umbellis tri-sexfloris, seminibus laevibus.

PLANTA herbacea, repens, glabra.

CAULIS horizontalis, filiformis, angulatus, stolonifer.

FOLIA opposita, longè petiolata, erecta, cordata, acuta, integerrima, venosa, venis inferioribus ad basim coeuntibus.

PETIOLI foliis quadruplò longiores, asperiusculi, striati; *juniores* pubescentes.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, oppositae, ovatae, integerrimae, deciduae.

PEDUNCULI longitudine foliorum, striati, 3-6flori.

FLORES sessiles, capitato-umbellati, bracteis totidem linearilanceolatis, persistentibus involucriati.

CALYX quinquepartitus: *laciniis* subulatis, apice reflexis, persistentibus.

COROLLA infundibuliformis. *Limbus* quinquefidus, patens.

BACCA ovalis, ciceris magnitudine, purpureo-atra, disperma.

SEMINA ovata, laevia.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus secùs *Pillao* ad *Iscutunam* tractum.

FLORET Septembri, et Octobri.

Obs. *Psychotriae herbaceae* Jacquinii maxime affinis.

Explic. Icon. 1 Bacca. 2 Semina utrinque conspecta.

#### PSYCHOTRIA GRACILIS. ICON. CCXI. Fig. c.

26. P. foliis cordatis acutis supra pilosiusculis, stipulis ovatis, umbellis 6-9floris, seminibus sulcatis.

PLANTA herbacea, repens.

RADIX fibrosa, tenuis.

CAULIS horizontalis, stolonifer, filiformis, gracilis, striatus.

FOLIA opposita, erecta, petiolata, cordata, acuta, integerrima, supra pilosiuscula, venosa, venis inferioribus, basi coeuntibus.

PETIOLI foliis ferè duplò longiores, striati.

STIPULAE interfoliaceae, oppositae, supraxillares, ovatae, acutae, integerrimae, patulae, membranaceae, ad basim glandulosae.

PEDUNCULI terminales, erecti, striati, petiolorum longitudine, 6-9flori.

FLORES breviter pedicellati, umbellati, bracteis totidem inaequalibus, subulatis stipati.

CALYX quinquepartitus; *laciniis* linearilanceolatis, longis, reflexis.

COROLLA dilutè violacea, infundibuliformis, intus glabra.

FILAMENTA infra faucem inserta. *Antherae* lineares, inclusae.

BACCA ovata, coronata, nigrescens, piperis nigri magnitudine, disperma.

SEMINA hinc convexa trisulcata, inde plana laevia.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Pillao* et *Pueblo nuevo* tractus.

FLORET Augusto, et Septembri.

Obs. *Psychotriae violaceae* AUB. *Guian.* vol. 1. p. 145. tab. 55. valde affinis.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus scissa. 4 Pistillum. 5 Bacca. 6 Semina utrinque visa.

#### COFFEA. LINN. Gen. plant. pag. 126.

##### CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* superum, minimum, crescens, quinque-dentatum: *denticulis* deciduis.

COR. infundibuliformis. *Tubus* calyce multò longior, supernè parum dilatatus. *Limbus* quinquepartitus; *laciniis* linearilanceolatis, longis, lateraliter revolutis.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, infra faucem corollae inserta, patentia, basi villosa, limbi ferè longitudine. *Antherae* incumbentes, recurvatae, oblongae, basi bifidae, biloculares.

PIST. *Germen* subrotundum, umbilicatum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigmata* duo, oblonga, crassiuscula, patula.

PER. *Bacca* ovalis, umbilicata, unilocularis, 1-2perma, basi calycis plerumque coronata.

SEM. elliptico-hemisphaerica, hinc convexa laevia, rarius sulcata, inde plana, cornea, epidermide callosâ tecta.

Obs. 1. Genus *Psychotriae* valde affine.



*Obs. 2. Coffea ciliata* plures flores quadrifidos tetrandros profert. *Coffea acuminata* et *subsessilis* Baccam monospermam habent.

#### HABITUS.

*Frutices* erecti. *Caules* teretes. *Rami* brachiati, plerumque dichotomi, articulationibus dilatati, compressiusculi, stipulis aut earum basibus vaginati. *Folia* opposita, integerrima. *Petioles* stipulis extus adnati. *Stipulae* interfoliaceae, oppositae, in vaginae formam connatae, deciduae. *Racemi* terminales axillaresque, compositi. *Pedunculi* brachiato-decussati, bracteis parvis suffulti. *Flores* capitato-umbellati, subsessiles aut sessiles. *Corollae* albae. *Baccae* rubrae.

#### COFFEA RACEMOSA. ICON. CCXIV. Fig. a.

1. *C. foliis* oblongo-ovalibus acuminatis, stipulis bifidis, racemis axillaribus terminalibusque in flore nutantibus.  
*FRUTEX* triorgyalis, glaber.  
*CAULIS* erectus, ramosus, teres.  
*RAMI* patentes, plerumque dichotomi, compressi, geniculati.  
*FOLIA* opposita, petiolata, bipalmaria, oblongo-ovalia, acuminata, integerrima, venosa: venis alternis, inflexis.  
*PETIOLES* pollicares, semiteretes, stipulis extus adnati.  
*STIPULAE* oppositae, interfoliaceae, bifidae, acutae, caducae, ad ipsarum axillas setis pluribus crassiusculis, glandulaeformibus.  
*RACEMI* axillares terminalesque, brachiati, in flore nutantes, in fructu erecti.  
*PEDUNCULI* tetragoni, compressiusculi, articulati.  
*FLORES* subsessiles, congesti, bracteis minimis, acutis, deciduis suffulti.  
*CALYX* quinquedentatus, albo-virescens, in fructu deciduus.  
*COROLLA* alba, quinquefida: *laciniis* revolutis.  
*FILAMENTA* basi hirsuta, corollae longitudine. *Antherae* luteae.  
*BACCA* ovalis, monosperma dispermaque, cerasi magnitudine et colore, calycis vestigio notata.  
*SEMINA* hemisphaerica, laevia.  
*HABITAT* in nemoribus *Pati* et *Macora*.  
*FLORET* Junio, Julio et Augusto.  
*VULGO*: *Caffè*, ex quo plantae cognitionem et usum Incolis impertiti sumus anno 1785, et ab eo tempore colitur in *Chinchao Quebrada* praediis.  
*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Corolla scissa, stamina ostendens. 3 Pistillum. 4 Bacca. 5 Semina utrinque conspecta.

#### COFFEA ACUMINATA. ICON. CCXIV. Fig. b.

2. *C. foliis* ovalibus acuminatis ad axillas venarum villosis, stipulis caducis, racemis paucifloris.

*FRUTEX* biorgyalis, glaber.

*CAULIS* erectus, ramosus, teres, subcinereus.

*RAMI* dichotomi, tetragoni, compressiusculi, subhelvoli coloris.

*FOLIA* opposita, petiolata, ovalia, acuminata, acumine lineari, integerrima, venosa, ad axillas venarum villosa.

*PETIOLES* semipollicares, leviter canaliculati, stipulis adnati.

*STIPULAE* interfoliaceae, supraxillares, ovatae, acutae, caducae, integerrimae, breves.

*RACEMI* terminales, breves, pauciflori.

*PEDUNCULI* brachiato-decussati, articulati: *superiores* oppositi: *inferiores* quaterni: omnes bracteolis minimis stipati.

*FLORES* congesti, subsessiles.

*CALYX* minimus, quinquedentatus; *denticulis* deciduis.

*COROLLA* alba. *Limbus* revolutus.

*STAMINA* corollae ferè longitudine.

*BACCA* ovalis, monosperma, rubra, cerasi magnitudine, umbilicata, basi calycis tubulosâ coronata.

*SEMEN* ovale, laeve, epidermide callosâ tectum.

*HABITAT* in *Peruviae Andium* nemoribus ad *Chinchao Quebrada* runcationes.

*FLORET* Majo, et Junio.

*Explic. Icon.* 1 Semen.

#### COFFEA SUBSESSILIS. ICON. CCXV. Fig. a.

3. *C. foliis* oblongo-lanceolatis acuminatis basi excavatis, stipulis ovatis, racemis axillaribus.  
*FRUTEX* biorgyalis, glaber.  
*CAULIS* erectus, teres, ramosus.  
*RAMI* dichotomi, tetragoni, compressi, lutescentes.  
*FOLIA* opposita, subsessilia, ferè pedalia, oblongo-lanceolata, acuminata, basi excavata, in cordaturae formam, integerrima, coriacea, obliqua, supra nitida, venosissima, reticulata, venis majoribus subhorizontalibus.  
*PETIOLES* brevissimi, stipulis adnati.  
*STIPULAE* interfoliaceae, supraxillares, in vaginae formam connatae, ovatae, acuminatae, deciduae.  
*RACEMI* axillares, solitarii.  
*PEDUNCULI* brachiato-decussati, tetragoni, compressi, articulati.  
*BACCA* ovalis, monosperma, basi calycis tubulosâ coronata, primum rubra, demum obscuro-violacea, cerasi magnitudine.  
*SEMEN* globosum, laeve, corneâ consistentiâ, epidermide callosâ tectum.  
*HABITAT* in *Peruviae Andium* nemoribus ad *Chinchao Quebrada* et *Pati* tractus.  
*FLORET* Januario, Febuario et Martio.  
*Explic. Icon.* 1 Semen.

#### COFFEA UMBELLATA. ICON. CCXV. Fig. b.

4. *C. foliis* oblongis acuminatis, venis transversalibus nu-



merosis, stipulis subrotundis, pedunculis umbellatis.

FRUTEX biorgyalis, glaber.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI plerumque dichotomi, obtusè tetragoni, compressiusculi.

FOLIA opposita, petiolata, oblonga, acuminata, acumine subulato, integerrima, coriacea, densè venoso-lineata: *venis* horizontalibus, nervo subtus utrinque marginato, lutescente.

PETIOLI trilineares, leviter sulcati, stipulis adnati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, in vaginae formam connatae, subrotundae, acuminatae, integerrimae.

PEDUNCULI axillares terminalesque, umbellati, quaterni, involucrati.

PEDICELLI septemflori, involucrati.

INVOLUCRUM *universale* tetraphyllum; *partiale* heptaphyllum; *foliolis* ovatis, acutis.

FLORES sessiles, congesti.

CALYX campanulatus, quinquefidus; *laciniis* ovatis, obtusis.

COROLLA alba, infundibuliformis. *Limbus* 5partitus, patens.

FILAMENTA basi hirsuta, fauci inserta. *Antherae* corollae ferè longitudine, luteae.

BACCA ovalis, disperma, rubra, basi calycis tubulosâ coronata.

SEMINA hinc convexa sulcata, epidermide callosâ tecta.

HABITAT in *Andium* nemoribus ad *Cuchero* et *Chinchao Quebrada*.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Calyx. 2 Corolla. 3 Eadem scissa cum staminibus. 4 Pistillum. 5 Semina.

COFFEA CILIATA. ICON. CCXVI. Fig. a.

5. C. foliis oblongis acuminatis, stipulis truncatis, ciliis obvallatis, racemis terminalibus.

FRUTEX biorgyalis, glaber.

CAULIS erectus, patulus, ramosus, teres, cinereo-fuscus.

RAMI dichotomi, obsoletè tetragoni, articulationibus incrassati, vestigiis stipularum velut vaginati: *teneri* foliosi, compressiusculi, cinerei.

FOLIA opposita, petiolata, oblonga, acuminata, integerrima, venosissima: *venis* incurvis.

PETIOLI bilineares, leviter sulcati.

STIPULAE interfoliaceae, truncatae, breves, vaginantes, membranaceae, ciliis longioribus subulatis, caducis obvallatae, marcescentes.

RACEMI terminales, palmares, cernui.

PEDUNCULI brachiati, articulati, in fructu decussati: *communnes* et *partiales* bracteolis subulatis, parvis stipati.

FLORES aggregati, sessiles, totidem bracteis subulatis suffulti.

CALYX quadri-quinquepartitus: *laciniis* subulatis.

COROLLA alba, infundibuliformis, 4-5 fida: *laciniis* revolutis. *Faux* hirsuta.

Tom. II.

FILAMENTA 4-5, fauci inserta. *Antherae* incumbentes, corollae longitudine.

BACCA subrotunda, rubra, disperma, vestigio calycis notata.

SEMINA epidermide tenui, laevi involuta.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus, inter *Chinchao* et *Acomayo* vicos ad *Carpis* et *Pati* tractus.

FLORET Junio, Julio et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa stamina ostendens. 4 Pistillum. 5 Bacca. 6 Semina.

COFFEA FOVEOLATA. ICON. CCXVI. Fig. b.

6. C. foliis oblongo-ovalibus acute acuminatis, foveolis ad basim venarum, stipulis ovatis, racemis terminalibus.

FRUTEX triorgyalis, glaber.

CAULIS erectus, teres, ramosus, fusco-cinereus.

RAMI brachiati, plerumque dichotomi, obtusè tetragoni, cinerei: *teneri* compressi.

FOLIA opposita, remota, petiolata, horizontalia, plana, oblongo-ovalia, nonnulla oblongo-obovata, acute acuminata, integerrima, venosa, supra nitida, bipalmaria, venis ad basim foveolatis inflexis.

PETIOLI semipollicares, supra leviter sulcati.

STIPULAE supraxillares, interfoliaceae, semicirculares, apice dorso glandulifero, adpressae, in vaginae formam connatae, deciduae, breves.

RACEMI terminales, palmares, compositi.

PEDUNCULI et *Pedicelli* brachiato-decussati, tetragoni, compressi, bracteolis minimis subulatis stipati.

FLORES sessiles, bini ternique.

CALYX minimus, quinquedentatus, denticulis acutis.

COROLLA alba, extus dilute purpurea, infundibuliformis, trilinearis. *Faux* hirsuta. *Limbus* quinquepartitus; *laciniis* revolutis.

FILAMENTA fauci corollae inserta. *Antherae* incumbentes, lineares, basi bifidae, altitudine ferè corollae, recurvatae.

BACCA subrotunda, utrinque depressa, ciceris magnitudine, rubra, disperma, calyce obsoleto coronata.

SEMINA subreniformia, laevia, epidermide callosâ tecta.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus per *Chinchao Quebrada* ad *Mesapata* et *Pueblo nuevo*.

FLORET Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa stamina ostendens. 4 Pistillum. 5 Bacca. 6 Semina.

COFFEA NITIDA. ICON. CCXVII. Fig. a.

7. C. foliis oblongis obtusè acuminatis nitidis, stipulis truncatis ciliatis, racemis terminalibus.

FRUTEX triulnaris, glaber.

CAULIS erectus, teres, supernè ramosus, dilute fuscus.

RAMI patentes, subdichotomi, obsoletè tetragoni, articulationibus incrassati, vaginati: *teneri* compressi.

FOLIA opposita, petiolata, sesquipalmaria, patenti-reflexa,

R



oblonga, nonnulla oblongo-obovata, acumine brevi obtuso, integerrima, venosa, subcoriacea, supra nitidissima. PETIOLI bilineares, supra canaliculati.

STIPULAE oppositae, supraxillares, interfoliaceae, semicirculares, breves, integerrimae, in vaginae formam, extus glandulis linearibus albicantibus, caducis cinctae.

RACEMI terminales, palmares, compositi.

PEDUNCULI in flore brachiati, in fructu decussati: *communes* et *partiales* compressi, bracteis minimis, ciliatis stipati.

FLORES sessiles, aggregati.

CALYX minimus, quinquedentatus.

COROLLA alba, infundibuliformis, trilinearis, fauce hirsuta.

STAMINA inclusa.

BACCA pisi magnitudine, calyce coronata, disperma, rubra.

SEMINA extus laevia, epidermide callosa obvoluta.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus ad *Muña* et *Chicoplaya* tractus.

FLORET Junio, et Julio.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem scissa cum staminibus. 5 Pistillum. 6 Bacca. 7 Semina utrinque vissa.

#### COFFEA VERTICILLATA. ICON. CCXVII. Fig. b.

8. C. foliis oblongo-lanceolatis obovatisque acuminatis, stipulis ovatis ciliatis, racemis terminalibus verticillatis.

FRUTEX triorgyalis, glaber.

CAULIS erectus, teres, supernè ramosus, fusi coloris.

RAMI brachiati, plerumque dichotomi, teretes, articulationibus incrassati, stipularum basibus vaginati: *teneri* compressiusculi, foliosi.

FOLIA opposita, patentia, oblongo-lanceolata, nonnulla obovata, acuminata, integerrima, venosa: *venis majoribus* alternis incurvis: *minoribus* interstinctis: *majora* bipalmaria.

PETIOLI ferè pollicares, supra leviter sulcati.

STIPULAE interfoliaceae, supraxillares, oppositae, ovatae, ciliatae, deciduae.

RACEMI terminales, sesquipalmares, in flore cernui, compositi.

PEDUNCULI verticillati, quaterni, quini, patentissimi, 3-6-flori: *communes* et *partiales* bracteis minimis setaceis stipati.

FLORES sessiles, bracteis totidem obvallati.

CALYX minimus, quinquedentatus, ciliatus.

COROLLA alba, infundibuliformis, quadrilinearis. *Faux* villosa. *Limbus* revolutus.

FILAMENTA infra faucem inserta, corollae ferè longitudine. *Antherae* oblongo-lineares, extrorsum recurvae.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus, inter *Muña* et *Pozuzo* ad *Playa* tractum.

FLORET Novembri, et Decembri.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa stamina ostendens. 4 Pistillum.

#### COFFEA LONGIFOLIA. ICON. CCXVIII. Fig. a.

9. C. foliis lanceolato-oblongis undulato-repandis, stipulis ovatis, racemis terminalibus ternis.

FRUTEX triulnaris, glaber.

CAULIS erectus, teres, supernè ramosissimus.

RAMI erecti, teretes, articulati, plerumque dichotomi.

FOLIA opposita, petiolata, deflexa, lanceolato-oblonga, acuminata, integerrima, undulato-repanda, supra nitida, venosa, ferè pedalia.

PETIOLI teretes, pollicares, supernè sulcati.

STIPULAE ovatae, in vaginae formam connatae.

RACEMI terminales, terni, brachiati, sesquipalmares.

PEDUNCULI brachiati, multiflori.

FLORES breviter pedicellati, congesti.

CALYX minimus, quinquedentatus.

COROLLA quadrilinearis, alba. *Faux* villosa. *Limbus* quinquefidus: *laciniis* reflexis.

BACCA globosa, disperma, rubra.

SEMINA elliptico-obovata, hinc convexa, inde plana.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus ad *Vitoc* arcem.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla cum staminibus. 4 Eadem scissa stamina ostendens. 5 Pistillum. 6 Bacca. 7 Semina utrinque visa.

#### COFFEA MICROCARPA. ICON. CCXVIII. Fig. b.

10. C. foliis lanceolatis acutis, stipulis utrinque bidentatis, cymis axillaribus terminalibusque patulis.

FRUTEX triorgyalis, glaber.

CAULIS erectus, teres, ramosissimus, fusco-cinereus.

RAMI erecti, dichotomi, teretes, supernè compressiusculi, cinerei.

FOLIA opposita, remota, patentia, lanceolata, acuta, integerrima, venosa: *venis* incurvatis.

PETIOLI trilineares, supra leviter sulcati.

STIPULAE supraxillares, interfoliaceae, in vaginae formam, truncatae, utrinque bidentatae: *denticulis* subulatis, adpressis, deciduis.

RACEMI terminales, sesquipalmares.

PEDUNCULI brachiato-decussati, remoti: *communes* et *partiales* bracteis subulatis suffulti: *teneri* leviter pubescentes.

FLORES terni, sessiles.

CALYX minimus, quinquedentatus.

COROLLA albidiuscula, trilinearis, limbo revoluta, extus leviter pubescens.

FILAMENTA infra faucem inserta. *Antherae* vix exsertae.

STYLUS longitudine corollae. *Stigmata* erecta.

BACCA piperis nigri magnitudine, rubicunda, disperma.

SEMINA laevia.

HABITAT in *Andium* nemoribus *Pillao* ad *Patasaria*.

FLORET Septembri, et Octobri.



*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla scissa stamina ostendens. 4 Pistillum. 5 Bacca.

**CHIOCOCCA. LINN. Gen. pl. pag. 126.**

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

**CAL.** *Perianthium* quinquedentatum, minimum, superum, persistens.  
**COR.** infundibuliformis. *Tubus* brevis. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* ovatis, obtusis, aequalibus, patentibus.  
**STAM.** *Filamenta* quinque, filiformia, basi tubi inserta, fauce breviora. *Antherae* oblongae, erectae, inclusae.  
**PIST.** *Germen* orbiculatum, compressum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* capitatum, obtusum.  
**PER.** *Bacca* orbiculata, compressa, didyma, utrinque sulcata, calyce coronata, bilocularis. *Dissepimentum* contrarium.  
**SEM.** solitaria, oblonga, compressa, hinc gibba, inde plana.

**CHIOCOCCA BRACHIATA. ICON. CCXIX. Fig. b.**

1. *C.* scandens, foliis ovatis deflexis, ramis brachiatis horizontalibus, racemis axillaribus terminalibusque.  
**PLANTA** frutescens, scandens, glabra.  
**CAULIS** teres, ramosissimus, fuscus.  
**RAMI** consimiles, brachiati, horizontales: *teneri* obsoletè tetragoni, secundum articulationes compressiusculi.  
**FOLIA** opposita, petiolata, deflexa, ovata, acuta, integerrima, supra nitida, subcoriacea, parum venosa, bipollicaria.  
**PETIOLI** bilineares, subcontorti, supra canaliculati.  
**STIPULAE** interfoliaceae, connatae in vaginae formam, truncatae, breves, utrinque acumine brevissimo, persistentes.  
**RACEMI** axillares, longitudine foliorum, horizontaliter patentes, compositi.  
**FLORES** breviter pedicellati.  
**PEDUNCULI** et *Pedicelli* bracteis parvis subulatis stipati.  
**CALYX** parvus, virescens.  
**COROLLA** luteo-viridis, calyce triplò longior.  
**BACCA** parum carnosae, compressa, rufescens.  
**SEMINA** pallescentia, laevia.  
**HABITAT** in nemoribus *Chinchao Quebrada* ad *Macora* praedium.  
**FLORET** Junio, et Julio.  
*Explic. Icon.* 1 Flos integer. 2 Calyx. 3 Corolla. 4 Eadem cum staminibus scissa. 5 Stamen. 6 Pistillum. 7 Bacca. 8 Eadem transversim secta loculamenta ostendens. 9 Semina.

**GARDENIA. LINN. Gen. pl. pag. 162.**

CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

**CAL.** *Perianthium* tubulosum, breve, quinquedentatum; *denticulis* basi disjunctis, subulatis, longissimis, subcontortis: superum, persistens.

**COR.** infundibuliformis. *Tubus* longissimus, cylindricus. *Faux* parum dilatata. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* lanceolatis, acutissimis, lateraliter revolutis.

**STAM.** *Filamenta* quinque, brevissima, fauci inserta. *Antherae* incumbentes, oblongo-lineares, biloculares, apicibus prominulis.

**PIST.** *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, altitudine staminum. *Stigma* bilobum: *lobis* oblongis, crassis, reflexis.

**PER.** *Bacca* cylindrica, calyce coronata, bilocularis, coriacea, decemnervis.

**SEM.** plurima, triangularia, compressa, per quatuor series imbricatim sibi imposita.

**GARDENIA LONGIFLORA. ICON. CCXIX. Fig. a.**

1. *G.* foliis lanceolatis, corollis longissimis hirsutis acutis, baccâ cylindricâ sesquipalmari.  
**FRUTEX** biorgyalis, inermis.  
**CAULIS** erectus, teres, valde ramosus, fusco-cinereus.  
**RAMI** brachiati, horizontales, longi, lenti, cinerei, teretes: *juniores* breves, foliosi, obsoletè tetragoni.  
**FOLIA** opposita, breviter petiolata, bipollicaria, lanceolata oblongaque, acuta, integerrima, supra glabra nitidiuscula, subtus per venas leviter hirsuta.  
**PETIOLI** bilineares, supra vix sulcati.  
**STIPULAE** interfoliaceae, oppositae, semiamplexicaules, subulatae, adpressae, deciduae, rubescentes.  
**PEDUNCULI** terminales, unicus ex singulo ramusculo, brevissimi, uniflori.  
**CALYX** hirsutus, vix pollicaris.  
**COROLLA** alba, extus hirsutissima. *Tubus* filiformis, longissimus, tripalmaris et ultra. *Faux* villosa. *Limbus* patentissimus, supra glaber: *laciniis* sesquipollicaribus.  
**BACCA** sesquipalmaris, lutea, nervis decem fuscis longitudinalibus notata.  
**SEMINA** fulva, pulpâ lutescenti nidulantia.  
**HABITAT** in *Andium* nemoribus imis calidis ad *Pozuzo*.  
**FLORET** Augusto, et Septembri.  
**VERNACULE** *Iscumnim* et *Nupchucri*.  
**USUS.** Indi fructuum pulpam dulcem jucundè exsugunt.  
*Explic. Icon.* 1 Baccae dimidia pars inferior loculamenta et semina ostendens. 2 Semen.

**GENIPA. LINN. Gen. pl. pag. 136.**

**GENIPA OBLONGIFOLIA. ICON. CCXX. Fig. a.**

1. *G.* foliis oblongo-obovatis subsessilibus, racemis terminalibus.  
**ARBOR** tri-quadriorgyalis.  
**TRUNCUS** erectus, comâ parum frondosâ, cortice fusco.  
**RAMI** teretes, cicatriculis stipularum anularibus notati.  
**FOLIA** opposita, conferta, breviter petiolata, tripalmaria et ultra, undulata, oblongo-obovata, obtusa, integerrima, supra nitida, subcoriacea, venosa, nervo et venis transversalibus leviter pubescentibus, marginibus revolutis.  
**PETIOLI** brevissimi, supra plani.



STIPULAE interfoliaceae, semiamplexicaules, petiolis longiores, membranaceae, ovatae, acutissimae, deciduae.

FLORES terminales, congesti, breviter pedunculati, bracteis duabus lanceolatis suffulti.

CALYX monophyllus, tubulosus, leviter quinquefidus: *laciniis* minimis obtusis; superus, persistens.

COROLLA lutea, hypocrateriformis. *Tubus* cylindricus, calyce paulò longior, hirsutus. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* oblongis, patentibus.

FILAMENTA quinque, brevissima, infra incisuras corollae inserta. *Antherae* ovato-lanceolatae, acutae, incumbentes.

GERMEN oblongum, teres. *Stylus* columnaris, longitudine calycis. *Stigma* oblongum, acuminatum, striatum, longitudine ferè corollae.

BACCA ovalis, mali persici magnitudine, bilocularis, basi calycis tubulosâ coronata, fusca.

SEMINA numerosa, subrotunda, compressa, per septem series in singulo loculamento disposita, nidulantia.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus imis calidis ad *Pampahermosa*, et in *Pozuzo* circuitu.

FLORET Julio, et Augusto.

VERNACULE *Vitu*, in *Pozuzo Palo colorado*.

USUS: Pulpâ et seminibus masticatis, Indi colore nigro diu persistenti faciem, manusque inficiunt. Lignum rosei coloris, ad varia utensilia conficienda optimum est.

Explic. Icon. 1 Calyx cum pistillo. 2 Corolla scissa, stamina ostendens. 3 Stamina. 4 Bacca per medium secta, loculamenta et semina ostendens. 5 Semen.

### RANDIA. LINN. *Gen. plant. pag. III.*

#### CHARACTER GENERICUS REFORMATUS.

CAL. *Perianthium* quinquepartitum: *laciniis* erectis, linearisubulatis, contortis; superum, persistens.

COR. hypocrateriformis. *Tubus* cylindricus, calyce vix longior. *Limbus* quinquepartitus: *laciniis* ovatis, patentibus.

STAM. *Filamenta* vix ulla. *Antherae* quinque, ovatae, erectae, infra faucem corollae insertae, inclusae.

PIST. *Germen* subrotundum. *Stylus* filiformis, longitudine corollae. *Stigma* bilobum: *lobis* oblongis.

PER. *Bacca* unilocularis, subrotunda, calyce coronata, interius cincta membranâ brevi, perpendiculari, dissepimentum incompletum mentiente, unde semibilocularis.

SEM. plurima, nidulantia, per quatuor series alternatim superimposita, oblonga, compressa.

#### RANDIA OBOVATA. ICON. CCXX. Fig. b.

1. R. spinis oppositis, foliis obovatis acutis.

FRUTEX orgyalis, spinosus, pubescens.

CAULIS erectus, parum ramosus.

RAMI brachiati, infernè floridi spinosi, supernè foliosi inermes: *teneri* obsoletè tetragoni, compressiusculi.

SPINAE axillares, brachiatae, horizontales, rigidae.

FOLIA opposita, approximata, breviter petiolata, obovato-

oblonga, acuminata, integerrima, venosissima, bipalmaria.

STIPULAE interfoliaceae, basi connatae, subulatae, erectae, petiolis longiores, membranaceae.

FLORES ex axillis cicatricum foliorum, solitarii, sessiles.

BRACTEAE septem sub singulo flore, lanceolatae, acutae, imbricatae, membranaceae, marcescentes, fulvae.

COROLLA alba, calyce duplò longior.

BACCA pubescens, luteo-cinerea, nucis moschatae magnitudine.

SEMINA fulvescentia.

HABITAT in *Peruviae Andium* praeruptis calidis ad *Munã*, *Pozuzo* et *Chinchao* tractus.

FLORET à Junio ad Septembrem.

Explic. Icon. 1 Calyx cum bracteis. 2 Corolla. 3 Eadem scissa cum staminibus. 4 Pistillum calyce coronatum.

5 Bacca transversim secta. 6 Semen.

#### RANDIA ROTUNDIFOLIA.

2. R. spinis ramisque subverticillatis, foliis subrotundis ovatisque rugosis.

FRUTEX orgyalis, spinosus.

CAULIS erectus, ramosus, teres.

RAMI teretes, oppositi quaternique.

SPINAE rigidae, oppositae quaternaeque.

FOLIA quatuor ex singulo puncto gemmaceo, subrotunda ovataque, integerrima, rugosa, utrinque pubescentia, parva, subsessilia.

STIPULAE interfoliaceae, ovatae, acutae, membranaceae, fulvae.

FLORES solitarii, è centro quatuor foliorum, sessiles.

COROLLA alba, calyce duplò longior.

BACCA unilocularis, avellanae nucis magnitudine, lutescens.

SEMINA plurima, ovata, compressa, obscure fulva, nitida, pulpâ nigrâ nidulantia.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus secùs *Huassahuassi*.

FLORET Novembri, et Decembri.

VERNACULE *Millucassa*, id est, *Spinus lanuginosus*.

### HAMELIA. LINN. *Gen. plant. pag. 123.*

#### HAMELIA PATENS. ICON. CCXXI. Fig. a.

1. H. ramis sulcatis, foliis ternis quaternis oblongo-lanceolatis, floribus cymosis secundis.

HAMELIA (*patens*) racemis patentibus. JACQ. *Amer. pict. pag. 39. tab. 72.*

LONICERA racemis secundis revolutis, foliis ovatis quaternis. PLUM. *per Burm. pag. 212. tab. 218. fig. 2.*

FRUTEX biorgyalis.

CAULIS erectus, ramosus.

RAMI terni quaternique, trigoni tetragonique, sulcati.

FOLIA terna quaternaque, patentia, petiolata, oblongo-lanceolata, acuta, integerrima, subtus magis pubescentia, supra nitidiuscula, mitia.



STIPULAE interfoliaceae, subulatae, petiolis triplò breviores, erectae.

PEDUNCULI terminales, bipalmes, cymosi: *partiales inferiores* verticillati: *superiores* furcati.

FLORES spicati, secundi, subsessiles.

CALYX parvus, quinquedentatus, superus, persistens, ruber.

COROLLA tubulosa. *Tubus* semipollicaris, pentagonus, basi angustatus. *Limbus* quinquedentatus, brevissimus; *denticulis* ovatis, acutis.

FILAMENTA quinque, brevia, capillaria, coarctationi tubi inserta. *Antherae* longae, lineares, basi bifidae, incumbentes, altitudine corollae.

GERMEN ovatum. *Stylus* filiformis, longitudine antherarum. *Stigma* oblongum, obtusum, pentagonum.

BACCA ovalis, ciceris parvi magnitudine, obsoletè pentagona, quinquelocularis, calyce coronata.

SEMINA plurima, minima, ovalia, compressa.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus imis calidis, copiosè in *Pozuzo* versuris.

FLORET Julio, et Augusto.

Explic. Icon. 1 Corolla. 2 Eadem scissa cum staminibus. 3 Pistillum cum calyce. 4 Bacca transversim secta. 5 Semina.

HAMELIA SPHAEROCARPA. ICON. CCXXI. Fig. b.

2. H. ramis teretibus, foliis ternis oblongis, floribus subcorymbosis.

FRUTEX biorgyalis, ramosus.

RAMI terni, teretes: *teneri* hirsuti, rubicundi.

FOLIA terna, petiolata, oblonga, undulata, integerrima, mitissima, utrinque hirsuta, venosa, nervo et venis rubris.

PETIOLI foliis breviores, supernè sulcati, punicei.

STIPULAE interfoliaceae, ovato-lanceolatae, acuminatae, deciduae.

PEDUNCULI terminales, subcorymbosi, dilutè rubicundi.

FLORES spicati, secundi, pedicellati.

CALYX tubulosus, quinquedentatus, superus, persistens.

COROLLA tubulosa, puniceo-crocea. *Tubus* pentagonus. *Limbus* quinquefidus: *laciniis* subrotundis, patentibus.

FILAMENTA quinque, brevia, ultra basim tubi inserta, curvata. *Antherae* longae, lineares, basi bifidae, incumbentes, exsertae.

GERMEN globosum. *Stylus* filiformis, longitudine staminum. *Stigma* lineare, corollà longius.

BACCA globosa, ciceris magnitudine, calyce coronata, quinquelocularis, purpureo-nigra, hirsuta.

SEMINA plurima, orbiculata, compressa, nidulantia.

HABITAT in *Peruviae* nemoribus ad *Chinchao Quebrada*, prope *Challana* praedium.

FLORET Septembri, et Octobri.

Explic. Icon. 1 Corolla scissa cum staminibus. 2 Pistillum cum calyce. 3 Bacca. 4 Eadem transversim secta. 5 Semina.

Tom. II.

## LEONIA.

## CHARACTER GENERICUS NATURALIS.

CAL. *Perianthium* minimum, quinquepartitum: *laciniis* subrotundis, marginibus scariosis, sibi invicem incumbentibus; inferum, deciduum.

COR. *Petala* quinque, obovata, concava, erecto-patentia, calyce multò majora.

*Nectarium* cyathiforme, minimum, quinquecrenatum, membranaceum, germen ambiens.

STAM. *Filamenta* nulla. *Antherae* quinque, subreniformes, crenaturis nectarii adnatae, didymae, biloculares, utrinque dehiscentes.

PIST. *Germen* subrotundum, minimum. *Stylus* brevissimus, subulatus. *Stigma* simplex, acutum.

PER. *Bacca* globosa, corticosa, unilocularis.

SEM. plura, obovata, pulpâ molli nidulantia.

## CHARACTER DIFFERENTIALIS.

*Calyx* minimus, quinquepartitus. *Petala* quinque, obovata, concava. *Nectarium* cyathiforme, quinquecrenatum, antheriferum. *Bacca* corticosa, maxima, unilocularis. *Semina* obovata, nidulantia.

Obs. Cum Tafalla in hujus Arboris descriptione fructus maturos anni praecedentis in distincta planta ac flores, se invenisse asseruerit; nos eam utpote Generi *Clavijae* valde affinem, polygamam dioicam esse suspicamur.

Genus nuncupatum D. Francisco Leon, viro in primis docto, juris praesertim scientiae consultissimo, et πολιτικῶτατῶ, quique singulari, qua pollet, eloquentiae vi, et fructuosarum disciplinarum studio, quo vehementer flagrat, hujus Voluminis editionem promovit, et sequentium promovere pergit.

## LEONIA GLYCYCARPA. ICON. CCXXII.

1. L. foliis oblongis coriaceis, floribus racemosis.

ARBOR trigintaularis et ultra.

TRUNCUS crassus, erectus, cinereus, scaber; comâ frondosâ terminatus.

RAMI sparsi, teretes, cinerei; supernè foliosi; infernè defoliati, floriferi.

FOLIA alterna, breviter petiolata, bipalmaria, oblonga, acuminata, repanda, utrinque glabra, supra nitida, coriacea, integerrima, venoso-reticulata; nervo venisque supra prominulis.

PETIOLI trilineares, subcontorti, leviter canaliculati.

RACEMI ramei, aggregati, 3-5, inaequales, bipalmes, compositi.

PEDUNCULI filiformes, laxi.

PEDICELLI tri-quadriflori: *communes* et *partiales* bracteis ovatis, minimis, membranaceis suffulti.

CALYX viridis, margine scarioso.

COROLLA lutea, calyce sextuplò major.



BACCA globosa, amygdali persicae fructûs magnitudine, lutescens, aspera.

SEMINA fulvescentia, ciceris magnitudine, pulpâ molli luteâ nidulantia.

HABITAT in *Peruviae Andium* nemoribus imis calidis ad *S. Antonii de Playa grande* vicum, undè Tafalla Iconem, Descriptionem et exemplaria nonnulla exsiccata nobiscum communicavit.

FLORET Augusto, et Septembri.

VERNACULE *Achocón* nuncupatur.

Usus : Fructus maturos, quorum pulpa mollis et dulcis saporis est, Incolae jucunde comedunt. *Folia* masticata summam viscositatem praebent. Ex trunco, cujus lignum compactum et albo-lutescentis coloris est, trabes et tabulae ad varia utensilia perutiles effici possunt.

Explic. Icon. 1 Flos integer. 2 Calyx auctus. 3 Petala. 4 Nectarium cum antheris auctum. 5 Idem scissum stamina interius ostendens. 6 Nectarii pars cum anthera lateraliter hiantem. 7 Pistillum. 8 Idem auctum. 9 Bacca transversim secta. 10 Semen.





Pag.	Icon.
------	-------

crenatifolius.	10	118
cymosus.	9	117
hermanniae.	10	
macrocalyx.	10	118
secundus.	10	117
sepium.	10	
tricolor.	10	
<b>CORDIA</b> rotundifolia.	24	148
<b>CYNOGLOSSUM</b> decurrens.	}	
lineare.		6
pauciflorum.		
pilosum.		6
revolutum.		6

## D

DATURA arborea.	15	128
sanguinea.	} 15	
Stramonium.		
DESFONTAINIA spinosa.	47	186

## E

ECHITES acuminata.	19	134
glandulosa.	19	135
hirsuta.	19	136
laxa.	19	134
subsagittata.	19	

## F

FABIANA imbricata. 12 122

## G

GARDENIA longiflora.	67	219
GENIPA oblongifolia.	67	220
GILIA laciniata.	17	123

## H

HAMELIA patens.	68	221
sphaerocarpa.	69	221
HELIOTROPIUM corymbosum.	2	107
curassavicum.	4	
incanum.	2	108
lanceolatum.	4	111
microcalyx.	3	109
microstachyum.	3	110
oppositifolium.	2	108
peruvianum.	2	



## INDEX

	Pag.	Icon.
HELIOTROPIUM pilosum.	3	110
synzystachyum.	3	109
HIPPOTIS triflora.	56	201

## I J

IPOMOEA acutangula.	11	119
angulata.	11	120
cuspidata.	11	119
glandulifera.	12	121
Papiu.	11	120
subtriloba.	12	
villosa.	12	121
JUANULLOA parasitica.	47	185

## L

LAUGERIA dependens.	23	} 145
hirsuta.	22	
LEONIA glycyarpa.	69	222
LISIANTHUS acutangulus.	14	122
calygonus.	14	126
corymbosus.	14	124
ovalis.	13	
viscosus.	14	125
revolutus.	14	127
LITHOSPERMUM aggregatum.	4	
dichotomum.	5	111
hispidum.	5	
incanum.	}	4
muricatum.		
tinctorium.	4	114
LYCIUM aggregatum.	45	182
obovatum.	}	46
salsum.		183
spathulatum.		
umbellatum.	45	182
LYGODISODEA foetida.	48	188

## M

MACROCNEUM corymbosum.	48	189
microcarpon.	49	188
venosum.	49	190
MIRABILIS Jalapa.	1	
MYOSOTIS corymbosa.	}	5
gracilis.		
granulosa.		
humilis.		

## N

NAVARRETIA involucrata.	8	
NICOTIANA angustifolia.	16	130

	Pag.	Icon.
glutinosa.	16	
paniculata.	16	129
tabacum.	15	
tomentosa.	16	129
undulata.	16	130
NIEREMBERGIA repens.	13	123
NOLANA coronata.	}	7
inflata.		112
prostrata.	7	
revoluta.	8	113
spathulata.	7	113
NYCTERISITION ferrugineum.	47	187

## P

PERIPHRAGMOS dependens.	18	133
flexuosus.	17	131
foetidus.	17	132
uniflorus.	18	
PHLOX biflora.	17	
PHYSALIS angulata.	42	
prostrata.	}	41
pubescens.		
subtriflora.	42	178
PLUMBAGO europaea.	2	
PLUMIERIA bicolor.	21	141
carinata.	21	140
incarnata.	20	138
lutea.	21	142
purpurea.	20	137
tricolor.	20	139
PORTLANDIA corymbosa.	49	190
PSYCHOTRIA alba.	58	205
amethystina.	57	203
caerulea.	62	213
capitata.	59	206
cymosa.	59	206
foveolata.	59	207
gracilis.	63	211
hyacinthiflora.	62	213
laxa.	61	212
macrobotrys.	57	203
macrophylla.	56	202
macropoda.	63	211
mitis.	60	208
obovata.	58	204
pilosa.	60	208
punicea.	62	212
repanda.	61	
reticulata.	56	202
subtomentosa.	61	210
sulphurea.	58	205
thyrsiflora.	57	204
tinctoria.	62	211



# GENERUM, ET SPECIERUM.

73

	Pag.	Icon.
PSYCHOTRIA trifida.	60	209
villosa.	59	207
virgata.	60	209
viridis.	61	210

## Q

QUINCHAMALIUM procumbens.	I	107
---------------------------	---	-----

## R

RANDIA obovata.	68	220
rotundifolia.	68	
RAUWOLFIA flexuosa.	} 26	152
macrophylla.		

## S

SAMOLUS Valerandi.	48	
SARACHA biflora.	42	179
contorta.	43	180
dentata.	43	179
procumbens.	43	180
punctata.	42	178
SCHWENKFELDA umbellata.	55	200
SESSEA dependens.	9	116
stipulata.	9	115
SOLANUM acuminatum.	34	159
acutifolium.	33	162
anceps.	36	169
angulatum.	36	170
angustifolium.	33	163
aspero-lanatum.	39	174
biformifolium.	32	161
calygnaphalum.	31	
conicum.	38	172
crispum.	31	158
cymosum.	31	160
dichotomum.	34	166
diffusum.	37	171
filiforme.	31	159
foetidum.	39	
glandulosum.	35	167
grandiflorum.	35	168
havanense.	39	
incanum.	40	175
incarceratum.	40	176
incurvum.	34	164
laciniatum.	40	177
lanceolatum.	33	164
lineatum.	31	158

SOLANUM lycioides.	
Lycopersicum.	
mite.	
montanum.	
multifidum.	
nigrum.	
nitidum.	
nutans.	
obliquum.	
oblongum.	
oppositifolium.	
pendulum.	
peruvianum.	
phyllanthum.	
pinnatifidum.	
pubescens.	
quercifolium.	
runcinatum.	
scabrum.	
sericeum.	
sessile.	
stellatum.	
ternatum.	
tomentosum.	
tuberosum.	
variegatum.	
viridiflorum.	

SPIGELIA anthelmia.	
STRYCHNOS brachiata.	

## T

TABERNAEMONTANA arcuata.	22	143
Sananho.	22	144
TOURNEFORTIA angustiflora.	25	151
longifolia.	25	150
polystachya.	24	149
virgata.	25	150
volubilis.	24	148
undulata.	25	149

## V

VALLESIA dichotoma.	26	151
VARRONIA crenata.	23	146
cylindristachya.	23	147
dichotoma.	23	146
obliqua.	24	147

## X

XUAREZIA biflora.	13	123
-------------------	----	-----

Pag.	Icon.
41	177
37	
38	173
32	160
37	171
32	
33	163
34	166
35	165
34	165
35	168
39	174
37	
32	
37	170
36	169
36	
36	
39	175
33	161
35	167
40	176
38	172
41	
38	
32	162
38	173
9	
30	157



# INDEX

## NOMINUM VERNACULORUM.

A					
	Pag.				Pag.
ACHOCOÑ.	70	CHAMA.			26
AJI.	30	CHAMICO.			15
ALMIZCLILLO.	15	CHAMPA.			8
AMACASA.	41	CHAVES.			7
ANTACCRA.	25	CHICHIMICUNA.			48
ARBOL de Panamá.	27	CHINCHIMALI.			1
del Ajo.	47	CHUCULATE.			34
ARNAUCHO.	30	COMIDA de Venados.			30
ASMONICH'.	54				
AURORAS.	12				
AZUZENO.	54				
B				D	
BATATAS de Malaga.	11	DONDIEGOS.			2
BEJUCO blanco.	48				
C				E	
CACHICASA.	46	ENREDADERA.			10
CAFFÉ.	64	ESPINO.			46
CAMOTE.	11	ESPINO de Cruces.			26
CAMPANILLA.	15	salado.			46
CAMPANILLAS blancas.	} 10				
de Lomas.					
encarnadas.					
olorosas.					
CAMPUCASA.	40				
CAPECAPE.	} 54				
CAPECITO.					
CAPE negro.					
CAPULI.	42				
CAPULI cimarron.	42 44				
CAPULIES.	42				
CASCARILLO bobo amarillo.	51				
de hoja morada.	52				
de pata de Gallareta.	53				
fino.	51 52				
fino delgado.	51				
CASIAMURU.	40				
CCANTU.	} 18				
CCANTUTTICA.					
CCARAPAMACMAM.	44				
CCARATU.	49				
CCARHUASPPACO Suche.	} 21				
CCARHUAS-Suche.					



## 75

[illegible]



## MENDA TYPOGRAPHICA.

<i>Pag.</i>		<i>lin.</i>			
19		27	Semen	<i>adde</i>	6 Nectarium exterius.
21		16	Plumieria carinata		Ic. CXL.
21	post	41			<i>Expl. Ic.</i> 1 Pistillum cum calyce.
					2 Stamina tubo corollae inserta.
					3 Folliculus clausus et apertus,
					Semina ostendens. 4 Semen.
26		13	nigro-purpurascens	<i>lege</i>	nigro-purpurascens.
26		50	Spino		Espino.
29		2	PETIOLI		PETIOLI.
37	51 52 53	2 3 43 39 13 24	VERNACULE		VULGO.
47		44	NYCTERISITION	<i>adde</i>	¿An <i>chrysophylli</i> species?
50		31	cymbiformibus	<i>lege</i>	cymbaeformibus.
51		51	cymbiformes		cymbaeformes.
50		18	disseccate		dissecatae.





















J. Rubio del.

Bonavent Lopez inc.

*a* HELIOTROPIUM *synzystachyum*.

*b* HELIOTROPIUM *microcalyx*.





Very faint, illegible text at the bottom of the page, possibly a title or description of the plant.





J.M. Bonifaz inc

Is. Gálvez del.

*a* HELIOTROPIUM *pilosum*.*b* HELIOTROPIUM *microstachyum*.









Fr. Suria inc.

L. Gálvez, J. Brunetti et J. Rubio del.

*b* CYNOGLOSSUM pilosum. *a* HELIOTROPIUM lanceolatum. *c* LITHOSPERMUM dichotom.









L. Gálvez del.

Pet. Gascó inc.

*a* *NOLANA inflata.*

*b* *NOLANA coronata.*









Fr. Pulgar del.

J. Rubio pinxit.

Joann. Brunetti inc.

*a* NOLANA *spathulata*.

*b* NOLANA *revoluta*.









Fr. Suria inc.

Is. Gálvez del.

*a ALDEA pinnata.*

*b LITHOSPERMUM tinctorium.*









Vinc. Engelman inc.

J. Gálvez et J. Rubio del.

*a* *ANAGALLIS ovalis*.

*b* *SESSEA stipulata*.

















J. Brunet del.

J. Rubie min.

Em. Navaro inc.

*a* CONVULVULUS *secundus*

*b* CONVULVULUS *cymosus*.









Is. Gálvez del.

F. Martinez Tenre inc.

*a* CONVULVULUS *crenatifolius*.

*b* CONVULVULUS *macrocalyx*.









F. Pulgar del.

J. Rabio min.

F. A. Torre inc.

*a* IPOMOEA papiro.

*b* IPOMOEA acuminata.









J. Brunetti et F. Pulgar del.

J. B. et F. Pulgar del.

F. Vigna inc.

*a* IPOMOEA glandulifera.

*b* IPOMOEA villosa.









Ls. Galvez del.

Jos. Salas inc.

*a LISIANTHUS acutangulus.**b FABIANA imbricata.*










*a* XUAREZIA biflora.

*c* NIEREMBERGIA repens.

*b* GILIA laciniata.

*Ls. Galvez delin. et inc.*







LISIANTHUS *corymbosus*.


































J. S. Galvez del.

Vinc. Perez inc.

DATURA arborea.









Is. Galvez del.

Johann. Brunetti inc.

*a* NICOTIANA *tomentosa*.*b* NICOTIANA *paniculata*.



*Handwritten text at the top of the page, possibly a title or date.*




*Small vertical text on the left side of the illustration.*

*Small vertical text in the center of the illustration.*

*Small horizontal text at the bottom right of the illustration.*





L. Gálvez del.

J.M. Vega inc.

*a* NICOTIANA *angustifolia*.*b* NICOTIANA *undulata*.

























1

2









Is. C. G. del.

Joann. Banetti inc.

*b* ECHITES *laxa*.

*a* ECHITES *acuminata*.










Faust. M. Torre inc.

Fr. Pulgar del.

ECHITES *glandulosa*.









Emm. Navarro inc.

*ECHITES hirsuta.*







PLUMIERIA *purpurea*.


















*F. Suria inc.*

*J. Bracte del.*

PLUMIERIA *tricolor*.










*Is Galvez delin. et incid.*

PLUMIERIA *carinata*.

























*Is. Galvez del.*

*TABERNAEMONTANA arcuata.*

*J. Querol inc.*

















Is. Calvez del.

*a* LAUGERIA *hirsuta*.

*b* LAUGERIA *dependens*.

Fr. Panfil. incut.

















F. Pulgar et J. Rubio del.

F.M. Torre inc.

*a* VARRONIA macrostachya.

*b* VARRONIA obliqua.









Is. Galvez del.

Jos. Salas inc.

a *CORDIA rotundifolia*.

b *TOURNEFORTIA volubilis*.









Is. Galvez del.

J.M. Benigaz inc.

*a* TOURNEFORTIA polystachya.

*b* TOURNEFORTIA undulata.









*J. C. Walp. delin.*

*a* TOURNEFORTIA *virgata*.

*b* TOURNEFORTIA *longifolia*.

*J. Querc. incid.*









Fr. Pulgar del.

P. N. Gasco inc.

*a* TOURNEFORTIA *angustiflora*.

*b* VALLESIA *dichotoma*.







a RAUWOLFIA *flexuosa*.b RAUWOLFIA *macrophylla*.










F. Pulgar et J. Brunetti delin.

J. Brunetti incid.

a CESTRUM *confertum*.

b CERBERA *thevetia*.









Fr. Pulgar del.

F. Martinez Torre inc.

*a* CESTRUM *longiflorum*. *b* CESTRUM *racemosum*.







*a* CESTRUM *auriculatum*.*b* CESTRUM *undulatum*.







a *CESTRUM conglomeratum*.b *CESTRUM strigilatum*.









*a* CESTRUM lanuginosum. *b* STRYCHNOS brachiata.









L. Galvez del.

Emm. Navarro inc.

a SOLANUM *crispum*.b SOLANUM *lineatum*.









J. Rubio delin.

F.M. Torre incud.

*a* SOLANUM *acuminatum*.*b* SOLANUM *filiforme*.









Is. Calvez et Franc. Pulgar delin.

Fr. Suria incid.

*a* SOLANUM *cymosum*.

*b* SOLANUM *montanum*.







*a SOLANUM bisetifolium.**b SOLANUM sericeum.*









Is. Galvez et J. Brunete delin.

J. Quercus incid.

a *SOLANUM variegatum*.b *SOLANUM acutifolium*.









J. Rubio del.

J. J. Beequer inc.

*a* SOLANUM nitidum.*b* SOLANUM angustifolium.








*a* SOLANUM lanceolatum.*b* SOLANUM incurvum.



7







J. Rubio delin.

J. M. Vega incid.

a SOLANUM *obliquum*.

b SOLANUM *oblongum*.









J. Rodriguez inc.

J. Brunet, et F. Pulgar del.

*a SOLANUM nutans.*

*b SOLANUM dichotomum.*









*J. Gálvez et F. Pulgar delin.*

*Emm. Navarro incid.*

*a* SOLANUM *sessile.*

*b* SOLANUM *glandulosum.*









I. Gálvez et P. Pulgar del.

J. M. Torre inc.

*a SOLANUM oppositifolium.**b SOLANUM grandiflorum.*









J. Rubio del.

J.M. Bonifaz inc.

*a* SOLANUM *anceps*.

*b* SOLANUM *pubescens*.









Is. Gálvez delin.

Nic. Besançon incid.

a SOLANUM *angulatum*.b SOLANUM *pinnatifidum*.









F. Pulgar et J. Rubio delin.

*a* SOLANUM multifidum.

Vinc. J. Enquidanes inc.

*b* SOLANUM diffusum.










J. Bruncie et J. Rubio delin.

Bmm. Nasarro incid.

*a* SOLANUM ternatum.*b* SOLANUM conicum.









I. Galvez, et F. Pulgar del.

F.M. Torre inc.

*a* SOLANUM *mite*.

*b* SOLANUM *viridiflorum*.









F. Pulgar et J. Rubio delin.

J.M. Bouffiz incid.

a SOLANUM *pendulum*.b SOLANUM *asper-lanatum*.







*a* SOLANUM *scabrum*.*b* SOLANUM *incanum*.









J. Brunete et J. Rubio delin.

Emm. Alegre incid.

*a* SOLANUM *incarceratum*. *b* SOLANUM *stellatum*.









L. Galvez et J. Brunete delin.

P.M. Torre incid.

a SOLANUM *laciniatum*.b SOLANUM *lycioides*.









F. Pulgar et J. Rubio delin.

Nic. Besançon incid.

a *PHYSALIS subtriflora*.b *SARACHA punctata*.







*a SARACHA biflora.**b SARACHA dentata.*









*Is. Calvez delin.*

*J. Brunetti incid.*

*a SARACHA contorta.*

*b SARACHA procumbens.*









F. Pansil incid.

J. Brunet, et J. Rulvo del.

*a* *ATROPA umbellata.*

*b* *ATROPA biflora.*









*Ed. Pulgar et J. Rubio del.*

*J. M. V. Co. inc.*

*a* LYCIUM aggregatum.

*b* LYCIUM umbellatum.









*Ls. Galvez, J. Brunetti, et J. Rubi del.*

*J. Brunetti inc.*

*a* *LYCIUM salsum.*

*b* *LYCIUM spathulatum.*

*c* *LYCIUM obovatum.*

















I. Gálvez del.

J. M. Bonifaz incut.

JUANULLOA *parasitica*.







DESFONTAINIA *spinosa*.







NYCTERISITION *ferrugineum*.









J. Brancato del.

Emm. Navarro inc.

*a* **MACROCNEMUM** *microcarpon*.*b* **LYGODISODEA** *foetida*.







MACROCNEMUM *corymbosum*.









J. Brunet, et J. Rabio del.

*a* *PORTLANDIA corymbosa*.*b* *MACROCNEUM venosum*.

J. Quercet incit.


























J. Brunetti inc.

E. Puygaret.

CINCHONA *micrantha*.





*Lilium*





CINCHONA ovata.
















CINCHONA *dichotoma*.









L. Galtzer delin. et incid.

CINCHONA grandiflora.









CINCHONA rosea.





Illustration of a plant, possibly a tree or large shrub, enclosed in a rectangular border. The drawing is very light and appears to be a watermark or a very faded print. The plant has a central trunk and several large, rounded, lobed leaves or branches extending upwards and outwards. The entire illustration is set within a thin rectangular frame.





L. Gálvez, J. Brunet, et F. Pulgar del.

J. Requena inc.

<sup>a</sup> SCHWENKFELDA *umbellata*. <sup>b</sup> CAMPANULA *biflora*. <sup>c</sup> CAMPANULA *filiformis*.





*Asplenium adnigrum* (L.) Presl





1



2



3



4



5



6



7



8



9









I. Galvez del.

J. Salas inc.

*a* PSYCHOTRIA *macrophylla*.*b* PSYCHOTRIA *reticulata*.









J. Galtsof del.

P. N. Gussone incid.

*a* *PSYCHOTRIA macrobotrys*.*b* *PSYCHOTRIA amethystina*.





eleusine

acutifolia





L. Gálvez del.

J. Brunelli inc.

*a* PSYCHOTRIA *obovata*.*b* PSYCHOTRIA *thyrsiflora*.









I. Galvez del.

J. Quirós incud.

*a* PSYCHOTRIA *sulphurea*.

*b* PSYCHOTRIA *alba*.





1841  
1842  
1843  
1844  
1845  
1846  
1847  
1848  
1849  
1850  
1851  
1852  
1853  
1854  
1855  
1856  
1857  
1858  
1859  
1860  
1861  
1862  
1863  
1864  
1865  
1866  
1867  
1868  
1869  
1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900

1841  
1842  
1843  
1844  
1845  
1846  
1847  
1848  
1849  
1850  
1851  
1852  
1853  
1854  
1855  
1856  
1857  
1858  
1859  
1860  
1861  
1862  
1863  
1864  
1865  
1866  
1867  
1868  
1869  
1870  
1871  
1872  
1873  
1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  
1883  
1884  
1885  
1886  
1887  
1888  
1889  
1890  
1891  
1892  
1893  
1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899  
1900



*a* PSYCHOTRIA *capitata*.*b* PSYCHOTRIA *cymosa*.





— (M. 100000) —

— (M. 100000) —





*a* PSYCHOTRIA *villosa*.

*b* PSYCHOTRIA *foveolata*.







*a* PSYCHOTRIA pilosa.*b* PSYCHOTRIA mitis.







*a* PSYCHOTRIA *virgata*.*b* PSYCHOTRIA *trifida*.







*a* PSYCHOTRIA *subtomentosa*.*b* PSYCHOTRIA *viridis*.









J. Brunete et I. Gálvez del.

P.N. Gasco inc.


*a* PSYCHOTRIA tinctoria. *b* PSYCHOTRIA macropoda. *c* PSYCHOTRIA gracilis.





*Rosa rugosa* L. (Rosa rugosa)





F. Pulpard del.

F. Pajul inc.

*a* PSYCHOTRIA *punicea*.*b* PSYCHOTRIA *laxa*.









E. Pulgar del.

P.N. Gascó incid.

*a* *PSYCHOTRIA livacinthiflora*      *b* *PSYCHOTRIA caerulea*.









*a* COFFEA racemosa.

*b* COFFEA acuminata.









I. Gálvez del.

F. M. Torre inc.

a *COFFEA subsexilis*.

b *COFFEA umbellata*.









*a* COFFEA *ciliata*.

*b* COFFEA *foveolata*.







a *COFFEA nitida*.b *COFFEA verticillata*.









J. Gálvez et P. Pulgar del.

E. Suria, inc.

*a* COFFEA longifolia.*b* COFFEA microcarpa.









*a* GARDENIA *longiflora*.

*b* CHIOCOCCA *brachiata*.





*Lilium candidum*

*Lilium candidum*





J. Brunet et F. Vulgar del.


J. M. Bonjuz inc.

*a GENIPA oblongifolia.**b RANDIA pubescens.*









*A. Bracte et P. Pulgar del.*

*J. Breva int.*

*a* HAMELLIA *patens*.

*b* HAMELLIA *sphaerocarpa*.







LEONIA *glycyarpa*.





















64

01